

J VII. Dag



DE MORBIS

MULIERUM ET PUERORUM

PRÆLECTIONES

AUCTORE

FRANCISCO BAGNO

IN USUM

AUDITORIUM SUUM.



NEAPOLI MDCCLXXXVII.

EX TYPOGRAPHIA AMATI CONS.
PUBLICA AUCTORITATE.





PRÆLOQUIUM

Ecce tandem adolescentes laborum
 meorum finis. Vestris votis ob-
 temperaturus de morbis mulie-
 rum, et puerorum prælectiones instituo. Hos
 morbos medentibus grave negotium faces-
 sere nemo ignorat. Nullus in praxi
 medica vel optime versatus esse potest,
 qui sponte non fatetur maximam repe-
 riri difficultatem in curandis mulierum,
 et puerorum morbis. Sola hysterica affe-
 ctio, quæ pene infinitam ærumnarum se-
 riem mulieribus affert, quibus auxiliis nunc
 coerceri, et debellari a nobis potest? Larva-
 na ipsius morbi facies, multiplex causa-
 rum occasionalium series huic morbo pa-
 tiendo apta, nervorum et reliquorum so-
 lidorum mulieris, (quæ morbi subiectam

constituunt) morbosa inemendabilis dispositio, atque alia id genus insperatam curandi rationem pene semper promittunt. Adde his modo meticulosam, vel rectius superstitiosam mulierum indolem, modo verecundiam, modo præceptis medicis resistantiam; quæ sane omnia difficiliorum reddunt curationem. Nec desunt casus, qui ex ipsa morborum natura difficultatem eruunt. Quis dicere audebit certa esse semper graviditatis signa? Quis mulierem gravidam acuto morbo correptam pristinae sanitati facile restituere valet? Pueri ob solidorum imbecillitatem gravissimis subjiciuntur morbis, quorum enarrationem non possunt afferre. Neque eorum ætas patitur præcepta medica exacte adimpleri; ut proinde aut raro, aut ægre admodum puerorum morbi curentur.

Gravia igitur vel in ipso addiscendæ praxis termino vos manent adolescentes. At tanta rei difficultate perterriti, ne vereamini ultimam, ut dici solet, conficiendo operi manum admoveere. Ego, cujus cordi est vestris servire commodis, vos apprehendam, et manuducam ea ratione, ut in via, quæ ducit ad cognoscen-

dos,

dos, et facile curandos indicatos mulierum, et puerorum morbos, nè minimum quidem offendatis. Quidquid enim et veteribus, et recentioribus hac de re innotuit veluti per synopsis attingere curabo, quidque mihi hos morbos curanti observatione dignum contigit, fideliter enarrabo. Neque vel difficillimæ casus occurret, quem facili negotio non dissolvam atque explicabo. Sic, favente Deo, hanc necessarissimam medicinæ partem summa facilitate, et claritate, ut ceteras præceos meæ partes vobis tradere enitar. Quod si conatibus meis labor et studium vestrum obsecundaverit, spartam, quam nacti estis, pro mortalium bono facile adimplere valebitis. Rerum tractandarum methodus hæc est. Mulieres in quocumque statu sunt, suis semper morbis subjiciuntur. In virginali, & viduitatis statu menstruationis perturbationes, & hysterica affectionis tyrannidem experiuntur. In conjugali sentiunt gravia incommoda conceptionis, gestationis, partus, & puerperii. Nos atque primum virginum, inde gravidarum

*rum morbos expendemus. Pueri secundum
variā tenellæ ætatis conditionem varios
substinent morbos. Statim in lucem edi-
ti quibusdam morbos accidentibus subji-
ciuntur. Facti paulo grandiores lactis
acrimonias, dentitiones, pertinaces tus-
ses, suffocativos catarrhos, convulsiones,
crustæ lactææ, aliorumque hujusmodi hu-
morum acrimonias patiuntur. Omnes hos
morbos, aliosque, quos brevitatis gratia
hec omittimus, summa, qua decet, cla-
ritate & brevitate describere curabimus.
Valete.*


DE MORBIS

MULIERUM ET PUERORUM

PRÆLECTIONES

ARTICULUS I.

Purgationis Menstruæ Suppressio.

§. I.  Muliebre corpus ea est lege Quibus no-
tis mulie-
bre corpus
a virili cor-
pore differt. fabricatum, ut datis in
temporibus conceptioni,
indeque gestationi obe-

undæ par evadat. Quamobrem ita est
dispositum, talique partium conforma-
tione ornatum, ut laudato semper fi-
ni satisfacere rite possit. (a) Nimirum

A 4 con-

(a) Simplici intuitu muliebre corpus inspi-
cientibus innotescere potest vel ipsa externa-
rum partium dispositio, qua ab virili corpore
discrepat. Nam mulieres habent cavitatem pe-
ctoris mobiliorem, cujus in summo prominent
mammæ turgescentes & oblongæ. Pelvis est am-
pla abdominalis, cuius ossa perbello modo ap-
tan-

*Menstrua-
tionis signa.*

conceptio, gestatio, partus, puerperium
lactatio etc. functiones sunt, quibus ab-
solvendis mulieres dicantur. At non omni
tempore conceptioni opportunæ sunt.
Circa decimum quartum ætatis annum
huic operi videntur aptæ, et circa quin-
quagesimum desinunt ad concipiendum
habere aptitudinem. In hoc tempore
men-

tantur. Ossa ilia lateraliter extrorsum expor-
riguntur, pubis ossa sursum extrorsumque pro-
minent, et os sacrum retrorsum fertur. Hoc
ita fieri oportebat, quoniam scilicet crescenti
in utero foetui, indeque per partum in lucem
venienti opportunus, commodusque paretur
locus. In ima hujus pelvis parte situs est
uterus, cujus figura, situs, connexio, fabrica,
etc. ex anatomicis innotescit. Ceterum puden-
darum partium situs, et fabrica, debilior so-
lidorum textura, admodum mobilis nervorum
status, et his similia evidentem faciunt diffe-
rentiam corporis muliebris ab illo virorum.
Quapropter facile erui potest actiones mulie-
rum, potissimum ad pudendas partes perti-
nentium differre ab illis virorum, ideoque
morbi ipsas functiones ladentes peculiari sunt
examine observandi.

menstruatio apparet, quæ incipit circa secundum septenarium, et desinit circa ipsius septenarii quadratum. Re quidem vera circa decimum quintum annum mulieres jam sui corporis perfectum incrementum habere videntur. Turgent mammæ et tororiantur, corpus grave & circa lumbos dolorosum pondus sentiunt morosæ factæ mulierès, et jam ab veluti colicis doloribus vexantur. Paulo post e pudendis stillat sanguis, et cum lavamine prædictorum symptomatum ad duos tresve dies stillare desinit. Huius evacuationis quantitas ut plurimum est a 10. ad 15. uncias. Cessat evacuatio hæc sanguinis exacte post mensem, præviis iisdem symptomatibus, reditura. Sic mulieres quolibet mense hanc patiuntur uterinam sanguinis evacuationem, (quam medici modo *menses*, modo *catamenia*, modo *tributa lunaria*, modo *flores*, modo *menstruationem* appellant) ad usque 45., vel 50. annum suæ etatis. Hoc in tempore cessat penitus sine ullo sanitatis detrimento memorata menstruatio.

§. 2. Hactenus exposita de menstruatione respiciunt universalem mulierum

*Naturalis
menstrua-
tionis le-
gem non læ-
dunt pecu-
liaves casus*

CON-

conditionem, cui casus peculiare nil possunt officere. Sic dantur puellæ ante 14. annum menstruantes, et observantur mulieres post 60. annum habere et quidem copiosam menstruationem. Novi matronam annorum supra 60. bis in mense menstruationem habere, optimaque frui sanitate. Sunt nonnullæ, quæ paucas sanguinis guttas quolibet mense e pudendis educunt, et sunt aliæ, quæ copiosam habent menstruationem, sine ullo sanitatis detrimento. Video frequenter pulcherrimam juvenem viduam, quæ quolibet mense educit ab utero tres fere libras sanguinis, et tamen alacris est, bonaque fruetur sanitate. Sed repetere fas est hujusmodi peculiare casus universali menstruationis mulierum legi officere non posse. Menstruus sanguis, qui ab utero excernitur optimæ est conditionis, neque verum est ipsum ferre totius mulieris corporis inquinamenta, indolemque idcirco habere venenatam. Nam is est sanguis ille, qui per arterias sani corporis ducitur, et is, quo utitur natura ad tennerrimam foetus machinam alendam. Verum haud irficiari possum propter

Menstruus sanguis bonus est.

moram, quam habet in uterinis vasis quandam ad putrescendum tendentiam ipsum posse adipisci, prout quisque sanguinem menstruum videns ex quodam fatore, quem sentit, intelligere potest. Hujus menstruationis causam esse plethoram apud cordatiores physiologos hodie statutum est. Hanc plethoram in corpore muliebri pariunt nonnullæ causæ. Humidum, et molle earum temperamentum, vita iners, otiosa, semperque domi acta perspirationem insensibilem valde nimis imminuunt, quemadmodum ex Sanctorii, Dodartii, Gorteri, Lynxiique observationibus constat. Hanc perspirationem copiosam ita esse, ut semper omnes sensibiles exertiones superet jam pariter probatum est. Quando itaque muliebri corpus tantam non habet quotidianam educationem, bono redundat sanguine. Corporis viventis fanique lege sancitum est, ut defectum sensibilibum, et insensibilium excretionum supplere debeat magna inguulinorum humorum assimilatio, quæ sane plethoram constituit.

Menstruationis causam ex plethora est.

Cur quolibet mense ex utero redundans sanguis exire debet.

§. 3. Demonstrata in feminis plethorā, videndum nunc restat cur circa secundum septenarium ab utero exeat, cur semper post mensem redeat, curque desinat circa septenarii quadratum. Postquam muliebri corpus ob solidorum laxitatem citum adipiscitur incrementum, aliquid in corpore redundare debet, quod antea partium faciendæ evolutioni inserviebat. At ex demonstratis in §. præced. ob imminutionem perspirationis vasa sanguine bono debent redundare, ergo circa 14. annum, in quo desinit feminae incrementum constituitur in corpore plethora. Hæc universalis plethora majori copia colligitur in utero, et propter situm, quem tenet in pelvi abdominali inferiorem, et propter peculiarem vasorum dispositionem. Nam uterum habet venas numero minores, et multo fociis arteriis duriores reliquis ceterarum corporis partium. Ergo necessario in utero sanguis colligi debet, qui urget villos exhalantes, et in ipsius cauum venit menstruationem pariturus. Dum autem excernitur data sanguinis quantitas, deficit ple-

plethora universalis, et peculiaris. Nec, nisi eadem essent causæ plethoram inferentes, menstruatio rediret. At redit post mensem menstruatio, quia memorata muliebris corporis dispositio tantum tempus requirit ad novam generalem, indeque particularem faciendam plethoram. Si mulier utero gerit, aut lactationem sustinet, sanguis, qui redundare in suo corpore debet, et pro fætus nutritione, et pro lactis generatione impenditur, et ita durante gestatione, et lactatione nullam habent mulieres menstruationem. Cessat penitus menstruatio adveniente septenarii quadrato, quia deficiunt vires assimilatrices humorum, et uterina vasa maiorem adipiscuntur resistantiam. Deficit itaque sanguinis quantitas necessaria plethoræ constituendæ, et deficit ipsius trusiva vis dum vasorum uteri resistantiæ augentur.

§. 4. Naturalis hæc sanguinis mulierum eductio vitiari potest. Aliquando post pubertatem non apparet, & ad menses, ad annos, immo ad totam vitam ipsius defectus non raro protrahitur. Mulieres ad senium vergentes numquam menstruas-

Menstruationis suppressio quibus fit ex causis.

se novum non est videre. Huiusmodi defectum mensium *emantionem* appellant. Aliquando supprimitur evacuatio, aut imminuitur, scilicet si mulieres habent menstruationem, quam, data qualicumque causa, postea aut suppressam, aut imminutam experiuntur. Dicitur menstruationis *suppressio*, aut *imminutio*. Potest tandem accidere, ut plus justo sanguis ab utero excernatur, tunc hæmorrhagia uteri constituitur. Hoc in articulo de menstruationis suppressione, et imminutione, in sequenti de uteri hæmorrhagia verba faciemus, (b) Suppressionis vel im-

mi-

(b) Quæ sunt mulieres tota vita menstruationem non habentes hæ, aut per quoddam uteri vitium, aut per generales corporis causas hunc defectum patiuntur. Si v. g. uteri vasa non habent memoratam §. 3. dispositionem, qua venæ suis arteriis non sunt reliquis partibus resistentiores, tunc non constituitur peculiaris plethora, & menstruatio non apparet. Si ipsa vasa arteriosa naturali textura duriora, & resistentiora, ut par sit, in utero reperiuntur, sane urgeri ab sanguinis impulsu non possunt, & menstruatio non apparet. Si
vero

minutionis menstruationis causæ aut in utero, aut in sanguine quærendæ sunt. *Menstruationis suppressionis causa in utero est recognoscenda.* Arctum, rigidumque vasorum uteri systema, si ut dictum est, a nativitate cum virgine ortum sit, quemadmodum ipsam numquam menstruare patitur, ita, si adventitium per quodcumque accidens sit suppressionem menstruationis facit. Hæc adventitia vasorum uteri rigiditas ut plurimum oritur data externa causa. V. g.

vero deficiunt in corpore mulieris causæ generalem constituentes plethoram, ut fibrarum laxitas, qua perspiratio impeditur, & deficit vis humores assimilans, tunc non apparet menstruatio, & nullam hoc in casu noxam patiuntur mulieres. Tandem & per labem aut hæreditariam, aut connatam viscerum ventriculi, nempe, lienis, hepatis, intestinorum, pancreatis etc. digestionem, chylicationemque ciborum famulantium fieri potest, ut menstruatio numquam appareat. Deficit enim plethora, quæ a bona chyli in visceribus abdominalibus assimilatione potissimum incipit. Hæc uteri mulierum conditio eas steriles facere ut plurimum solet. Jugiter audio querelas divitis & nobilis hominis, qui in matrimonio coniungebatur cum virgine annorum unde

g. si mulier fluentibus mensruis nudis pedibus per frigidum solum non affueta ambulat, si inopinato corripitur timore etc. in menstruationis suppressionem incidit. Plantam pedis cum visceribus abdominis, et potissimum cum utero per nervos magnum consensum habere vel ipsa quotidiana experientia docet. Constrictis enim per frigus nervis pedum communicatur uteri nervis affectio, qua va-
fa

undeviginti, quæ nondum menstruationem habuerat. Jam ad senium perventa est mulier nec umquam menstruationem vidit, quocirca facta sterilis diviti conjugii exoptatam prolem non dedit. Hic vir semper maledicit yafriam suæ conjugis parentum, qui, ut nobili, & diviti homini in matrimonium darent filiam silentio præteriebant ipsius defectum, quo circa 20. annum menstruationem non viderat. Hæc matrona semper pallida, & excarnis est. Nec denegamus dari virgines, quæ virorum labores quotidianos æmulatæ ob auctam perspirationem, auctamque vasorum firmitatem nec habent plethoram, nec menstruationem patiuntur. Hæ bona gaudent valetudine, & viro conjunctæ feliciter concipiunt & pariunt.

fa uteri constringuntur, et menstruatio continuo supprimitur difficile in posterum reditura. Sic de timore sentiendum est. Constringi per hunc affectum omnes corporis partes, et potissimum externas jam notum est. Universæ cutis pallor magnus, et frigus pavorem statim excipiens id indicare potest. Eandem constrictionem uteri in actu præcipue menstruantis vasa ob pavorem accipere possunt mediis nervis, qua, factis justo rigidioribus, menstruationi præpeditur.

§. 5. Sed et eandem rigiditatem habere possunt vasa uteri ob alias causas. *Id ipsum sequitur.* Si intra uterum enascitur ulcus, quod postea in cicatricem abit, jam vasa per memoratam cicatricem excurrentia duriora evadunt, atque ægre admodum distendenti sanguini cedunt, et sic cessat menstruatio. Sic si tumor durus uterum corripit, vasa ejus ab tumore compressa dilatari non possunt. Vidi frequenter mulieres scirrhum uteri gestare, et menstruatione carere. Nec novum est observare mulieres juvenes abortum passas in menstruationis incidisse defectum tota vi-

ta perdurabilem. Tanta enim perturbatione uterus per abortum afficitur, ut eius vasa non amplius distendi patiantur a venienti sanguine, et cessat penitus menstruatio. Hæ mulieres cum ægra vita sterilitatem dehinc coniunctam habent. (c)

Et

(c) Mirari quis vestrum potest me in perquirendis suppressionis menstruationis causis abortum recognoscere, quasi nesciat post abortum advenire rupturam canaliculorum uteri, a qua potius hæmorrhagia uteri, quam menstruationis suppressio expectari debet. Is sane mirari desinit ad sequentia animum advertens. Post abortum fieri solet vulvus uteri, quod transit in cicatricem obcalescentem vasorum indolem facientem. Quando abortus oritur tales sunt causæ supponendæ, quæ utero tantam læsionem inferunt, quanta valet perturbare naturalem ejus oeconomiam, ut non sit sufficiens naturali obeundæ functioni, idest foetum gestare, & in lucem edere. Si uteri substantia perturbatur non possunt vasa suo naturali fungi officio, idest non possunt cedere trusivæ sanguinis vi, ideoque non dehiscunt sanguinem effusura. Vidi non raro post abortum mulieres habere puerperii suppressionem, neque amplius menstruatione gaudere.

Et inter uteri vitia menstruationem impediendam numeranda est illa pellicula, quæ adnascitur aut ad ostium colli uteri, aut ad internam vaginæ superficiem. Hac fit ut venienti ab utero sanguini via penitus occludatur. De hac membrana orificium uteri præternaturaliter occludente mentionem facit Hippocrates (d).

B 2 Et

dere . Recordor juvenis annorum 18. robusto viro in matrimonium conjunctæ. Hæc ob magnum inopinatam metum trimestrem abortum, præviis summis uteri cruciatibus, patiebatur. Post duos dies sufficientibus uteri expurgationibus sine causa manifesta orbata est. Post id varios per abdomem dispersos dolores cardialgiam & colicam æmulantes habuit, a quibus opiatorum remediorum ope liberabatur, Paulo post rediit ad pristinum sanitatis suæ statum. Verum octavum nunc currit annum et neque amplius concepit, neque menstruationem vidit. Tota est pallida, et humoribus lentis, viscerumque abdominalium obstructione laborat. Subest animo meo metus bonis moribus ornatam juvenem in lencophlegmatiam incidere.

(d) In lib. de natur. Muliebr. & de mulier, morb. Cart, T. VII. p. 710.

Et fatetur egregius Benevoli, se curasse virginem diu menstruationis suppressionem habentem introductione catheteris. Laborabat hæc virgo etiam vesicali ischuria, cui occurrebat catheteris immisione intra urethram. Sed catheter intra vaginam fortuito immittebatur, et adhibita vi rumpebatur pellicula superius vaginæ orificium obcæcans. Hac disrupta pellicula cum multo sanguine educto ab utero veniente, tumor, qui ab congesto intra uterum multo sanguine oriebatur, disperebat, et ablata pressione collo vesicæ urinariæ facta, urina sponte fluebat, et menstruatio dehinc apparuit. (e) Recordor virginis annorum 17. ab suburbano oppido venientis, nostrumque nosocomium petentis, quæ diris abdominalibus doloribus, et potissimum uteri ac vaginæ rationem occupantibus quærebatur. Dum explorabantur pudenda, ut in affectam sedem morbi causam invenire potuissemus observata fuit densa pellicula circularis

(e) Adire potest. Benevoli Observat. p. 80. et seq.

laris ostium vaginæ penitus occludens. Narrabat mihi mater virginem numquam fuisse menstruatam. Pelliculam statim abscindendam præcepi. Hac ubi incidebatur atrii coloris sanguis ad plurimum passuum distantiam effundebatur. Exierunt e pudendis adolescentulæ quindecim fere libræ humoris fætidi nigricantis coloris cum summo ægrotantis enolumento. Post hanc operationem discessit e nosocomio virgo, nec aliud de ea rescivi. Quod de pellicula obcludente ostium vaginæ, aut orificium uteri sentiendum quoque est de imperforatis, aut de naturali vaginæ angustia nec humorem ullum transeuntem, nec aliud durum corpus admittere valenti. Non raro præcipiunt chirurgi virginibus conjugatis ob summam vaginæ angustiam virum admittere non potentibus pessaria ex radice gentianæ, quibus sensim dilatari solet vagina, ut et menstrua, et penem commode pertransire, patiatur. Imperforatæ chirurgica quoque ægent manu.

§. 6. Causæ verò, quæ ipsum sanguinem respiciunt sunt omnes illæ, quæ valent ipsius lentorem generare, quo effici-

*Quæ cause
faciunt
menstrua-
tionis sup-
pressionem
ad sangui-
nem perti-
nentes.*

tur , ut penetrari angustissima vasorum uteri exhalantia oscula non possint , et menstruatio aut deficit , aut imminuitur . Notum enim ex physiologicis est sanguinem dato impetu præditum esse debere , ut datam vasorum uteri resistantiam possit superare . Quando est viscidus et lentus sanguis ex velocitatis defectu hunc impetum adipisci nequit . Multas ab causas sanguis viscidus evadit . In primis considerari debet debilitatus fibrarum tonus , quo efficitur , ut sanguinis elementa non possint intime commisceri , et uniri , unde in lentum abeunt fluorem . Sic si oritur in corpore mulieris plethora , quæ ab causa quacumque , nempe a suscepto inassueto pedum frigore , a pavore etc. per uterum exonerari nequit , tunc redundans in corpore vasa plus justo distendit , debilitatque . Sic ob defectum oscillationis vasorum in lentorem abit sanguis , constituiturque ita menstruationis defectus . Vita admodum sedentanea , et iners solida etiam debilitat . Diuturnus mæror eundem in solidis parit effectum . Acutus morbus & potissimum

data

ſæ ipſum ſanguinem afficientes. Sic ciborum difficilis digeſtionis, & ſpirituorum abuſus poteſt ſanguinem lentum & viſcidum efficere. Quæ mulieres carnibus fumo & fale duratis, leguminibus, fun-
gis,

capite ſitas influxu. Hunc perturbatum influxum ſpirituum excipit univerſalis muſculorum debilitas, quæ vulgo dicitur *debilitas, febrilis*. Hæc debilitas fit a languida fibrarum oſcillatione, qua efficitur, ut arteriæ licet celeri & frequenti oſcillatione ſanguinem urgeant, attamen ei levem, & veluti fatuum dant impulſum. Hinc deficiente vi truſiva in ſanguine, deficit ratio, qua vaſa uteri dehiſcant, ſicque ceſſat menſtruatio in febrili. Hoc ratiocinium licet verum eſſe poſſit, attamen nos ſemper putamus, quaſdam febres peculiari modo uterum afficere, in eo ita conſtituentes perturbatum fibrarum, vaſorum, & nervorum ſtatum, quo viſceris functio læditur. Hinc quemadmodum a quibuſdam febribus ſupprimitur menſtruatio, fluxus lochialis, aut alia uteri expurgatio, ita a quibuſdam aliis febribus hujusmodi evacuationes morboſe nimis augentur. Sic mulieres ſub febris cujuſdam ingreſſu habere uteri hæmorrhagiam novum non eſt in praxi exemplum.

gis, pinguibusque cibis nec non spirituosus liquoribus nimis indulgent in menstruationis suppressionem incidunt propter summum sanguinis enatum lentorem. Vidi superioribus mensibus nobilem virginem in menstruationis defectum incidere ob gelidarum potionum abusum. Et mulieres, quæ in aere crasso, & humido, omnique pene elatere expoliato vivunt ob solidorum inertiam, & fluidorum lentorem menstruationis defectum pariter habent. Odores suaveolentes, veluti moschi, thuris, rosarum, caryophyllorum, atque aliorum corporum suavia effluvia emitentium suppressere actu fluentem menstruationem experientia docet quotidiana. Hoc per nervorum consensum accidere certum est. Tandem & eundem morbum concipere possunt illæ mulieres, quibus deficit veneris exercitium. Hoc accidere potest & ob mærorem, quo animus ob tantopere exoptatæ functionis defectum afficitur, & ob deperditam frictionem, quam uterus & vagina in venere sustinet, & ob defectum seminis vasa & fibras corporis mulieris spirituosas veluti elasticitate replentis. Nulla
 heic

heic occurrit mentio de lentore illo , quem sanguis concipere potest ab ingrefsu cujusdam morboſi , degeneris , & forſan venenati humoris , nempe gallici , cum id vel ſimplici meditatione vobis notum eſſe poſſit , noſque alibi venereos morbos deſcripturi rectius expendere tentabimus .

§. 7. Ex his, aut aliis ex cauſis orta menſtruationis ſuppreſſio in mulieribus ſuis non caret ſignis , ſymptomatibusque a medico rite noſcendis . Totius corporis gravitas & inertia magna perſentitur , animus evadit triftis & moroſus . Cerebri functiones quodammodo læduntur , & ſi hyleſtismus affligit , ſævior evadit . Reſpiratio parum fit anhelofa , qui anhelitus ad levem motum augetur , ciborum digeſtio vitari incipit , & frequenti aut acido , aut nidoroſo ruſtu mulieres vexantur . Et frequenter lingua albo ſordidoque velamine operitur . Cutis , & faciei color præprimis rubicundus eſt , inde paulatim incipit albefcere uſque dum defædatus , & nimis pallidus evadit . Pulſus ſunt in primis turgidi & pleni , dehinc languidi , & ſi ad ca-

che-

hexiam morbus accedit incipit quodammodo cutis tumere, & pedes oedemate corripuntur. Nec raro accidit, ut redundans sanguis in vasis sibi per extraordinarias corporis partes viam faciens foras exeat (g). Horum phænomenorum ratio

(g) Mira & stupenda sunt, quæ practicis quotidie occurrunt loca videntibus, per quæ exit sanguis menstruus. Nec institutionum stricta ratio patitur omnia recensere, quæ ab auctoribus dicta sunt circa inconcruas vias, quas tenet sanguis extra corpus exitum tentans. Nonnulla tantum attingere lubet. A puerili ætate usque ad sexagesimum annum vidit Panaroli mulierem per vomitum sanguinem menstruum educentem Pent. 1. Obser. 6. Schenckius videt virginem monialem carnosam & sanguine plenam singulis mensibus per oculos & aures menstruare. Observat. medic. Lib. IV. p. 630. E naribus singulis mensibus exire sanguinem in muliere menstruationis suppressionem habente cum summo levamine observavit Bartholinus Obser. Acad. v. 5. observ. 74. Hoc in praxi quotidie medici observant sicque confirmatur quod dixerat Hippocrates lib. aphor. v. n. 33: *mulieri menstruis deficientibus sanguinem ex naribus fluere bonum est.*

A

ratio hæc est. Post menstruationis suppressionem vasa sanguinea plus justo sanguine turgent. Oritur compressio, quam sequitur necessaria circulationis humorum tarditas, hinc & pauca fluidi

A gingivis, & dentibus exire menstruum sanguinem viderunt Rossenius de homin. primord. c. 28. p. 148. Heurnius, Hollerius & A. Lusitanus apud Bartol. hist. medic. 16. cent. 1. p. 72. Eundem sanguinem e calvariæ capillis stillare quolibet mense observavit Sylvius de Leboe prax. medic. lib. 3. c. 33. Per sudoris vias exire menstruum sanguinem referunt acta Berl. decad. iv. v. Ruyschius refert in epist. ad Boerhaavium se vidisse mulierem ab epidermide sanguinem stillare. Per fonticulos, per ulcera exire quolibet mense sanguinem referunt Medic. Essais and. observ. T. III. n. 24. & Hallerus in comment. Prælect. Boerh. t. 667. Per oesophagum, ventriculum, alvum perque os exire ipsum sanguinem viderunt Lusitanus, Boerhaavius, Werehyenus, Ruyschius, aliique. Nos vidimus virginem, cui post metum continuo supprimebantur menstrua actu fluentia. Ab anno 16. usque ad 24. sanguinem eduxit e pulmonibus, e ventriculo modo cum tussi, modo cum vomitu, e naribus, ab

di nervei quantitas fecernitur, & imminuitur excretorum eductio. Sic augetur corporis pondus, & animus ex perturbata naturali corporis oeconomia evadit triftis, Semper in corpore ægro triftis per *legem associationis* animus est. Et quemadmodum ob imminutam solidorum actionem lymphæ lenta & crassa est, nil mirum si lingua, tota interior oesophagi, ventriculique superficies albo obtegatur velamine; nilque mirum si aut dysforexia, aut pica corripiatur virgo. Cum autem ob auctam semper in dies arteriarum distensionem imminutamque idcirco earundem oscillationem sanguinis elementa uniri & conjungi non possint, factum est, ut ipse san-

ab oculis miro quidem & stupendo modo, ita ut per octo & plures annos in omni menstruationis periodo, clauso penitus utero, viam modo unam modo aliam sibi sternebat sanguis foras exitum tentans. Patet igitur ex his nullam esse in corpore muliebri partem e qua menstruus sanguis exire non potest.

sanguis in serum faceffat , quod serum ad totam corporis superficiem undique ducitur pallidum facturum colorem. Et auctis in dies hujusmodi feri particulis auctoque ob solidorum imbecillitatem humorum lentore, turgere incipit cutis , & oedema ad pedes adparet . Sic ad leucophlegmatiam sternitur via .

*Suppressio-
nis men-
struationis
presagium.*

§. 8. Hisce , aut similibus symptoma-
tibus menstruationis suppressio in virgi-
nibus ludit . Et patet evidenter verum
esse quod Boerhaavius dixerat (h) turbari
ex hac causa functiones omnes animales,
vitales, & naturales. Nam aut dicatur
sanguinem menstruum ob quandam mo-
ram & naturalem calorem in utero
acquirere ad putrescendum tendentiam,
sive dicatur sanguinem menstruum re-
dundare in corpore vasa arteriosa debi-
litare aptum, sane ab utraque causa me-
moratæ functiones lædi possunt . Nam
quando degener & vitiosus sanguis fer-
tur ad caput tenerrimam cerebri com-
bagem læsurus omnes animales functio-
nes

(h) Aph. 125. de cogn. & curand, morb.

nes perturbari debent . Id Hippocrates indicare voluit dicens (i) *Menses non supprimi utile . At ex suppressis fiunt comitiales morbi .* Nec novum est videre ex suppressa menstruatione nymphomaniam ortam , quæ delirii species est . Et Celsus (k) subjungit *quibus feminis menstrua non proveniunt , necesse est capitis acerbissimi dolores sint .* Hujusmodi vitiatum sanguis ad pectoris , & abdominis viscera ductus eorum functiones perturbare debet . Quod si per auctam nimis plethoram vasa proprio elatere orbantur , tunc perturbatam circulationem functionum omnium læsio excipiat necesse est . Quod si sanguis per alias vias , quemadmodum notavimus (l) educitur , cum non nisi per vitiatam , & perturbatam organismi actionem exeat vita mulieris in tuto non est . Et diuturnam menstruationis suppressionem , lumborum ,
&

(i) Coac. prænot. n. 522.

(k) Lib. 2. c. 7. p. 58.

(l) Ngt. §. præced.

& coxendicum dolores , viscerum abdominalium obstructions , perturbationem digestionis , & chylicationi dicatarum virium , cachexiæ , & hydropis ortum , tandemque mortem sequi praxis quotidie ostendit . Putat cl: Astruc (*m*) non requiri gravem in utero læsionem , ut inde feminis magna oriantur incommoda ; sat erit uterum habere ob suppressionem menstruæ purgationis vasorum distensionem , & nervorum aliqualem irritationem , & ob regiminis imperium , quod habet uterus in corpore muliebri miras excitari perturbationes , functionumque læsiones medicis quotidie datur videre .

Menstruæ purgationis suppressio quomodo curari debet .

§.9. Ad curationem quod pertinet , jam satis probatum esse puto mensium suppressiones fieri & ab uteri vitiis , & a sanguinis lentore ; & vos rite hunc affectum curare non potestis , nisi hisce prospiciatis causis . Nimirum factis juxta solitum resistentioribus rigidioribusque uteri vasis emollientibus , & relaxantibus

(m) De morb. mulier. T. 26. 79.

bus medicamentis occurrere debetis. Hinc
 fotibus ex malva, althæa, foenugræco,
 chamæmelo, & his similibus herbis
 emollientibus paratis emolliri uteri va-
 sa debent. Quapropter præcipiendum
 virginem sedere pluries de die supra vas
 calidis hisce decoctionibus plenum ea ra-
 tione, ut vagina excipiantur fetus emol-
 lientes. Et pariter utile admodum erit
 incessus earundem decoctionum parare,
 in quibus repetitis in die vicibus virgo
 immergi debet. Neque nos pænuit con-
 jugatæ mulieri mensium suppressione ex
 vasorum uteri rigiditate laboranti siphone
 intra uterum immittendas decoctio-
 nes memoratas præscripsisse. Harum de-
 coctionum contactu mirum quantum,
 emollita fuerint vasa uteri, & facilem di-
 stentionem, indeque dehiscenciam reci-
 pientia sanguinem menstruum ubertim
 effuderint. Neque interno horum re-
 mediorum usui parcere debetis. Co-
 piosam decoctionem chamæmeli, mul-
 tam quantitatem feri lactis cum eadem
 decoctione copulati non sine magno fru-
 ctu propinatam observabitis. Postquam
 hæc medicamenta per aliquot dies data
 sunt

funt, nec apparet adhuc menstruatio, interim videtis nimis redundare in corpore sanguinem, præstat phlebotomiam instituere ex pedis vena ea ratione, ut accelerata sanguinis velocitate per vasa hypogastrica contra auctam resistantiam vasorum augeatur trusiva fluidorum vis. Nec raro contigit videre post hanc institutam medicinam redire menstruationem. Sunt qui ad obstinatas menstruationes suppressas revocandas adhibent aut cucurbitas ventosas inguinibus, & sinui muliebri, aut vulvæ labiis hyrundines, aut methodo Archibaldi Hamilton utuntur. (n) Quod si uterus callosa cicatrice, scirrho,

(n) Sanæ virgini defecerunt actu fluentes menses ob susceptum intempestive frigus. Rofeus faciei color in pallidum commutabatur, appetitus, & ciborum digestio depravabatur, pulsus erant languidi, magna corporis inertia solita exercitia impediēbat. Huic curandæ virgini arcessitus laudatus Hamilton duodecim ante menstruationem diebus vaporis tepido exponēbat virginis pudenda, & sequenti die dabat catharticum aloeticum. Post hoc vesperi hora septima splenium applicavit cruralibus arteriis eo in loco, in quo *tourniquet* apponi pro extirpatione

rho, aut alio duro tumore captus sit præstat & interno, & externo emollientium memoratorum medicamentorum usum pariter instituere. Semicubea bis

C 2 de

tione femoris solet. Splenium, circumducta fascia, premebat crurallem arteriam, sed non tam valide, ut penitus sanguinis cursus impediretur. Eodem in tempore aquæ tepidæ vapori virgo exponebatur. Post mediam ab incæpta operatione horam ægra sentiebat pondus, & plenitudinem in regione uteri, pulsusque apparuit frequentior. Datum fuit hoc in tempore cardiaci remedii parum, & post sesquihoram ab applicato splenio apparuerunt menstrua, quæ triduo absque ulla molestia fluerunt. Secundo a fluxus menstrui die splenium ablatum fuit. Hoc methodo frequenter obstinatissimas mensium suppressiones curasse cl: Hamilton fertur Eff. and. observ. Phys. T. II. p. 406. Neque apud nos hujus machanici artificii virtus ad provocandos suppressos menses frustanea fuit. Remedii Operatio in hunc modum est intelligenda. Ligamenta uteri rotunda veniunt ab intimis uteri partibus, & intra inguina se disperdunt. Ipsa vasorum sanguineorum esse complexus ad instar funiculi factos notum ex anatomico est. Hæc vasa cum iliatis, & cruralibus vasis communicant. Facta compressio-

ne

de die instituenda sunt. Et tentabunda veluti manu extracti cicutæ mediocrem quantitatem cum fero lactis copulatam quolibet mane sumptam præscribere haud vanum erit. Si adest membrana orificium vaginæ, aut collum uteri obcæcans hæc est diligenti chirurgi manu abscindenda. Et summæ vaginæ angustia occurrendum est pessariis ex radice gentianæ, ut jam diximus, confectis.

§. 10. Remedia, quæ sanguinis lentorem tollunt innumera esse possunt. Ante horum remediõrum præscriptionem bonum erit repetitis emeticis ex radice ipecacuanhæ cum granulo tartari emetici copulata paratis excutere primas

*Pro curatione sup-
presse menstruationis
lentus sanguis est
solvendus.*

ne in vasis iliacis, & cruralibus impeditur fluxus sanguinis ab ligamentis venientis. Turgent itaque sanguine hæc ligamenta, & ideo non recipiunt illum venientem a vasis uteri, quæ ultra debitum dilatata dehiscunt, sanguinemque emittunt. Hujusmodi medicamenti virtus in variis mulierum ægritudinibus, semper autem pertinentibus ad uteri vitia locum quoque habet, prout ex dicendis infra potebit.

mas vias , atque educere inertem viscidumq; humorem eas occupantem . Hoc remedii genus eo potissimum convenit , quo morbus in chlorosim conversus sit , primarumque viarum visciditas multa adfit . Solidorum debilitas martialibus præprimis tollenda est . Nobis in usu est cum limatura chalybis ad drachmam semis gummi ammoniacum ad grana 20. copulare Utrumque remedium in pilulari forma redactum quolibet mane sumendum jubemus , eique superbibendam concedimus aut chamædrii , aut aristolochiæ rotundæ , aut salviæ montanæ , aut majoranæ , aut sabinæ , aut artemisiæ largam decoctionem . In horum remediorum præscriptione diu est insistendum usque dum menses appareant . Frictiones per totum corpus mane & sero pannis asperis faciendæ sunt , & motus aut pedestri itinere , aut equitatione instituendus , aerisque e palustri & cænoso in elasticum , & mineralibus effluviis plenum mutatio facienda est . Annuente tempestate thermalium aquarum , & maris balnei usum summopere profecisse vidi . Et in promovendis mensibus electricif-

mum summopere quoque valet. Hujus remedii efficacia eo vel maxime elucet, quo solidorum imbecillitati tollendæ, humorumque lentori dissolvendo electricam materiam valere omnibus notum est. Nec post Cl. Bircherii observationes (o) de tanti remedii virtute ad promovendos menses ullum restat hodie dubium.

*Emmenagogorum
recta administratio.*

§. II. In emmenagogis autem recensendis remediis recta institutionum ratio restrictum me tenet. Nec vobis deficit videre vel ex populo quempiam, qui suum non laudat ad promovendos menses specificum. At pro rei veritate fatendum est sanguinis lentorem nonnulla remedia dissolventia potentissime menstruationem arcessere. Sic gummata amara, veluti ammoniacum, sagapenum, bdellium, & his similia emmenagoga potent-

(o) Adeatis quæso adolescentes cl. Viri Archiatri nostri Joannes Veventii de Electricit. Theor. & Pract. Cavalli, & Bircherii observation. traduct. in qua miræ notantur observationes de virtute electricismi in curanda suppressa menstruatione.

rentissima sunt. Inter hæc eminet gummi sagapenum, cujus virtutem post clarif. viri (p) monita pro curando morbo, de quo sermo est, efficacissimam non semel observavimus. Nobis in usu est gummi sagapeni drachmam unam cum pulveris sabinæ, aut aristolochiæ rotundæ eadem quantitate copulare, & in forma pilulari exhibere. Hisce pilulis superbibendam concedimus aut ejusdem sabinæ decoctionem, aut ligni quassiæ infusionem. Pro arcessenda menstruatione laudant nonnulli crocum cum extracto cicutæ conjunctum, cujus remedii virtutem pluries expertus sum felicissimam in iis casibus, in quibus cum sanguinis lentore copulata est uterinorum vasorum obstructio. Semper autem in hujusmodi emmenagogorum remediorum exhibitione cauti esse debetis adolescentes, ne malum mulieribus inferatis. Hoc evenire poterit aut si cum spasmo, &

C 4

con-

(p) Charteuserii, cujus pharmacopæam consulere potestis, in qua de hoc remedio bene scriptum invenietis.

convulsione uteri suppressio menstruationis est conjuncta, aut si, huiusmodi suppressio graviditatis est effectus. In primo casu irritatis per remedia emmenagoga uteri nervis augetur vasorum constrictio, & morbus confirmatur. In secundo abortus provocatur [q].

AR-

(q) Nulli non innotescit graviditatis tempore mulieribus menstruationem deficere. Quando per certa signa graviditas nota est sanguinem menstrum pro fœtus sustentatione inservire debet, ipsumque per uterinam purgationem velle educere piaculum est. At dantur casus, in quibus aut non certa est graviditas, aut per malitiam occultatur, quemadmodum facere solent mulieres, quæ per veneream furtivam concipiunt; tunc per emmenagoga præsertim vehementiora ab imprudenti medico exhibita abortus promoveri potest. Quamobrem adolescentes etiam atque etiam vos monitos volo, ne a mulieribus graviditatem simulantibus decipiâmini. Erit enim non sine gravi vestra culpa per neglectam rerum ad praxim pertinentium observationem ex datis in gravida emmenagogis commissum homicidium. Ad tantum errorem evitandum sequentia diligenter perpendatis oportet. Quando mu-

ARTICULUS II.

Uteri Hæmorrhagia.

§. 12. **M**ulieres singulis mensibus Quænam
est usus
hæmorrhæ-
gia. datam sanguinis quantita-
tem ab utero educere certum est. Hæc
sanguinis quantitas durante menstrua-
tionis tempore proportionalis esse debet
ætati, victui, regioni, in qua vivitur,
& dato vitæ generi. Si vero propor-
tio-

mulier est gravida, quo crescunt graviditatis men-
ses, eo augetur vultus vivacitas & rubicun-
dus color, atque in bona sanitatis conditione
constituitur. Contra quando mulier menstrua-
tionis suppressionem patitur, eo magis defæda-
tur color faciei, sanitasque læditur, quo cre-
scunt suppressæ menstruationis menses. Quan-
do mulier concipit ut plurimum tussi, vo-
mitu, & consuetorum ciborum fastidio corri-
pitur. Id non accidit in menstruationis sup-
pressionem. Gravida mulier habet mammas tur-
gidiores, & grandiores, & laboranti mensium
suppressionem minores & flaccescentiores eva-
dunt. Post quartum mensem jam motus in
utero persentitur a gravida muliere, & jam
in-

tionalem mensuram harum omnium rerum excedit sanguis menstruus, tunc hæmorrhagia efformatur, quæ semper virium debilitatem inferre solet. Quapropter non omnis excedens sanguinis quantitas ab uteroeducta hæmorrhagiam constituit, quia possunt dari mulieres, quæ sine sanitatis detrimento substinent magnam ab utero factam sanguinis evacuationem, sed tantum illa, quam

incipit ob distensum uterum turgere abdomen; Et non raro quædam pulsationis species uteri regionem explorantis medici manui occurrit, & pulsus dycrotus apparet. Hæc omnia in menstruationis suppressione deficiunt, in qua affectione lingua ut plurimum albo vela sordescit & deficit urinæ mingendi crebra cupiditas, atque tenesmi species, quæ in graviditate apparet. Hæc a vobis optime cognita de administrandis in suspitione graviditatis emmenagogis cautos admodum reddunt. Licet non negaverim aliquando hujusmodi signa etiam esse fallacia. Id potius summæ rei difficultati quam medicorum culpæ tribuendum esse cordatiores practici semper docent. At de graviditatis signis redibit infra sermo.

quam sequitur virium debilitas . Duplici modo sanguis ab utero exire potest aptus morbo , de quo sermo est , pariendo ; vel enim per plures dies , immo & per totum mensem guttatim effunditur , vel adveniente die menstruationis simul & semel ubertim educitur . Utroque enim modo sanguis eductus virium debilitatem infert . Verum aptiori sensu practici cordatiores primum modum , quo ab utero excernitur sanguis vocant *stillicidium* , secundum *hæmorrhagiam* . Hujus morbi causam aut in utero , aut in sanguine quærendam esse sanior dicitur ratio . In utero esse debet vasorum atonia , in sanguine non parva fluiditas , & acrimonia . Nam ex physiologicis innotescit vasorum resistantiam ad vim fluidorum impellentem esse ut 20. ad 1. Hoc eo consilio effecit natura , ut , quo fieri possit , vasa impellentibus fluidis resistent , ne levi ex causa aucto circulatorio motu disruptis vasis sanguis extra circulationis alveum effunderetur cum summo vitæ detrimento . Hinc patet aut trusivam fluidorum vim admodum augeri debere , ut tantam

Quenam est hæmorrhagiæ uteri causa .

resistentiam naturalem vasorum superet, aut admodum debilitari debere contextum vasorum, ut naturali fluidorum impetu resistere nequeat, & utroque modo sanguis effunditur. Quare si vasa uteri atoniam contrahunt, nil pronius est, ut collecto intra ipsa sanguini facilius cedant, & hæmorrhagia constituitur.

*Quænam
sunt cau-
sæ hæmor-
rhagiam
facientes.*

§. 13. Nil itaque mirum si omnes causæ vasa uteri debilitare aptæ hæmorrhagiam efficiant. Sic post trium, quatuorve mensium suppressionem accidit uterina hæmorrhagia ex ratione, qua ultra debitum distensa vasa ab collecto sanguine in magnam atoniam faceffere credendum est. At in eandem imbecillitatem incidunt propter abortum, aut laboriosum partum, quo vehementer distrahi debent; sic efficitur, ut mulieres post abortum, aut partum laboriosum in uterinam hæmorrhagiam incidant. Neque heic intelligimus hæmorrhagiam illam, quæ immediate partum aut abortum sequitur [de hac alibi mentionem faciemus], sed de illa hæmorrhagia, quæ ordinate accidit juxta menstruationis periodum, nunc sermo est.

est. Sed per ictum vehementem, perque vulnus & summam distentionem, & lacerationem pati pariter possunt uterina vasa, quapropter summam sanguinis quantitatem educere debent. Et immodica venus, ac pessariorum abusus ob summam, quam infert vasis uteri distentionem hæmorrhagiam arcessere potest. Id eo vel maxime accidit, quo delicatulæ compagis mulieres cum robusto, & mentulato viro sæpius coheunt. Vidi frequenter hujusmodi indolis juvenes, quæ quotiescumque debita matrimonii solvebant non parvam quantitatem sanguinis ab utero emittebant. Emollientes vapores diu vagina excepti ob multam, quam utero inferunt mollitiem morbum arcessere valent. Superioribus diebus consilium meum petebat virgo annorum 25 doloribus uterinis vexata. Præscribebam sanguinis missionem, semicubea emollientia, narcotica. Ab hisce remediis levamen virgo obtinuit, & admodum reficiebatur intra infessus emollientes sedens, in quibus immergebatur postquam per horam vagina exci-

cipiebat vapores emollientes. Post quindecim ab hisce remediis dies apparuerunt flores debito ceteroquin tempore, qui ita copiosi fuere, ut morti proximam pulchram juvenem reddiderint.

*Indicantur
aliæ hæ-
morrhagiæ
causæ.*

§. 14. Et sanguis sive in aucto impetu, sive in aucta fluiditate vitiatus hæmorrhagiam uterinam parere potest. Sic observamus omnes causas sanguinis motum augere volentes morbum arcescere. Cursus, saltus, vociferatio multa, crebra sternutatio, vomitus repetitus, magnus conatus in sublevando pondere, in sæcum duratarum educatione procuranda summi conatus, (quibus per diaphragmatis, musculorumq. abdominalium actionem uterus valde comprimitur), choræa, frictions, equitatio, & his similia semper modum excedentia, ex eo quia augent circulatorium motum, uterinam hæmorrhagiam parere possunt. Animi pathemata vehementia, ut ira & lætitia id ipsum efficere possunt ex ratione, qua pariter hisce pathematibus concitator fit hu-
mo-

morum motus (r). Balinea calida, hypochauſta mineralia, ciborum aromaticorum, & ſpirituoforum liquorum abuſus,

(r) Plures in praxi mihi occurerunt caſus, quibus vidi per animi pathemata factam uterinam hæmorrhagiam. Sed inter omnes ſequens valet. Juvenis annorum 22. in matrimonio conjungebatur cum viro annum 40. agente. Poſt aliquot a matrimonio meſes ob facinus, quod falſo ei imputabatur ad evitandas pænas a lege magno ſceleri addictas clam diſceſſit in partes longinquas bonis moribus ornatus vir. Et ne locus, in quo morabatur indicaretur epistolæ ſuæ conjugī non mittebat. Poſt annum elapſum tandem juvenis epistolam accepit, quæ nuntiabat ſui viri obitum. Flevit amare ſui conjugis mortiſtiſſima mulier, cujus dolores augebantur, quando ab accepto ferali nuncio duos poſt meſes in foro acta eſt cauſa, & innocens evaſit maritus. Sic vivebat mæſtiſſima juvenis, dum poſt 40. dies ab acta in foro cauſa circa duas noctis horas pullabatur janua, quam famulus ſtatim aperuit. In adventu ſui domini exclamavit famulus, & vox ejus jam audita eſt in tota domo. Admiratio magna, amor, & ſumma lætitia gentes ſedentes commovit, & amitiſſimo viro ſuo

fus, in aere elastico, & mineralibus effluviis referto incolatus diuturnus, atque hujusmodi alia circuitum humorum augmentia hæmorrhagiam arcessere possunt. Medicamentum emmenagogum, venenum sanguinem exagitans, & admodum commovens, febris (s) circulatio.

occurrebat statim castissima conjux, atque inter amplexus mutuos, fletusque ne verbum quidem ab ipsis dicebatur. Tandem præ summa lætitiâ syncope corripiebatur juvenis, sicque sensibus destituta ad lectum perducta est. Adhibitis sanguinis missione, & spirituosis tandem reviviscit, sed cæpit sanguinem e pudendis educere, qui tanta fluxit copia per duos integros dies, ut sine dubio duodecim librarum pondus excederet. Vix e morte evasit pulchra juvenis ope remediorum ad id opus opportunorum, licet per plures menses postea debilis, & pallida esset.

(s) Meminisse eorum oportet adolescentes, quæ in nota §. 6. diximus, quibus apparet aliquando febrim sistere, aliquando augere menstruationem. Hoc pendet a diverso febris caractere utrum diverse afficiente, quo nunc constringuntur, nunc aperiuntur ejus vasa, & nunc debili modo, nunc concitatori actione per febrim sanguis utrum petit. Id quotidianis experimentis in praxi innotescit.

tionem augere valens, & id genus alia hoc ipsum parere possunt. Quod autem spectat ad sanguinis auctam fluiditatem uterinæ hæmorrhagiæ causam constituentem jam vobis innotescere ex physiologicis debet, adolescentes, vasorum exhalantium diametrum globulis sanguinis admittendis parem non esse, & nisi au-geatur impellens sanguinis vis, aut im-minuatur naturalis vasorum resistentia, numquam exire sanguis potest. Verum mutua globulorum sanguinis cohæsiō ita solui potest, ut facili modo ingredi vel ipsa vasa capillaria possint. In febribus putridis, in quibus sanguis solutus est frequenter lividæ maculæ in cute ap-parent, quæ fiunt ab sanguine capilla-ria cutis vascula ingrediente. In phthi-sicis lividæ cutis maculæ apparentes ex eo, quia summam humorum dissolutio-nem indicant proximam mortem prænun-ciant. Quando itaque scorbutica labe, aut alio id genus vitio laborat sanguis frequenter hæmorrhagia uteri in mu-lieribus constituitur. Uteri stillicidium potius, quam hæmorrhagiam parere scor-buticam sanguinis labem ut plurimum

in praxi vidi. Sic vos observantes mulierem cibis quantitate & qualitate vitiatæ indulgentem, falsuginosorum humorum, vel alius exanthematici veneni retropulsionem habentem, sanguinemque hoc vel illo venenato miasmate, veluti purulento &c. ducentem, & stillicidium sanguinis ab utero gerere, ipsam scorbutica humorum labe infectam esse tuto adserere potestis.

Quibus signis uterina hæmorrhagia dignoscitur.

§. 15. Signa, quibus uteri hæmorrhagia dignoscitur petuntur ex ipsa sanguinis educti visa quantitate. Verum, ut nuper monuimus, non tutum est indicium hæmorrhagiæ in sanguinis effusi quantitate multa; nam dantur mulieres sanguineo præditæ temperamento, quæ sine sanitatis noxa multam quolibet mense quantitatem sanguinis ab utero educunt. Indicium certum est in sanitatis offensa, & virium debilitate, quæ hæmorrhagiam sequitur. Re quidem vera postquam mulier multam sanguinis quantitatem amiserit pallida evadit, & debilis, & in lipothimiam facile incidit, appetitus ciborum & digestio hebetatur, alvus est tarda, multa est ad motum iner-

inertia . Hæc symptomata quo in dies augetur hæmorrhagia crescunt, usque dum tumidula cutis apparet , & pedes oedemate corripuntur , tandemque leucophlegmatiam excipit mors . Horum symptomatum ratio patet ex eo , quod solida ob summam jacturam sanguinis suas in vacuum perdunt oscillationes, ideoque fluida & pigro cursu feruntur , & non condensantur , idest in bonam sanguinis conditionem non mutantur . Scatet itaque totum vasorum systema sero & lymphâ , unde pallidus cutis color ob defectum sanguinis cutanea vasa non petentis , & ob vitiatam secretionum conditionem, obque succi gastrici, humorumque chylicationi inservientium defectum appetitus & ciborum digestio habetatur ; nec non filet alvus ob bilis inertiam . Lipothimia fit ex languido cordis motu propter deficientem in ipsum sanguinis & fluidi nervei influxum . Et crescentem in dies humorum lentorem leucophlegmatia , indeque mors sequi potest . Pro apta morbi curatione sedulo attendendum est ad causas ipsum facientes . Et primo videndum, an in utero, an in

*Uterine
Hæmorrhagie
curatione.*

sanguine ipsa hemorrhagiæ causa sit. Et sane quando morbus ab atonia vasorum uteri producitur sequentia adhibere debetis remedia. Semper bonum præ primis erit corporis, animique quietem ac silentium imperare, & revellentibus procurare, ut, quo fieri possit, minor quantitas sanguinis ad uterum deferatur. Sic ægra dum fluit ab utero ubertim sanguis in lecto debet horizontalem sui corporis statum servare, vel omnibus animi pathematibus, domesticisque curis valedicere. Mihi in usu est jacenti in lecto mulieri uteri hæmorrhagiam laboranti imperare, ut pluribus in die vicibus maniluvia adhibeat, & semel iterumque ad sanguinem revellendum in manibus factam phlebotomiam sustineat. Nec inutile aliquando fuit supra mammas admoveere cucurbitas ventosas juxta Hippocratis præceptum. Hæc auxiliorum genera eo magis conveniunt, quo per auctum circulatorium humorum motum hæmorrhagia est facta.

§. 16. Alvus lubrica est servanda ne duris fæcibus expellendis auctior diaphragmatis, & musculorum abdominalium

Id ipsum sequitur.

lium compressio hæmorrhagiam augeat. Id clysteribus emollientibus semel in die adhibitis obtinebitur. Bibat ægra aquam frigidissimam, quam per siphonem eo in casu tantum in uterum immittere potest, in quo per summam sanguinis effusionem vicina mors timetur. Nivem contritam cum aliquot guttis spiritus vitrioli dulcis copulatam pluries de die manducatam non levem adferre opem videbitis. Fluente adhuc sanguine stricta est imperanda diæta, & si deficient vires hydrogalam nive frigefactam tantum concedere potestis. Opium fidenti animo propinare convenit, & laudani opiatum granum unum, ulterumve in sufficienti quantitate aquæ theriacalis solvi debet, cochleatimque exhibendum. Qui æthyopem vegetabilem præscribunt ad grana decem quotidie sumendum præscripto feliciter remedium non propinant. Lapidem hæmatitem, bolum armenam, terram sigillatam, alumen, sanguinem draconis, corticem granatorum, et balaustrorum, omnesque pulveres, atque decoctiones adstringentes, quas nonnulli fidentius præscribunt omnino vos con-

demnare debetis. His enim propinatis ut plurimum hæmorrhagiam augeri vidi. Verum sequens artificium sive in hæmorrhagia, sive in uteri stillicidio non parum profecisse pluries expertus sum. Sumatur linteum & fumo mastices ac chinchinæ nimis infectetur, sicque calidiusculum arctius ad vulvam adligetur. Post horæ spatium repeti debet panni suffumigium, ejusque ad vulvam adligatio. Hoc artificio pluries in die repetito sanguinis eductio aut cessat, aut imminuitur. Narrabat mihi muliercula, se hæmorrhagiam uterinam curare solere pannis lineis fumo lignorum infectis, atque arcte vulvæ adplicatis. Hoc remedium semper in uteri vasorum imbecillitate convenit. Nec vanum erit lumborum regioni adplicare emplastrum picis navalis, quod non semel votis cessisse vidimus. Quando cessat hæmorrhugiæ periodus, tunc prudenti manu remedia martialia propinari possunt ad procurandam quandam vasorum firmitudinem. Præ omnibus martis præparationibus laudare solemus pulverem cachecticum Arnoldi ad scrupulum unum extracto chinchinæ
exci-

excipiendum, vel cerussam martialem ad drachmam semis cum eodem extracto copulatam. Aquam gurgitelli vel pisciarelli ad libram semis in lacte aut vaccino aut caprillo quotidie sumptam optimum remedium esse quotidiana praxis docet. Quando finitus est sanguinis fluxus non debet debilis ægra lectum, quietemque corporis ulterius servare. Oportet eam pedestri itinere sensim sensimque facto leviter exercere. Post aliquot hoc modo instituti exercitii menses mulieres quoddam corporis robur adipiscuntur, & suæ hæmorrhagiæ summum habent levamen. Ad aperiendam transpirationem, corpusque firmandum conveniunt frictiones leves universales & mane ac sero institutæ, sed semper post cessatam hæmorrhagiam. Veneris exercitio valedicendum est. Et commoda victus ratio instituenda.

§. 17. Quando vero hæmorrhagia fit ab sanguinis acrimonia, hæc corrigi debet opportunis remediis. Victus ratio in primis commoda institui debet, ideoque fructus horæos, olera, atque id genus alios acidiusculos cibos concedere

*Id insum
sequitur.*

tantum potestis. Lac immo, si fieri potest, lactea diæta opportuna admodum est. Hac sola vidi obstinatissima uteri stillicidia curata. Serum lactis cum decoctione cochleariæ, radicis cichorææ, nasturtii, acetosellæ, atque aliarum herbarum antiscorbuticarum copulatum optimum est. Ptisanam, aut aquam antiveneream paratam ex farsa parilla, cortice ligni sancti, & china molli magnum afferre emolumentum sæpe vidi. Quod si cum acrimonia sanguinis copulatur uteri vasorum atonia, tunc aut aquam gurgitelli, aut pisciarelli ad libram semis cum lacte conjunctam, & ad duos tresve menses exhibitam feliciter operari videbitis. Defectum harum thermalium aquarum supplere potest aqua dulcis, in qua pluries ignitum sit extinctum ferrum, aut calcis vivæ aqua rite parata. Aut una, aut altera eligenda sit aqua semper cum lacte est conjungenda. Sive quod hujusmodi aquæ sanguinem salibus vitiosis onustum depurare, sive quod vires digestrices, ut inde commoda evadat alimentorum assimilatio acuire, & erigere valeant, semper mulie-

lieribus stillicidio sanguinis laborantibus propter vitiosam humorum indolem, & aliquam uteri debilitatem non parum emolumentum afferre solent. Qui sirupum sarsæ parillæ ad uncias duas quotidie in sero lactis solutum propinant præscriptis remediis non exhibent efficacius pharmacum. Tandem vulnus vulcusque uteri opportunis remediis alibi (†) indicatis curare potestis. Hæmorrhagia abortum, vel partum excipiens quomodo sit curanda infra audietis.

ARTICULUS III.

Chlorosis. Fluxus Muliebris.

§. 18. **P**Allidus ille virginum color cum Quid chlorosis.
adversæ valitudinis non spernen-

(†) Chirug. medic. P. II. Quando vulnus magnum utero inflictum est magnam hæmorrhagiam, convulsiones, febrim, deliria, inflammationem, gangrænam, & his similia gravia accidentia ut plurimum excipit mors.

uendis symptomatibus copulatus dicitur *chlorosis*, & ut nonnullis placet *icterus albus*. Præcipuum hujus morbi symptoma est faciei, uniuersæque cutis pallor, qui, crescente morbo, commutatur in plumbeum & cereum colorem. Totius corporis inertia est magna, & ad leuem motum, potissimum per acclivia loca institutum labor est multus, atque respirationis anhelitus. In quietem, & somnum magna est propensio, & die advesperascente pedes leui oedemate obsidentur chloroticis. Menstruatio aut penitus deficit, aut non certa periodo guttatim fluit atrocissimis per abdomen vagantibus copulata doloribus. Et quæ parvæ apparent sanguinis guttæ defædatissimi sunt coloris. Videntur indolem corrupti puris referre. Appetitus est depravatus, & ut plurimum pica corripuntur ægræ. Lingua albo velo operitur, alvus est tarda, urinæ albæ aut lateritiæ excernuntur. Hypochondria inflantur. Quando morbus in dies augeatur incipit quodammodo turgere cutis & pedes præcipue præmentis vestigium retinent. Facies, & palpebræ post somnum

Quæ sunt
chlorosis
symptomata.

num mane turgidæ apparent, febricula invadit vespertina. Et crescenti in dies morbo additur chachexia, ac hydrops, cujus finis ut plurimum est lethalis. Hæc omnia phænomena indicant morbum hæ-
rere in universali humorum lentore cum solidorum atonia cupulato. Hujusmodi lentor pendet ut plurimum a suppressa menstruatione plethoram in universo corpore inducente. Et quod mirum est faciei color in primis suppressæ men-
struationis temporibus vividus, floridus, atque intense ruber est, inde sensim sensimque defædari incipit usque dum penitus aut plumbeus, aut cereus appareat (u).

*Horani
symptomata
tum red-
ditur ra-
tio.*

§. 19.

(u) Quando vel optimo sanguine redundant vasa plus justo distendi & dilatari debent. Fibræ vasorum tunicas componentes minorem habent suorum elementorum cohærentiam, ideoque debilitantur. Debilitata sic vasa minori oscillant vi, ideoque fluida ob deperditam vim comprimentem non condensantur, & deficit, quæ intra vasa fieri debet, optima sanguificatio. En ratio cur bonus sanguis in se-
rum

*Chlorosæos
causæ.*

§. 19. Nec degnamus posse aliquando chlorosim fieri ab multa sanguinis effusio-

rum ténax & viscidum abeat, ac pigro lentoque cursu feratur per corpus universum. Quando hic est status circulantium humorum quid mirum si omnia recensita phænomena inde prodeant. Color facile pallidus, plumbeus, & cereus pendet ab ingressu feri & lymphæ intra cutis vascula. Et quo hæc lymphæ est degener, eo color faciei est a naturali mutatus. Vulgatum enim inter medicos est adagium qualem in facie colorem, talem in corpore sanguinem esse. Et ab tanta humorum circulantium visciditate pendet magna corporis ad motum inertia. Nam, quo lente fertur ad caput sanguis, & quo tardior per angustissima cerebri vascula ducitur, eo minor fit fluidi nervei secretio. Et quo humorum per cerebrum ductorum lentor est major eo crescit compressio visceris; ex quo pendet virginis chloroticæ & ad motum inertia, & ad somnum magna propensio. Vivacitatem, & promptitudinem motus, nec non reliquarum corporis functionum pendere a libera humorum circulatione, ac a multa fluidi nervei secretionem, atq. prompta ejus intra musculos derivatione notum ex physiologicis est. Quo in dies crescit humorum visciditas, eo auge-

tur

sione per uterum facta . Reliquum sanguinem post hæmorrhagiam intra vasa
in

tur corporis inertia, & defectum muscularis actionis quotidie excipit auctior humorum lentor, unde ad cohexiam, leucophlegmatiamque sternitur facile via. Sic passim virgines suppressione menstruationis laborantes incidunt in chlorosim, a qua perseverante adhuc morbo, in confirmatam cachexiam, indeque in leucophlegmatiam incidere in praxi observamus. Nunc meæ committitur curationi nobilis virgo, quæ suppressione mensium diu laboravit, & spernens medicorum consilia primum chlorosim, inde cachexiam, demum leucophlegmatiam habuit. Nunc pro metu mortis adimplet exacte medica præcepta, & in meliorem statum quotidie comutatur. Omnimodam curationem brevi suscipere morbum opinor. Nil itaque mirum si languida vis vitæ tantam humorum molem sustinere nequeat, quo efficitur, ut post unum, alterumque gressum labascet corpus quietem iterum accipere optans, & acclivia loca ascendens ægra anhelosam habet respirationem. Hoc pendet ab multo intra pulmones per motum muscularem collecto sanguine, quem debilis vitalis vis cito e dextero ad sinistrum cor traducere nequit,

in crassum faceffere debere ferum §. 20.
dictum jam est . Ergo omnes causæ ,
quæ

quit . Et si aliquæ sanguinis guttæ ab utero
exeunt non nisi corrupti puris indolem refer-
re debent . Veniunt enim e sanguine univer-
sali jam serosam & degenerem indolem naçto .
Vitiosus humor uterum invadens debet neces-
sario ejus nervos irritare , unde hanc eductio-
nem paucarum guttarum comitari necessario
debent atroces per abdomen vagantes dolores .
Hæc , quam Sawagesius *menorrhagiam* vocat
Nosol. T. V. p. 514. morbosa uteri humo-
rum eductio ut plurimum commutari solet in
album fluxum , a quo ulterius , ulteriusque
debilitantur mulieres . Febricula chlorotitis ac-
cenditur advesperascente cum pulsu parvo &
frequenti copulata ab insolito stimulo , quem
cordi , & nervis faciunt vitiosi circulantes hu-
mores , qui stimulus augetur ab ingressu in-
tra sanguinem novi chyli , advesperascente facto .
Hanc febrim amatoriam vulgus sapienter vocat .
Nec mirum est videre hujusmodi ægras con-
suetos averfari cibos , ac inusitados victuiq.
humano inconvenientes res uti carbones ,
calcem , lapides , &c. appetere . Id pendet ab
mala & degeneri succorum intra ventriculum
morantium qualitate . Sic urinæ lateritiæ ex-
cernuntur , utpote quæ veniunt ab impura san-
gui-

quæ mensium suppressionem parere possunt, & chlorosim quoque arcessunt.

Sed

guinis massa. Nec gravi viscerum abdominalium, præsertim jecoris obstructione carent ægræ. Nam difficile est, persistente in corpore tanta humorum visciditate, jecur glandulis, & implicata vasorum serie compositum videre obstructione liberum. Et ex inerti bile, quæ fecernitur ab obstructo jecore non irritantur intestina ad naturalem fæcum expulsionem faciendam, unde alvus tarda evadit. Et ex congesto intra primas vias inerti glutine pendet operculum illud album, quò lingua operitur. Inflantur hypocondria 1. a ventriculi intumescencia flatu surgentis, aut indigestis cibis, 2. ab intestini colon turgescencia a retento aere circa ejusdem flexionem versus hypocondria, 3. a tumore abstracti hepatis, aut lienis. 4. a sympathica diaphragmatis contractione, quam ventriculo dolor excitaverat. Verba sunt cl. Astrucii de morb. mulier. T. I. p. 76. Sic vitiatas secretionibus, excretionibusque, debilitatisque digestionis, chylicationisque actionibus sanguis quotidie crudis crassisque particulis oneratur, augeturque sic circulationis inertia, & ob ulteriorem solidorum imbecillitatem labascunt vires, circulantes humores morantur & stagnant, unde hydrops, indeque mors timenda est.

Sed præ omnibus valet summa corporis quies, ac molle vitæ genus, in crasso, & effæto aere longus incolatus, ciborum crassorum, & difficilis digestionis abusus, diuturna mæstitia, morbus acutus, veneni præsertim gallici susceptio, & his similia. Harum causarum vim in producendo morbo, de quo sermo est, vel parum vobis, meditantibus facile innotescere putamus. Eas facientes hæmorrhagiam causas art. præced. arcessere hunc morbum posse dicere quoque debetis. Quando chlorosis facta est vetustior morbus evadit ex ratione, qua & enatæ obstructions in visceribus imi ventris referari non facile possunt, & menstruatio aut numquam visa, aut suppressa ægre admodum arcessitur. Recens morbus facile curatur, sed facile quoque redit. Curatur chlorosis sequenti modo. In primis est inspiciendum, num graves abdominalium viscerum obstructions morbum comitaverint, quæ si sint, optimum erit ab repetitis aut singulis, aut alternis diebus propinatis emeticis bona curationis auspicia sumere. Post hæc, vigente solidorum imbecilli-

*Chlorosis
curatio.*

tate, & fluidorum inertia fas erit martialia statim exhibere cum gummis saponaceis copulata. Nobis in usu est quotidie exhibere limaturam chalybis ad drachmam unam cum eadem dosi gummi sagapeni copulatam. Hisce pilulis addi potest infusio ligni quassiae pluries de die bibenda. Hoc remedii genus per sesquimensum & ultra protractum obstinatas chloroses curasse experientia vidimus, sed eas chloroses, quæ a suppressa in virginibus fiunt menstruatione. Hoc remedio corroborantur solida, solvuntur fluida, & promoventur menses. Sic laudant datas ferri præparaciones, ut cerussam martialem, dulcedinem martis, antimonium martiale &c. cum extracto cicutaë conjunctum. Quando cum humorum lentore quædam acrimonia copulatur antimonium martiale omnibus præparationibus præferendum est, quemadmodum nos multiplici experientia didicimus. Superiori anno curabamus diuturna abdominalium viscerum obstructione factam chloroticam virginem antimonio martiali, & extracto cicutaë. Annuente tempestate ther

malium aquarum usus concedendus est. Et æstivo tempore balineis frigidis per immersionem institutis haud parcendum est. Aquæ maris balnea summopere profecisse non semel vidi. Ceterum optima chlorosis cura obtinetur recta nonnaturalium rerum administratione. Cibus facilis digestionis eligendus est, nec careat aromatibus, & virtute ciendi urinas. Bonum erit in juribus vitulinæ carnis ebullire apium, petroselinum, nasturtium, daucum, & his similia vegetabilia, quæ eo magis conveniunt, quo leucophlegmatia incæperit. Et in incipiente hydrope optimum erit cum martialibus modo memoratis copulare pulverem aut scillæ præparatæ, aut aselliorum. Hoc in casu aquam maris ad libram semis quotidie epotam egregium remedium esse observabitis. Motus instituendus est modo pedestri itinere, modo equitatione, modo rheda, vel carpento factus. Mane & sero frictiones pannis asperis per totum corpus, & potissimum per abdomen factæ celebrandæ sunt. Aëris elasticioris, ac mineralibus effluviis referti statim seligendus, in quo ægra diutur-

turnum incolatum ducat oportet. Ab animi pathematibus, & præsertim mæstitia, curisque domesticis abhorreat, nec non cum sociis puellis lætam vitam ducat, & si fieri potest matrimonium ineat, venerisque usum instituat chlorotica virgo. Tarda alvus subducentibus est proritanda clysteribus, & somno parum indulgendum est. Caveat ægra tandem a nimia sordidorum ciborum cupidine. Sic curare debetis virginem per suppressionem menses factam chloroticam. Virgini vero chlorosim habenti per hemorrhagiam uteri medicamenta exhibete, quæ articulo præcedenti annotata sunt.

§. 19. Fluxus muliebris alias dictus *fluxus albus* est pertinax, & tæditiosa albi humoris per uterum excretio. Aliquando hicumor est flavus, viridis, aut purifimilis. Et mulieres huic morbo obnoxie debiles evadunt, præsertim si copiosus est fluxus; decolores fiunt, & dysforexiam, bradipepsiam, dyspepsiamque patiuntur. Persistente adhuc morbo in chlorosim, cachexiamque incidunt. Nec caro lenta corripitur fe-

*Quid est
fluxus al-
bus.*

*Fluxum
album co-
mittantia
quædam
sympto-
mata.*

bri, & steriles evadunt ut plurimum mulieres, & si concipiunt debiles, languidos ac immaturos edunt foetus (x). Quando humor ab uteri fundo fluit ut plurimum albus est, & inodorus, nec multum lineos pannos inficit. Macula itaque nec admodum profunda est, nec admodum durabilis. At non raro educitur viridis, aut flavus, & male olens humor, qui aut pus, aut purifimilis esse

(x) Hæc phaenomenorum ratio vel parum meditantibus facile innotescit. Nam ex multo educto humore etiam lymphatico deficit apta fluidorum quantitas irritandis solidis opportuna, quæ idcirco imbecillas edunt oscillationes. Ex quo accidit, ut nec bona sanguinis assimilatio fit, nec debita ejusdem sanguinis quantitas ad cerebrum pro convenienti fluidi. nervei quantitate segreganda fertur. Unde oritur mulieris imbecillitas, & cachexia. Ex debilitata circulatione sanguinis indeq: facta parva fluidi nervei secretionem parva quoque humoris salivalis, & gastrici secretio fit, unde dysorexiæ, dyspeptiæ, bradipeptiæque causa. Et crudo degenerique semper chylo sanguis repletus aptus tunc fit nervis, cordiq: molestam parere irritationem, unde continua fe-

esse videtur . Interim ulcus in utero non persistit , a quo degeneris & vitiosi humoris scaturiginem fieri dicendum est . Hujus morbi sedes est in uteri exhalantibus vasis plus justo debilitatis . Quod an verum sit patet ex sequentibus . Uteri , & vaginæ cavum tenui vapore madefieri naturale est . Hujus

*Quæ est
fluvris al-
bi causa.*

madoris fontes sunt ora vasorum exhalantium, a quibus nonnisi tenuissimus ros exit faciendæ lubricitati internæ superficiæ uteri & vaginæ opportunus . Quando urgentur a sanguine , & admodum dilatantur, tunc admittunt globulos san-

E 3

gui-

febris accendi potest . Et tantum humorum circulantium viscorem excipere quoque solet profunda abdominalium viscerum obstructio , a qua pejora mala timenda esse unusquisque vestrum videre potest . Tandem degeneribus persistentibus undique humoribus nil mirum si incipra sædissimaque sit perennis uteri excretio , atque ob debilitatam generationi inservientium partium conditionem steriles fiunt mulieres . Et si aliquando conceperint fœtus ob alimentî defectum ad perfectam non perveniunt maturitatem . Cetera symptomata muliebri fluxum comitantia & vos ipsa praxis docebit .

guineos, qui trans eorum cavum ducti veniunt intra uterum & vaginam dato in tempore menstruationem facturi (§. 3.). Post educam peculiarem plethoram, & post cessatam vim urgentem vasa hæc exhalantia propria contractione iterum ad naturalem diametrum redeunt. Quando sunt debilitata non possunt pervenire ad talem diametri angustiam, qualis naturalis uteri status requirit, sicque admittunt fluidorum particulas crassiores, & lympham, ac ferum copiosius emittunt, & ita constituitur morbus, de quo nunc sermo est.

Morbi causa alia statuitur.

§. 20. Nec denegamus posse fluxum muliebrem quoque fieri a peculiari vasorum lymphaticorum uteri defectu. Nam sive quod lymphæ moram in propria vasa necens ob quoddam antea positum impedimentum, sive quod propria visciditate infarciens vasa ulteriorem progressum habere nequit, tunc accidit, ut sensim sensimque distendat tunicas, & sibi foras per extrema eorum vasorum oscula exitum faciat. Hæc lymphæ & mora, & loci calore in degenerem indolem commutatur, sicque modo

do

do viridis, modo fusca, modo flava, modo alio prædita colore, sed semper acris & corrosiva excernitur. Hic est ille uteri morbosus affectus, quem auctores (y) dicunt *catarrhum, vel rheumatismum uteri*. Quando exit hujusmodi acris lymphæ labia per frequentem transitum irritantis materiæ tumens calefacta, & non raro ab urinæ contactu ardor excitatur. Hoc præbet aliquando suspicionem de contracta venerea gonorrhoea (z). Nec raro obser-

E 4

va-

(y) Galenus, Arethæus, Musgrave, Sydenhamius, Savvages, Boerhavius, Swietenus aliique clarissimi viri.

(z) Mulieres fluxu albo laborantes modo excernunt aqueum & serosum humorem nec colaratum, nec odorosum, modo excernunt acrem, viridem, flavam, fuscam, ac veluti purulentam fœtidam materiam. Nec raro educunt lac, quod ut plurimum accidit puerperis, quæ ob lactationis sive voluntarium, sive arte procuratum defectum lactis educationem per uterum patiuntur. Quando exit puriformis, & fœtida materies, tunc subest metus aut ulceris, aut gonorrhoeæ susceptæ.

(Go-

vatur acrem hujusmodi lympham ipsa vasa uteri corrodere, & lacerare, & ex veluti facto ulcere tunc exit pus fatidum, a cujus frequenti educatione per vulnus, & per vasa inhalantia intra sanguinem immiffione lenta febris accendi, indeque macies, & mors advenire

Gonorrhoea affectis accidere copiosam viridis, flavæ, ac fuscæ substantiæ per pudenda educationem notum omnibus est). Verum quibus signis sit statuendum mulierem simplici fluxu albo, vel ulcere uteri, ac vaginæ, vel gonorrhoea affectam esse? Non certis rem definitam esse observationibus fateamur oportet. Nam sive ocularis partis inspectio interveniat, sive ad differentiam symptomatum utroque morbos comitantium attendatur, certa rei veritas non elucet. Nam, inspectis pudendis, si observatur aut ex vaginæ ostio, aut ex glandulis Cowperianis, aut ex Graafii lacunis (In his locis ponit Astrucius Gonorrhoeæ sedem) stillare ichor, aut pus, id sane confundi potest cum veteri fluxu albo, cum e fundo uteri & vaginæ guttatim profluunt vitiosi humores, & indicatæ sedes humectantur, non facile distingui potest uterque morbus. Si vero dicas cum gonorrhoea copulari dysuriam, &

flu-

re potest. Hujusmodi affectum uterus ut plurimum concipit ex generali humorum vitio. Vidimus enim frequenter in praxi mulieres, quibus accidit exanthematici, scorbutici, rheumatici, aliorumque id generis vitiosorum humorum intra sanguinem immissio, & nulla de-
pu-

fluxum humoris viridis petias indelebili macula fœdaturi, quod sane abest a fluxu albo, in quo nec ardor urinæ est, nec maculæ petiarum sunt indelebiles etiam a veritate alienum aliquid adferitur. Nam si gonorrhœa est vetusta, ita ut nec viridis humor excernatur, nec ardor urinæ percipitur, (quæ nammodum observare potestis in veteri gonorrhœa affectis, in quibus nonnisi parvæ guttæ albi humoris stillant e pudendis, & nullus ardor urinæ percipitur) dicite, quæso, quomodo hic affectus a veteri fluxu albo distinguere potestis? In hoc morbo etiam humores flavi, vel virides exeunt indelebili macula petias fœdaturi. Et ut nuper admonuimus pundenda, & præsertim labia vulvæ ex frequenti transitu materie irritantis, & degeneris rubere, tumere, & veluti inflammarî possunt. Dum per hæc loca urina transit ardorem summum excitat, & tunc mulieres nulla contagiosa laborant gonorrhœa. Recordor virginis
an-

puratio, hoc uteri sive catarrho, sive rheumatismo laborare. Nec a veritate aliena est vulgaris practitorum sententia, qua docetur ex ventriculi debilitate mulieris fluxum fomitem & incrementum retinere. Nam quemadmodum ex mala ciborum digestionē derivat mala chy-

annorum quatuordecim nondum menstruationem passæ, quæ viridis, & veluti corrosivæ materiæ quotidie e pudendis magnam copiam educebat. Hæc summum ardorem in mingenda urina habebat. Quando meum consilium petiit a morbo vexabatur mensis spatio. Nisi omnis contagii venerei suspicio abfuisset, profecto dicere debuissimus adolescentulam virulenta gonorrhoea esse affectam. Remedia adhibui ad uteri catarrhum curandum, & post duos menses integre virgo convaluit. Neque minus falluntur ii, qui cum Joanne Fernelio *pathol. lib. VI. c. 16.*, Ludovico Mercato *de affect. Mulier. lib. I. c. 15.* cum Iacobo Primerosio *de morb. mulier.*, cum Francisco Mauriceau *malat. de femmes grosses traite anatomique des parties des femmes qui servent a la generation. c. 6.* cum Georgio Baglivo *prax. lib. 2. cap. 8.* aliisq. permultis clarissimis auctoribus adferunt fluxum muliebrem a gonorrhoea distingui

hoc

chylicatio, ita ex mala chylicatione non bona fit in indolem inquilinorum humorum particularum chyli assimilatio. Redundat impuritatibus sanguis, sicque per debiliorem partem, nempe per uterum male affectum eductio vitiosarum particularum fit.

§. 21.

hoc solo signo, si nempe interrogetur mulier an perseveret fluxus albus durante menstruatione? Si adserat affirmative, tunc gonorrhoea laborat mulier. Si adfirmat, fluente menstruatione, album fluxum evanescere rediturum post finitam menstruationem, tunc albo fluxu mulierem laborare dicendum. Hi talia proferentes absque dubio, inquam, falluntur. Nam dum fluit sanguis menstruus & gonorrhoeæ, & fluoris albi humor rubet, nec umquam distingui potest uterque affectus dum cessata menstruatione iterum redit aut fluxus gonorrhoeicus, aut fluxus muliebris. Quando mulieris confessio adest, se ante initium fluxus purulenti nullo uteri morbo laborare, interim suspicionem contagii venerei adesse, tunc de gonorrhoeæ præsentia nullum adesse dubium credimus. Et si hæc deficiunt signa, tunc morbus curandus est iis remediis, quæ dum unum profunt, alteri non nocent morbo.

*Fluxus al-
bi curatio
indicatur.*

§. 21. Morbi curationem in hunc modum oportet instituere. Repetitis emeticis ex ipecacuanha paratis fas est ventriculum, primasque vias inertis obductas materia ante omnia excutere. Deinde salia incisiva, & corroborantia præscribere oportet. Sal absynthii, aut archanum duplicatum cum extracto gentianæ copulatum in usu esse potest. Quando adest magna vasorum uteri atonia martialium usus laudandus est. Celebratissimus est pulvis cachecticus Arnoldi ad drachmam semis, qui cum extracto ligni sancti conjugari potest. Diuturno hoc remedii usu morbus, aut penitus curatur, aut in meliorem statum redigitur. Quando memorata vasorum uteri atonia cum quadam sanguinis acrimonia copulatur vidi maximopere profecisse aquam balsamicam Lemery ad dracmas duas quotidie in larga decoctione ligni guajaci propinatam. Et nostrates medici summo cum fructu in lacte vaccino ponunt aut aquam pisciarelli, aut aquam gurgitelli ad libram semis, & quotidie propinant. Et nos hujus remedii per sesquimensum & ultra pro-
tra-

tracti utilitatem nuper in pulcherrimam virginem fluxu albo laborantem experti sumus. Quando adest summa humorum acrimonia laudari debet aut lactis cum aqua farsæ parillæ copulati, aut antiscorbuticarum herbarum, veluti cichorææ, nasturtii, cochleariæ, acetosellæ, beccabuncæ, & his similibus plantarum, ac feri lactis depuratissimi usus. Superioribus mensibus vidi viduam annorum triginta ab acrimonia humorum veniente albo fluxu vexatam decoctione dulcamaræ, sirupo farsæ parillæ, & lacte vaccino, (quod in formam cænæ fero accipiebatur), integre curatam. Balineorum frigidiusculorum, potissimum annuente tempestate, usus maxime profiguus est. Et levia diaphoretica præscripsisse numquam me pænuit. Aeris humidi, & crassi in elasticum, & siccum mutatio facienda est. Motus aut equitatione, aut pedestri itinere moderatus instituendus est. Cibis optimus, & facilis digestionis comedendus. Et ab veneris exercitio, quantum fieri potest, se debet ægra abstinere. Si adest aut gonorrhoea, aut vulcus in pudendis, quod

quod ex notis signis innotescere potest, cura alibi indicanda mulier medicari debet.

ARTICULUS IV.

Affectio Hysterica.

*Hystericae
passionis
character
adumbratur.*

§. 22. **M**irabilis illa varia, & proteiformis affectio, quæ sola infinitis pene dicam morborum accidentibus obnoxias facit mulieres dicitur *passio hysterica*, quia in utero morbi sedem hæere vulgo creditur. Describere haud rite possumus affectionem tam variis, tamque multiformibus ludentemphasibus institutionum restrictæ methodi inservituri. Rem itaque tantum adumbrabimus. Morbus corripit ut plurimum mulieres opipare viventes, & per varia in animo recepta pathemata, perque mollitiem vitam traducentes. Nec raro accidit videre vel ex plebe mulierculam eodem morbo correptam. Hujusmodi feminæ facile mutantur, & ab uno in alium statum continuo transeunt. Nunc rident & in cachinnis profunduntur,

nunc

nunc absque causa manifesta plorant, & in luctuosum fletum ruunt. Levibus ab causis admodum commoventur, nec rationem tantæ commotionis agnoscunt. Ex levi vento agitantur, & ex parvo audito strepitu contremiscunt. Timent mortem, nec conceptum absque causa mortis timorem facile deponunt, licet evidentibus rationibus demonstratur non esse timendum. Nunc calorem, nunc frigus sentiunt, licet harum affectionum non adsint evidentes causæ. Morbus per paroxysma adfligit, & quando invadit stupendis symptomatibus ludit. Nulla est pars, nullum corporis mulieris organum, quod suam non patitur affectionem. Nunc dolet caput, & ad instar clavi infixi dolor excruciat, nunc vertigines, & aurium tinnitus sentiuntur, nunc suffocationes modo ad instar globi in faucibus hærentis, modo ad instar laquei circa collum ducti habentur a mulieribus. Tussunt pertinaciter hystericæ, & hac convulsiva tussi haud raro ad vomitum concitantur, neque, nisi parum lymphæ, e pectore educitur. Pectus frequenter dolet, & dolor est ad instar styli ferien-

*Quibus
symptoma-
tibus hyste-
rismus lu-
dit.*

tis carnes. Quando cum acuta febre copulatur hic dolor pleuritidem æmulatur. Morbus aliquando sub specie modo cardialgiæ, modo colicæ, modo iliacæ passionis ludit, & cum his accidentibus vomitus æruginosæ materiæ copulatur. Coniux mea est hysterismi verum exemplum, (cujus causa sterilitatem ab ipsa pati inter 15. matrimonii annos puto) & frequenter ab hisce doloribus hystericeis cum pertinaci vomitu veluti atrabilaris materiæ, & cum summa respirationis difficultate copulatis corripitur, a quo ad mortis limen perducitur. Nunc tument hypochondria, nunc murmura magna per abdomen vagantur, nunc filet alvus, nunc urinæ aqueæ ubertim emittuntur, nunc in hepate, nunc in liene, nunc in mesenterio figitur dolor, qui ab uno in alium locum transiens nullam abdominis partem immunem relinquit. Hic dolor hinc inde vagus modo in unam, modo in aliam partem pertinaciter figitur. Vidi haud raro hystericas queri de spasmo doloroso pollicem corripiente. In ingressu hysterici paroxysmi ejulatus emittunt mulieres; & ab imo pectore
fu-

suspiria ducunt. Aliquando penitus internos, externosque sensus amittunt, aliquando advertunt omnia, quæ in paroxysmo fiunt. Contremiscunt undique, & membra hinc inde vehementi, irrequieto, & semper tremulo motu agitant. Et corpus universum tanto extraordinario impetu agitur, & hinc inde e lectulo prosilire contendit, ut vix duos robustos viros continere valere delicatulam mulierem pluries viderim. Aliquando per risum, aliquando per fletum supervenientem solvitur paroxysmus. Nec raro hisce apparentibus redit paroxysmi pertinacior accessus. Aliquando nulla in corpore motio observatur, & sensibus destituta ita immobilis evadit hysterica, ut nisi adesset cordis & respirationis motus appareret mortua. Nec deficiunt casus, in quibus vel ipsi cordis, & respirationis motus penitus extincti appareant, & *hysterica præfocatione* (a) correpta mulier tamquam

F

mor-

(a) Hystericæ præfocationis exempla in præxi frequenter occurrunt. Nam: constrictis ultra de-

mortua habita humi sit commissa. Vigente paroxysmo, pertinaci tussi, cordis magna palpitatione, & vagis per totum corpus dispersis doloribus vexantur hystericae, & spumam ab ore quoque educunt.

*Sequitur
ipsum mor-
bi chara-
cter indi-
candus.*

§. 23. Dies me deficeret si omnia hystericae passionis phaenomena recensere vellem. Soluta paroxysmo languidae & un-

debitum per sympathicam affectionem cordis nervis, ejus motus ita suffocatur, ut, vel adhibita summa diligentia, observari non possit. In hoc statu ob defectum sanguinis circulationis accidit, ut decolora, frigida, exanimis appareat mulier, & tamquam mortua ad sepulchrum conducatur. Hinc merito leges sanxerunt non posse mulieres, repentina morte correptas nisi post horas 48. humi committi. Plurimi enim dati sunt casus commissarum sepulchro mulierum iterum ad vitam reductarum. Astrucius, qui de hoc morbo diserte scribit, hystericam affectionem per stadia, sive tempora invadere ait. Praefocationem uterinam raram & quarti stadii esse affirmat, dum per tria reliqua tempora morbus ludit symptomatum nuper memoratorum varia combinatione. Consul. laud. Auctor. T. I. de morb. mulier. Cap. XIII. p. 277.

& undique laxatæ sunt mulieres, licet ad consueta vitæ munia haud remissa alacritate redeunt. Quando ab utero surgit hic proteiformis morbus ut plurimum manifestæ occurrunt causæ. Nam aut menstruationis perturbatus est ordo, aut uterinæ lymphæ fluxus est vitiatuſ. Feminæ hysterismo subjectæ aut immi-
 nationem, aut suppressionem menstrua-
 tionis habent. Et viduis ob defectum fluxus uterinæ lymphæ veneris usu semper educendæ fit molestior hysteria. Hæc lymphæ a veteribus pro semine ab ovariis educto accipiebatur, quod retentum sicuti alios morbos, ita & hysteriam parere aptum esse adferebant (b). Nos quemadmodum haud cum ipsis veteribus adferimus eandem lympham esse semen ab ovariis defluens, tamen reponimus maximum hystericæ passionis fomitem & causam hujusmodi lympham retentam acrem, & vitiosam factam constituere. Mulieribus, quibus titilla-

F 2

tio

(b) Vid. Gal. de loc. affect. lib. X. c. 12.

tio venerea admodum est molesta, quæque per necessitatem fervant castitatem, molestior est hysterica passio. Hæc ut plurimum furore corripuntur uterino (c). Novi virginem monialem huic morbo subjectam, quæ dum corripiebatur a paroxysmo hysterico se undique denudabat, & obscæna verba tam

tur-

(c) Uterinum furorem patiuntur mulieres a causis quibuscumque proritantibus clytoridem, & cereræ veneræ voluptati addictæ partes. Nec raro accidit, ut ad delirii speciem morbus accedat, quem dicunt *nymphomaniam*. In hoc delirii genere licet ament quoddam objectum mulieres amore vehementi, attamen in venerem furibundæ ruunt. Et postquam per totam diem cum venere litaverint laxæ, ac veluti lipothimia correptæ ab opere discedunt, sed non penitus satisfactæ. Hujusmodi mulieres licet optimum sui morbi remedium experiuntur in matrimonio, quod cum robusto, & mendulato viro inire debent, tamen a diluentibus remediis, balineis frigidiusculis vel in medio hyemis præscriptis, atque id genus aliis humorum acrimoniam temperantibus non levem opem expectare possunt.

turpia proferebat, ut ceteræ moniales, quæ ad ægræ convulsiones accurrebant, horruerint, & fugam inire coactæ sint. Hinc merito Astrucius in laudato loco asserit uterum duplici modo affici debere, ut hysteriam faciat. Altero, quando irritatur ab humoribus quibuscumque vitiosis, & degeneribus, altero, quando organi vasa turgent præ nimio sanguine. In hoc postremo casu cum menstruationis periodis morbus ludere solet (d). Licet non negamus etiam sanguinem menstruum acrem, & irritantem factum posse morbum auctiorem, & sæviorem reddere. Conjux mea diros hysterismi paroxysmos habet imminente, aut fluente menstruatione, qua educitur pauca vitiosi, & degeneris sanguinis quantitas. Nec a veritate admodum alienum est adserere acrem, & irritantem humorem, modo unam, modo alteram uteri partem afficere, nunc uno, nunc alio modo proritare & sa-

F 3

ces-

(d) Vid. loc. cit. p. 280.

cessere, atque alias minori, alias majori impetu nervos visceris afficere &c. varietatem affectionis parere. En ratio cur non uno modo unica mulier a morbo semper vexetur, curque pene omnium hysteriarum symptomata inter se discrepent.

Et in causam hystericæ passionis proximam inquiritur.

§. 24. Nos vero quemadmodum cum cordatioribus practicis adserimus uterum male affectum hystericæ passioni causam, & fomitem sugerere, attamen non negamus huic morbo pariendo requirissimam systematis nervosi imbecillitatem, sensibilitatemque, ac spirituum nervorum constantem ataxiam, quemadmodum Cl. Sydenhamius adfirmat (e).

Hu-

(e) *In diss. epistol. de hystericæ affectione.* Hujus veritatis fundamentum sequenti innititur ratiocinio. Ex fideli symptomatum tum præcedentium, cum comitantium paroxysmum hystericum observatione aperte elucet, nullam adesse corporis partem, quæ morbi tyrannidem non experitur. Universalis morbus convulsivus causam proximam habet iis in partibus, quæ undique per univèrsum corpus fe-

run-

Hujus morbosæ conditionis nervorum status ab quacumque, sive intrinseca, sive

F 4

extrin-

runtur. Duæ sunt hujusmodi partes, aut vasa sanguinem ducentia, aut nervi fluidum nerveum ferentes. Cum autem hystericæ convulsiones ad musculorum motum depravatam pertineant, cumque nos non sanguinem, sed fluidum nerveum motus muscularis causam esse in physiologia fusius ostenderit, patet hystericismi causam proximam esse mollitiem, & sensibilitatem summam nervorum, summamque spirituum ataxiam. Hoc in veluti morbooso statu constituti nervi facile levibus ex causis mutantur, perturbantur, atque irregulari influxu spiritus nervosi musculos convulsiones facturi adoriuntur. Nec a laudabili conjectura admodum alienum est adserere quandam in cerebro hærare mutationem, perturbationemque, qua morbi, de quo sermo est, causa proegumena constituitur, & character hystericus veluti imprimitur, & subinetur. Et quemadmodum epilepsia, vigente hujusmodi caractere in cerebro, numquam curatur, & datis vel levibus ex causis sopita reviviscit, ita passio hystericæ per paraxysmos adtingens numquam, nisi, deleta hoc caractere, curatur, & levibus ex causis temperata recrudescit. Sic intelligitur cur mulieres hystericæ instantaneas in corpore mutationes habeant,

cur

extrinseca causa ad actum incitatur fitque hystericus paroxysmus. Uteri labes ut

cur ex levi caloris, frigoris, odorisque actione admodum perturbentur, cur instabiles sint, cur ex animi pathematibus admodum afficiantur, curque in paroxysmo tantas proteiformes mirasque sustineant phases, quibus omnibus percipiendis explicandisque non sufficeret totius vitæ cursus. Neque dicatur hystericismi proximam causam in utero hæere ex ratione, qua observatur, curato utero, morbum quoque curari; nam id veritati aperte opponitur. Vidi haud raro sævissimo hystericismo subjectis quasdam mulieres & nullam in utero labem gerere. Non dolor viscus occupabat, non menstruationis neque in periodo, neque in sanguinis conditione ulla perturbatio, & labes apparebat. Et licet aliquando per matrimonium conceperint, non fuerunt penitus liberatae. Agit nunc vigesimum septimum annum nobilis juvenis, quæ quatuor filios torosos, & optima præditos sanitate peperit. Hæc ante matrimonium hystericæ erat, & post matrimonium, atque filiorum generationem hystericismo laborat. Ludit morbus per risum & chinnos, in quos tam vehementer per duos tresve dies integros profunditur, ut omnibus adstantibus commiserationem faciat. Et per paroxysmos non certo anni tempore morbus adfigit.

Per

ut plurimum morbum arcessit. Quando enim lymphæ, aut sanguis vitium tale conceperit, quale par est uteri nervis irritationem communicare, tunc per sympathiam modo corpori toto, modo uni, modo alteri parti communicatur affectus, & hystericus paroxysmus in scenam venit. Sic ciborum indigestiones, & eorum reliquæ degeneres factæ
pri-

Per hos continuos risus enata est bronchoceles, quæ sui vultus venustatem deformat. Hæc nunquam uteri functionum læsionem habuit ullam. Ceterum sana est, & multa pinguedine carnes operiente gaudet. Neque nos denegamus uterum ut plurimum hystericæ excitandæ causam esse. Nam quæcumque sit illa uteri labes sive in humorum vitiata qualitate sive vitiata quantitate hærens, semper irritatis nervis visceris per sympathiam cunctis corporis partibus irritatio communicatur. Nervi enim uteri sunt a magno intercostali, qui cum toto corpore consensum, & commercium habet. Verum ad excitandos huiusmodi per totum corpus miras convulsiones requiritur in cerebro morbosus character, & in nervis summa debilitas, magnaque fluidi nervei ataxia. Quod sive per artem, sive per naturæ opus,

primarumque viarum fordes etc. nervos irritare aptæ id ipsum pariunt. Sic medicamentum, potissimum catharticum irritans hystericas parit convulsiones. Sic frigus instantaneum, instantaneusque calor, impedimentum perspirationis, odores suave-olentes, atque id genus alia vel levia accidentia morbum advocant. Verum his omnibus efficiora sunt animi pathemata, a quibus in sævissimos hy-

opus, sive per status mutationem, sive per aliam quamcumque causam tollitur a cerebro hystericus character, & nervi roborantur, tunc hystericæ mulier integre curatur. Et quæ mulieres per matrimonium perque filiorum generationem aliquando curantur, hoc obtinent beneficium non tantum propter mutatam uteri conditionem, correctionemque lymphæ uterinæ, & menstrui sanguinis, sed propter mutatam cerebri, & nervorum conditionem advenientem tum ab animi hilaritate, quæ cum veneris exercitio copulatur, tum ab auræ seminalis frequenti intra corpus immisione, qua cerebrum, nervosque corroborari sole-
 re cunctis innotescit. Plura hac de re dicere vetat restricta institutionum methodus.

hystericos insultus mulieres incidere passim observamus. Timor, mæstitia, pavor, commiserationis idea, & his similia mulieres atrocissimis hystericis convulsionibus addicit. Et hystericus accessus eo sunt frequentiores, quo timor sæpius, vel absque causa, aliquando eas corripit. Neque inficiari potest non raro paroxysmum sæviorem advenire absque ulla apparenti causa.

§. 25. Signa, quibus morbus hystericus cognoscitur patent ex hæctenus expositis. Unicum dubium, quod in exercenda praxi vos perturbare potest, est quando distinguere hystericismum ab epilepsia debetis. Utrumque morbum pene æqualia comitantur symptomata. Nos credimus rem ita absolvendam esse. Cum hystericu insultu numquam oris spuma, quæ passim cum epilepsia copulari observatur. Sensus interni externique non eodem modo in hystericu, & epileptico insultu amittuntur. In hoc ita pereunt, ut si ægri corpus in ardentem iniiciatur fornacem, totum absque ullo advertentiæ signo coburitur. Solutu paroxysmo hystericæ naturali faciei colore, bo-

Quibus signis cognoscitur hystericismus.

bona corporis alacritate, licet parum sint laxæ, ad consueta redeunt vitæ munia. Ab epileptico insultu evasæ mulieres pallidæ observantur, & stupidæ more ebriorum, nec nisi summam laxitatem in toto corpore sentiunt. Et haud raro finit morbus in cujusdam partis paralyfim. Verum non negamus hujusmodi symptomata cum hysteria aliquando quoque copulari, tunc fit morbus, quem vulgo dicunt *epilepsiam uterinam*. Quando hysterica passio transit in uterinam epilepsiam interficere potest. Sic intellegimus cur aliquando extremis fatibus hysterica passione quosdam laborantes mulieres cesserint. Ceterum simplex hystericus affectus numquam interficere solet. Licet vitam tædiosam, & undique ærumnis plenam hysterica ducant. Nulli est dubium per hanc affectionem aliquando fluida, & solida quodammodo vitiari, unde aut chronicus, aut acutus lethalis morbus oriri potest, ex quo suæ vitæ finem attingit hysterica mulier.

*Hysterica
passionis
prognosis.*

*Hysterica
passionis
curatio du-
plex est.*

Duplici ratione hic est morbus curandus. Altera in paroxysmo, altera institui oportet extra paroxysmum. In pa-

roxyfmo fi ſenſus deficiunt , procurari debet ut ægra duros in obices non incidat, a quibus aut cranii , aut alius partis fracturas , contuſiones , vulneraque accipere poteſt . Deinde videre eſt an ex fætidis fumis aliquod emolumentum ab ægra ſentiatur . Nam ab his non ſemper levamen expectatur . Coniunx mea ab fætidis fumis accipit paroxyfmi acceſſum, & ab iifdem recipit paroxyfmi exacerbationem . Ceterum quando ſcimus hos fumos levamen afferre ſolere ex ratione , qua nova in nervis motio morboſæ adverſa excitatur, tunc charctam , lanam , calceamenti ex exiccato bovum corio confeſti fruſtulum , pilos , aliaque id genus corpora comburenda ſunt, & ſub naſo ægrotæ ad excipiendum fumum debent collocari . Adhibent non ſine fruſtu quoque mulieres olei , vel tincturæ ſuccini, aut rutæ , aut artemiſiæ , aut alius fætidiæ herbæ odorem , & ſi deglutiri poteſt dant manducandam contritam nivem oleo ſuccini imbutam ; quod non reprobamus . Si vehementes ſunt convulſiones , diuque videantur durabiles leves ligaturæ

*Altera in
paroxyfmo.*

ad

ad articulos faciendæ sunt, & plantis pedum opium frictione adhibendum est. Quando non multum convulsivis motibus corpus agitur, phlebotomiæque locus concedi potest, tunc sanguis mediocri quantitate est educendus. Mulierem undique convulsivis motibus vexatam non esse arctis vinctulis custodiendam suadet illa ratio, qua in praxi videtur ægras post cessatum paroxysmum ab hujusmodi artificiosis vinctulis, quam ab ipso morbo majorem incommodum accipere. Mihi in usu est nil in paroxysmo hysterico meæ conjugis operari. Custodiendam ipsam jubeo hac lege, ut ne hilum quidem constringant ipsius corpus, sed tantum impediunt, ne in durum obicem irrumpat. Credo enim sibi ipsi naturam in illis motibus convulsivis excitatis medicinam parare, qua paroxysmi solutionem sollicitam procurat. Omnia artis molimina frustranea immo & noxia ipsi sunt.

§. 26. Soluta hysterico paroxysmo sedulo est moliendum, ut non redeat. Huic obeundo fini oportet nervosi systematis firmitudinem procurare, ac tol-

*Altera ex-
tra paro-
xysmum
tentanda
est.*

lere

lere a cerebro impressum hystericum charactarem nuper (f) indicatum, & si qua sint uteri vitia tollere, aut saltem emendare. Sed hoc opus, hic labor? Ante omnia oportet primarum viarum statum, & menstruationis conditionem inspicere. Ut plurimum viscor obsidet ipsas partes, & menstruationis aut suppressio, aut imminutio, aut perturbata periodus, aut ab eodem viscore vitiato uterum inundante unice derivat, aut ab ipso fomitem recipit. Hisce apparentibus bonum est ante omnia repetitis lenibus emeticis corpus excutere, & hujus viscidæ acrisque materieï educationem sollicitam procurare. Cathartici potissimum penitus est vale dicendum; & si alvus lubricari oportet folis emollientibus clysteribus, vel saltem levissimis eccopotricis magnesia nempe niri, pulpa cassiæ recenter extracta, & sero lactis depuratissimo, aut his similibus innocentibus remediis eam solvere convenit. Docodtiones rutæ, artemisiæ, ma-
jo-

(f) §. 24. nota.

joranæ, chamædrios, peoniæ, chamæmeli,
 & his similibus herbarum aut simpli-
 ces, aut cum sero lactis depurato hy-
 stericis mulieribus suppressione, vel im-
 minutione menstruationis laborantibus
 non sine fructu nostrates propinant. Lau-
 dant quoque summopere pulverem de
 guttata Riverii, castoreum, mirrham,
 succinum, sal volatile viperæ, quorum
 pulverum conjunctionem cum extracto
 chinchinæ faciunt, eosque per sesquimen-
 sem & ultra propinant. Nos quemad-
 modum hæc remedia penitus improbare
 non audemus, ita lubenter fatemur ab
 opio, moscho, valeriana sylvestri, & li-
 quore anodyno Hoffmanni efficaciorera
 medicinam pro hysterica affectione posse
 vos habere. Quotidianis enim experimen-
 tis diu cognovi indicata nunc remedia non
 raro morbi integram curationem fecis-
 se (g), sive quod hæc remedia novam

(g) Plures casus veritatem hujus effati osten-
 dere possent, sed inter omnes valet sequens.
 Nobilis juvenis annorum 30. post susceptum
 timorem vehementem in tantas sævissimas hy-
 ste-

in nervis morbosæ adversam mutationem faciant, sive quod fluidi nervei ataxiam tollant, sive quod cerebrum, nervosque in aliam conditionem commutent, & earundem partium robur procurent, sive quod per vim operentur specificam, certum est hystericæ passionis eradicativam curam ab ipsis remediis posse expectari. Nobis in usu est pulveris valerianæ sylvestris drachmam unam accipere, & cum decem granis moschi electi, & cum quindecim guttis liquoris anodynii copulare, & in pilulas cum extracto ligni visci quercini redigere. Harum pilularum usum per plures menses pratrahendum jubemas. Ceterum haud denegamus serum lactis de-

G

pu-

stercas convulsiones incidebat, ut haud raro videretur morti proxima. Adhibebantur efficaciora ex artis penu desumpta præsidia, sed omnia incassum fuere adhibita. Post duos annos, in quibus morbi tyrannidem virgo experiebatur, ita a convulsionibus vexata fuit, ut contractis manibus, & pedibus harum partium motu integre privabatur. Vixit per sex menses in lecto jacens articulationum motibus orbata

puratissimum, lac ipsum, immo ipsa lactea diæta, balnea frigida per sex menses & ultra protracta, & his similia, ex eo quia ab humoribus quamcumque tollunt acrimoniam, novamque in nervis in-

bata nobilis virgo. Dictu impar est, quantis convulsionum phasibus esset, misera ægra subjecta quando meum petiit consilium. Post auditam morbi historiam statim unum, & alterum leve emeticum imperavi, & pulverem valerianæ sylvestris cum liquore anodyno copulatam post emeticorum actionem sumendam jubbam. Sero advesperascente emulsiones frigidorum majorum cum additis papaverum seminibus in loco cœnæ bibendas concedebam, & clysteres emollientes præscribebam. Post hujus remedii usum per mensem protractum convulsiones in diem evadebant temperatiores, ac quadammodo cessaverunt, & ægra in statum reperièbatur e lecto exire, & gressu licet dubio per cubile ambulare. Manus motum quoque recuperavit, & qui erant antea contracti solvebantur digiti. Menstruatio, quæ antea irregularis erat ordinata fiebat. Sic virgo & a morte, & ab articulorum contractione, & a crudelissimis convulsionibus ab indicatis remediis libera evasit.

inducunt mutationem, possunt morbum penitus curare. Quando cum hystericismo copulatur mensium suppressio, tunc levia emmenagoga præscribi possunt. Ex his eligenda sunt illa, quæ contra causam indicatæ suppressionis agunt. Sic v. g. quando morbum facit magnus sanguinis viscor, seligere potestis mirram, moschum, & pulverem artemisiæ. Vidi summopere profecisse cerussam martialem ad drachmam semis cum mirra copulatam. Hæc remedia per plures menses dari possunt cum balneis frigidis, cumque decoctionibus chamæmeli interne sumptis conjuncta.

§. 27. Sed hystericam passionem præcipue curat recte non naturalium rerum administratio. Absit ab animo hystericæ quæcumque mæstitia & timor, solique voluptati, & lætitiæ vacet. Motus est instituendus modo pedestri itinere, modo equitatione, & si fieri potest, peregrinatione, qua sola novis semper ideis animus delectatur, & corpus per susceptas frequenter concussionem roborari potest. Ducat suum incolatum ægra in loco, qui sit undique aere campestri, &

*Sequitur
hystericæ
passionis
curatio.*

vegetabilibus effluviis repleto perflatus. Cibus debet esse pene semper vegetabilis, & facilis digestionis, nec aromaticus, nec multum spirituosis particulis infectus. Optimus semper est frugalis, & quando sumi debet haud raro accipiatur cum lacto, & debachanti hominum congressu, a quo enascitur in animo voluptas, quæ procurat manducati cibi facilem digestionem. Matrimonium, si possibile sit, ineat cum amato viro hysterica virgo, cumque eo cohabitaret ad finem filios concipiendi. Ut plurimum enim, veneris usu, & filiorum procreatione curari hystericam passionem experientia constat.

ARTICULUS V.

Graviditatis incommoda.

Describuntur præcipua graviditatis incommoda

§. 28. **M**ulieres virgines multis morbis sunt obnoxia. Sed in conjugali statu constitutæ ob graviditatem, partum, puerperium, & lactationem multa quoque incommoda patiuntur. De his dicere institutionum ratio postulat. Agemus primo de incommodis

gra-

graviditatem comitantibus. Quando concipit mulier ob mutatam uteri conditionem plurima morbosa accidentia patitur, quæ tam varia & multiplicia sunt ut medicis observantibus summæ sint admirationi. Tota machinæ commotio in principio graviditatis indicat novum ens incipere vivere & vegetare in visceribus, in quibus est elaboratum. Hinc nova a natura instituitur cura, novæque parantur directiones pro viventis propagatione. In tanta igitur corporis mutatione nil mirum si in graviditatis initio sequentia patiatur incommoda mulier. Nauseant præ primis consuetos cibos, & avidè cupiunt inusitados, atque acida conditione præditos. Tussunt, vomitant & aliquando pertinaciter, a quibus incommodis ut plurimum post quartum mensem liberantur. Licet haud raro ad usque partum iisdem vexantur morbis. Turgent mammæ non sine dolore, cessat menstruatio, & a vago per stomachum, per renes, per lumbos, per inguina, per pubem vagante dolore excruciantur. Syncope, & dyspnæa noctu potissimum affligente laborat initio suæ

graviditatis amicissimi mei conjux juvenis pulchra, quæ, hoc signo adparente, quatuor vicibus suam prædixit graviditatem, & quatuor robustos bonaque præditos sanitate peperit filios. Vertigines, aurium tinnitus, alvi stipticitas, urinæ decolores frequenter eductæ, animi morositas, vitæ tædium, corporis inertia, universalis languor, faciei pallor, & non raro hystericæ adparentes convulsiones, atque nonnulla alia multiplicia incommoda conceptionis signa sunt, prout frequenter in praxi observatur. At minime denegamus hæc signa non raro esse fallacia, & graviditatem minime indicare valere (h). Quando legitima &

ve-

*Non sunt
certa gra-
viditatis
signa.*

(h) Credunt medici tam varia morbosa accidentia graviditatem comitantia pendere debere ab uteri nervorum motione, quam ab adveniente novo corpore, scilicet ovo fecundato recipiunt. Habent hi nervi per corpus universum commercium, & possunt, modo uni, modo alteri parti nunc una, nunc alia ratione affectionem communicare. At & id ipsum accidere potest ob alias causas, nempe

ob

vera est conceptio crescit in dies uterus, & distendit, comprimitque viscera in abdomine contenta, ex quo alia adparare solent accidentia. Corporis gravitas magna est & ad parvum motum summa debilitas. Omentum majus sursum urgetur, & non parva apparet spi-

G 4

randi

ob lympham, aquam, mucum, sanguinemque intra uteri vasa morantem, quemadmodum in menstruationis suppressione fieri solet, aut in alio morbo uteri stato, nempe obstructione, hydrope etc., & tunc apparere possunt graviditatis symptomata, quæ vel solertissimum in praxi medicum decipere solent. En ratio cur frequenter occurrant medicos quærentes certa graviditatis indicia. Et quantum adhibuerint diligentiam in tantum momenti re statuenda, non nisi frustranea evadit sedula attentio. Superiori anno in conjugata juvene apparuerunt omnia graviditatis indicia, quæ cum sensim crescente uteri abdominisque tumefactione ad usque septimum mensem duravere juvenis maritum haud imperitum medicum deceptura. Ad finem septimi mensis noctu aperiebatur uterus, & tantum fatidi subluridi sanguinis copiam educebat, ut morti proxima mulier redderetur. Neque quantum videre potui intra humores

ab

randi difficultas. Pedes, & vulvæ labia inflantur, varices in crure apparent, hæmorrhoides vexant, urinæ mingendi frequens & molestus conatus oritur, nec non alvus difficilis evadit, & induratis admodum fæcibus multum dolet. Hæc signa dependent ab magna uteri compressione.

ab utero eductos aliquid apparuit organizatum. Tota materia erat fluida, fætidiſſima, nigricantiſque coloris. Hoc advenit juveni poſt duos genitos filios bona præditos ſanitate, & ſigna, quæ apparuerunt erant penitus ſimillima illis, quæ duas antehabitas graviditates comitaverunt. Stricta institutionum ratio non patitur omnes recenſere cauſas indicantes graviditatis ſignorum fallaciam. Vos, adoleſcentes, cauti extote in determinanda hac re, quæ nunquam certis definiri poteſt ſignis. Mihi in uſu eſt dicere certitudinem graviditatis non niſi poſt ſextum meſem, quando nempe fœtus motus incipiunt in utero fieri, & a matre, medicoque explorante percipiuntur, apparere. Vos non ſpernere debetis apparentia conceptionis ſigna, ſed tantum ab his viſis concipere ſpem graviditatis poteſtis, quanta ſufficit, ut prudenti operatione & mulieris vita, & veſtra exiſtimatio
in

pressione supra intestina, & vasa abdominalia venosa, in quæ conrivare non libere potest sanguis a pedibus & a podice redux, unde fiunt pedum oedemata, varices, & hæmorrhoides. Dyspnæa accidit propter impeditum descensum diaphragmatis intra abdomen, a quo parum pectoris cavitas dilatatur, & ægre a dextero ad finistrum cor transit per vias pulmonales sanguis.

§. 29. Hisce apparentibus graviditatis symptomatibus occurrere potestis lenibus, & prudenti methodo institutis remediis. In graviditatis initio tussis, vomitus, singultus, aliasque convulsio- num species ægré admodum, nisi completo quarto mense, compefcere potestis. Sat erit contritam nivem cum aqua the-

*Quomodo
medicari
debent gra-
viditatis
incommo-
da.*

in tuto collocetur. Consulite Dominos Denys *over het ampt der vroedmeester*, Mauriceau *Traité des malad. des femmes grosses*, Leuret *l'art des accouchem*, Roulin *instruct. sur la maniere de recueillir les enfans*, De La Motte *traité des accouch.* aliosque gravissimos de arte obstreticandi scriptores.

theriacali copulatam mane, & circa meridiem manducandam imperare, & advesperascente die aliquot liquoris anodynii, aut laudani liquidi sydenhamii guttas in decoctione chinchinæ bibendas. Dyspnæam, & syncopem phlebotomia prudenter in manibus ægræ instituta curare solet. Stricta alvus clysteribus simplici aqua institutis, esu olerum, & frustum horæorum, nec non cochlearibus olei olivarum inter manducandum sumptis, & his similibus laxanda est. Evitentur sedulo vel ipsa cathartica eccoprotica, quæ ob irritationem intestinis, indeque utero factam possunt abortum arcessere, qui in graviditatis initio facile advenit. Si adest quædam sanguinis acrimonia aqua anti-venerea, sero lactis depuratissimo, anti-scorbuticarum herbarum usu est tollenda. Ceterum gravida mulier potissimum primis conceptionis diebus debet laudabili victus ratione uti, & si qua sit desiderium circa datum cibum ipsum sollicitè expleri oportet, ne perturbata mulieris phantasia tenerrimam embryonis, aut foetus machinulam perdat. MOTUS

rus sit temperatus, & semper evitari debet concitator & vehemens. Saltus, choræa fortis, concussio aut per proprium, aut per communem motum procurata, & his similia penitus sunt interdicens. Caveat gravida ab animi pathematibus, potissimum fortioribus, a quibus ut plurimum abortum fieri frequenter in praxi observatur. Loricarum ossibus balenæ, & ferris concinnatarum usus penitus abiiciendus est, & simplici vel laxè pectus abdomenque circumambiente fascia uti convenit. Quando vero in ultimis gestationis temporibus reperitur femina, tunc nec oedemata pedum, nec alios podicis, vulvæ, vel aliarum partium tumores, nisi post partum, ablata pressione, tolli possunt. Convenit autem per repetitas, sed semper prudenti manu factas phlebotomias tantam plenitudinem quodammodo exonerare, nec inutile erit datum corporis situm servare. Sic v. g. nec semper erecta perpendiculariter esse, nec semper sedere debet mulier in ultimo gestationis tempore constituta. Et quando sedet utatur necesse est elatiori cubile,

ne

ne curva machinæ positione foetui molestiam afferat. Bonum est nimiam uteri abdominisque distentionem oleo amygdalarum dulcium, aut simplici, aut cum butyro infuso copulato super totum abdomen inuncto mane & sero aut tollere, aut imminuere. Et aliquot olei olivarum depuratissimi cochlearia aut summo mane, aut inter manducandum interne per aliquot dies sumpta non levem afferre solent opem. Caveat diligenter gravida ab anteriori lapsu, in quem proclivis est ob grave pondus, quod in utero gestat, cujus ratione ipsius machina a linea directionis facile declinat. Si alvus est stricta clysteribus simplici aqua institutis laxari debet, & semper utile est moderatam victus bonæ conditionis quantitatem ingerere. Quando vitiosa saburra primæ viæ onerantur, eam educere convenit magnesia nitri, cassia recenter extracta, atque alio dulci eccoprotico sumpto. Numquam me pænuit eccoprotica inter manducandum adultum foetum gestantibus præscripsisse. A cibis enim irretitæ remediorum particulae moderate solvunt avum, & nullam

lam interim utero molestiam creant.

§. 30. Sed alia graviora incommoda prægnantes manent. Ipsæ enim non raro uteri hæmorrhagia, & morbis corripuntur acutis. Quando accidit hæmorrhagia ut plurimum abortum sequitur. Multis ab causis oriri potest isthæc hæmorrhagia. Frequenter fit a separatione placentæ ab utero, qua rumpuntur plurima vasa, quibus cum utero nectitur placenta, & sanguinem effundunt. Quando partus est legitimus, & naturalis semper cum hac hæmorrhagia a laceratione memoratorum vasorum orta copulatur. Heic vero non de illa hæmorrhagia, quæ partum sequitur, sed tantum de ea, quæ primis & mediis gestationis mensibus apparet, sermo est. In hisce temporibus, sive ob uteri imbecillitatem, qua haud substineri potest vel leve pondus, sive ob sanguinis acrimoniam tenerrimas fibras aut placentam cum utero, aut cum placenta chorion connectentes corrodentem, sive ob casum, obque alias violentas percussiones utero inflatas, sive ob gravia animi pathemata, sive ob extra vires protractum motum, sive ob
alias

Graviditatem comitari solet hæmorrhagia uteri.

alias quascumque causas uteri cum placenta conjunctionem solventes hæmorrhagia arcessitur. Sed potest quoque funiculus rumpi umbilicalis, cujus ruptura vel matris, vel foetus culpa accidit. Quando uterus est debilis post secundum, tertium, vel quartum, & aliquando etiam post sextum mensem incipit e pudendis stillare sanguis, qui sensim, sensimque aucta copia per aliquos dies educitur. Et una die magnam advenientem hæmorrhagiam cum gravi dolore, per lumbos & abdomen vagante copulatam tandem excipit abortus. Licet verum sit aliquando apparentem sive stillicidium sanguinis, sive hæmorrhagiam vel paucis adhibitis remediis compesci, & ad perfectam inde maturitatem fatum perducere. Hoc accidit ex aut simplici dehiscencia, aut ruptura vasorum illius partis uteri, cui non adhæret ovum. Sed acuta febris frequenter hæmorrhagiam parere solet. Sive quod augetur per febrim humorum circulatorius motus, sive quodprehenditur uterus veneno, quo undique perturbatur ipsius œconomia, sane per adve-

GRAVIDITATIS INCOMMODA. III

advenientem acutam febrim uteri acci-
dere solet hæmorrhagia, quam frequen-
ter abortus sequitur. Hujusmodi sive
sanguinis stillicidium, sive hæmorrha-
giam compescit corporis, animique quies.
Debet enim ægra in lecto, horizontalem
situm servando, jacere, & ab omnibus
curis, animique agitationibus arcere.
Phlebotomia in manibus instituta, ma-
niluvia frequenter adhibita, frigida hæ-
ustus, chinchinæ decoctiones mane, &
fero propinata multum conferre solent.
Albumen ovi cum spiritu vini edulco-
rato conquatatum pluriesque de die co-
chleatim sumptum in imbecillitate uteri
non parum profecisse vidi. Ethyopem
vegetabilem ad grana decem cum pul-
vere cascarillæ, vel opium ipsum ad
grana duo cum simarrhoubæ decoctione
conjunctum ad instar incantamenti ope-
rari pluries expertus sum. Admovent
lumborum regioni mulierculæ emplastrum
de pice navali confectum, quod penitus
haud improbare soleo. Ad febrim, si qua
sit, debellandam animus est convertendus.
Hinc post institutam phlebotomiam ad-
hibitis levibus eccoproticis clysteribusque
emol-

*Remedia
uterinam
hanc hæ-
morrhagi-
am s-
tentia.*

emollientibus, nec non diluentibus, & temperantibus, ex sero lactis depurato, & sale polychresto potissimum elicitis, feбри adhuc persuerante, ad corticis peruviani usum animus convertendus est. Atque in horum remediorum administratione fidentius insistendum usque dum cum finita feбри compescatur hæmorrhagia. Et haud dissimili ratione tractanda est gravida mulier ab acuto morbo quocumque correpta juxta reliquorum medicamentorum administrationem. Methodus ergo est sequens.

Gravidarum acuti morbi quomodo tractari possunt.

§. 31. Acuti morbi in gravidis advenientes duplici ratione periculosi, & forsan lethales esse possunt. Altera quando per ipsum tenerrima fœtus machinula interficitur, altera quando victus tenuis acuto morbo opportunus non alit fœtum, cujus mors matri quoque obest (i). Igitur debet gravida ægra potiss-

(i) *Mulierem utero gerentem capi ab aliquo morbo acuto lethale est. Hipp. verba sunt aphor. lib. V. n. 30.*

tissimum altioribus graviditatis mensibus panatellam, horæos fructus, cocholatium, jura vitulinæ carnis omni pinguedine orbata, atque aliquot limoniorum succi guttis infecta sumere. Mihi in usu est hydrogalam propinare, quæ si pluries, sed parva copia sumitur & stomachum non gravat, & opportunum matri, foetuique dat nutrimentum. Quando mittendus est sanguis attendi sedulo debet ad morbi indolem, & præcipue ad ægrotantis vires. Nam fortis mulier gravida & indolis inflammatoriæ morbus copiosam sanguinis quantitatem educi patitur, licet id fiat partitis vicibus. Hoc quotidianis experimentis innotescit, & adversatur illo Hippocratis effato, quo docetur, *mulierem gravidam, misso sanguine, abortire, magis si grandior sit foetus* (k). Emetica, & cathartica ea

H

ra-

(k) Aphor. lib. V. n. 31. Veteres ad usque animi deliquium sanguinem detrahebant. Certe in quocumque graviditatis tempore si multam simul & semel sanguinis quantitatem mulier educit abortum patitur. Sic crederem

ratione conveniunt, qua exonerata a primis viis vitiosa saburra, liberior inde evadat circulatio, fitque apta ad crifim dispositio. Et, si observationibus præstanda est fides, sancte vobis testari possum, adolescentes, emetica levia ex infusione ipecacuanhæ parata in primis putridæ febris, aliorumque id genus acutorum morborum diebus, quocumque in graviditatis tempore summopere profecisse. Neque ullus est in iis exhibendis abortus timor, dummodo propinatur prudenti manu, & iis in casibus, in quibus vitiosa saburra primas occupat vias. Et cathartica eccoprotica pariter conveniunt, licet in iis exhibendis cautio habeatur, ut non multam intestinis, indeque utero irritatio fiat. Semper
bo-

Hippocratem phlebotomiam, præsertim in adultiori gestationis tempore, damnasse. Nos sanguinem semel, iterum, tertio, ulteriusque in gravida detrahimus, sed semper repetita, & parca copia id facimus attendentes sedulo semper ad morbi conditionem, ægrotantisque vires.

bonum est cum multa aquæ quantitate copulata ea exhibere . Et vespèri ad compescendam perturbationem, aut ab emetico, aut ab cathartico excitatam paregoricum ab aqua theriacali liquore anodyno Hoffmanni, aut laudano liquido Sydenhamii infecta, aut ab emulsionibus frigidorum majorum cum addito papaverum semine, aut ab his similibus elicatum exhiberi debet (1) . Clysteres emollientes & leviter subducentes pariter commendari solent . Diaphoretica, & diuretica, dummodo cum diluentibus

H 2 tibus

(1) *Utero gerentes sunt medicande, si materia turget, quarto mense & usque ad septimum, sed hæc minus, juniora autem & seniora cavere oportet* Hippocratis aporismus est sect. IV. n. I. In hujus effati commendationem ait Galenus fœtum in utero comparari debere fructui in arbore existenti. Hic fructus in initio suæ evolutionis, & in sua maturitate facile decidit. Quando in principio ovuli cum utero conjunctionis, & in perfecta fœtus maturitate metus est ne fiat abortus ob irritationem utero communicandam, caveri semper debet a medicamento purgante, dummodo non

tur-

tibus jungantur, quoque conveniunt. Chinchinæ usus summopere laudandus est, cujus corticis pulvis exhiberi debet eo modo, quo alibi (m) a nobis notatum est. Convenit quoque ipsum pulverem cum archano duplicato, cum magnesia nitri, cum sale polychresto, & his similibus incisivis, & antifebrilibus salibus copulare. Gentianellæ usum quoque utilem observavimus. Balnea frigidiuscula summopere commendamus, quorum virtus nuper in septimi mensis gravis juvene putridorheumatica febre correpta cum summa animi oblectatione experti sumus. Sed advertendum est, ne ægra in balneo immergatur dum uterus sanguinem effundit, & adest abortus metus. In putridis, & biliosis febribus magnam quoque utilitatem afferre solent

turget materia, idest morbi causa irrequieto motu acta in nobili organo irrumpere minitatur. Verum nos in quocunque graviditatis tempore eccoproticis tuto utimur, nec unquam abortus accidit.

(m) In lib. de febrib. p. 86.

lent acida mineralia , cujus non parva quantitas quotidie epota ab orci faucibus non semel ægras liberavit.

ARTICULUS VI.

Falsus Conceptus. Abortus.

§. 32. **C**ONceptus falsus fit quando Quæ est virginum mola. loco foetus collocatur in utero informis massa, quæ veluti carnosâ moles vocatur *mola*. Molarum origo, indoles, & eas expellendi methodus, quoad institutionum angustitiæ finunt, obiter nobis est describenda. Duplex datur molarum species: altera quæ in virginibus fit: altera est, quæ in conjugatis observatur. Quæ in virginibus fit ex coagulato sanguine uteri compressionem obtinente derivat. Quæ in conjugatis observatur per veneris usum a perturbata conceptione proficiscitur. Quando sanguis venit in utero menstruationem potissimum facturus morari potest in cavo uteri, dum per quamcumque causam clauditur ipsius uteri os. Sanguis naturali & violenta ad

*Molarum
virginum
causæ.*

se coagulandum tendentia extra vasa ductus in cavo uteri sensim sensimque cohæret, & in formam duræ massæ colligitur. Atque coagulatus sanguis in utero magis densatur, expressis fluidioribus, cujus massæ apex in collo uteri hærens minus compressa mollior est reliqua parte in fundo uteri collocata, quæ semper durior reperitur. Hæc massa uterum quodammodo irritat, qui ad contractionem adigitur, sicque disponitur massa ad datam concipiendam formam. Et sensim sensimque per sanguinis particularum adjectionem crescit in magnam molem uterum distendentem, & graviditatis veluti symptomata ostendentem. Tandem ob advenientem fortem uteri contractionem expellitur, & hæc est virginis mola nil fibrosi, aut carnosi, sed tantum coagulati sanguinis massam ostendens. Sed potest quoque in virginum utero sarcoma fieri, cui sanguinis coagulati portio adhæret, & hoc sarcoma educitur ab utero fortiter se contrahente, atque dum observatur fibrosum, & carnosum ostendit contextum, a cujus inspectione de virginum,

&

& viduarum castitate abigitur. Sed perperam ; nam viderat frequenter Ruyfchius virgines, & viduas illibatam castitatem fervantes carnosas moles educere, & vetulas viris non utentes easdem molas quoque in lucem exposuisse (n). Et Clarissimus Levret de arte obstreticandi benemeritissimus auctor hujusmodi molas in utero fieri earum, quibus menstruatio incipit deficere, pluries observaverat (o). At non consentio

H 4

cum

(n) Observat. Anatom. Chirurg. n. 60.

(o) L' Art. des Accouchem. p. 189. Plures mihi occurrerunt casus virginum molas, vel polypos ab utero educentium, quos omnes describere vetat stricta institutionum ratio. Sed unum tantum adnotamus. Virgo annum agens 22. in suburbani monasterii claustris ab ineunte ætate detenta superioris anni mense sextili, præviis fortibus per abdomen vagantibus dolo ibus, eduxit ab utero trium librarum polypum, qui referebat sanguineam consistentiam veluti carneam, & pellicula abductus apparebat. Hoc accidit die 26. mensis augusti. Sequenti mense septembri eadem vigesima sexta die, præviis iisdem doloribus, & le-

cum Clarissimis viris carnosas uteri ex-
 crescentias molas appellandi . Nam hu-
 jusmodi excrementiæ carnosæ miris in
 modis variari possunt , & augeri . Ne-
 que novum est videre vel ipsas puellas
 uteri scirrhosum tumorem gestare, qui pen-
 dens ab utero aut decidere , aut extra-
 hii potest . Licet aliquando mola forma-
 tur in initio , quæ tractu temporis in
 scirrhum commutatur , quemadmodum
 suis observationibus firmavere Paræus ,
 Mo-

levius universalibus tremoribus , ab utero edu-
 xit massam sanguinis concretam referentem
 alam avis . Hæc mola ponderabat uncias 18.
 Sequentis mensis octobris eadem die 26. , præ-
 cedentibus iisdem symptomatibus , molam ex-
 turbavit ab utero virgo habentem pundus un-
 ciarum 24. Hujus molæ figura erat irregula-
 ris . Novembri & decembri mense ab ipsa
 pariter fuerunt aductæ molæ sanguinis confi-
 luentiam memoratis æqualem & figuram referen-
 tes . Adhibita fuerunt virgini quædam reme-
 dia , & dum hæc scribo jam elapsi sunt duo
 menses , & fluit ab utero naturalis mensua-
 tio .

Moschionus, (p), aliique clarissimi viri.

§. 33. Molæ, quæ fiunt in utero mulierum venere utentium habent aliquam ab hætenus expositis differentiam. Representant quid carnosum, & quodammodo organizatum. Nam quando ovum est sæcundatum, & in utero descendit jam e suis evoluitur membranis, & per placentam utero adhæret. Si vero ob quamcumque fiat causam, ut pereat embryonis vita, tunc huic placentæ adhuc utero adhærenti adnectitur sanguis, qui sensim, sensimque cumulatus efficit magnam massam, quæ licet prima fronte appareat inelaborata, & veluti coagmentata carnea moles, tamen intimius, & diligenter inspecta representat aliquid elaboratum, in se continens mortuum embryonem. Summa requiritur diligentia, ut ab magna sanguinis massa extricetur mortuus embrio, sed negari non debet ut plurimum inveniri dictum embryonem exiccatum, aut placentæ, aut funi-

*Mulierum
conjugatarum
molarum
causæ.*

(p) Spach. Gyn. p. 430.

funiculo umbilicali adhærentem. Cl. Mauriceau (q) testatur molas originem sumere ab utriusque sexus semine corrupto. Has a falso conceptu distinguit, fateturque se pluries observasse falsos illos conceptus re vera veros fuisse in principio conceptionis. Quando perit embrionis vita, tunc sub mucii specie diffluere potest, & relicta sola placenta ei tamquam per superadditionem additur sanguis, & informis mola constituitur. Quando vero embrionis vita in utero remanet per aliquod tempus, & per particularum sanguinis additionem crescit, tunc intra molæ contextum inveniri debet quædam organizatio. Et qui erant ante legitimi conceptus, & postea facti sunt informes, quare *molæ* appellandi non sunt, dummodo nil viventis, & monstruosi representant (r)? Ex eo quia molæ non ha-

(q) Taite des Malad. des femm. gros. lib 1. Cap. X.

(r) Notum omnibus est mulieres non raro in

habent figuratas, & ordinatas membranas, neque evidens representant quoddam organizatum, putat quoque illustris Rulenius ipsas & ab falsis conceptibus, & ab bimestri, & trimestri abortu di-

in lucem edere solere foetus monstruosos. Aliquando supra unum truncum duo hærent capita. Aliquando sub uno capite extant duo trunci, quatuor pedes, quatuorque brachia habentes. Modo hanc, modoque illam machinæ deformitatem representant foetus monstruosi. Hos non esse molis appellandos certum est. Horum monstrorum originem acceptam referunt duobus ovis fecundatis intra unam membranam clausis. Quando evolvuntur partes ex vitæ actione secundum hanc illamque ovorum fecundatorum determinationem, secundum hanc illamque uteri actionem, secundum hanc illamque matris positionem etc. oriri potest monstruosa partium conjunctio, multiplicatio, defectus etc. prout unusquisque hæc monstra observans facile videre potest. Et uteri vivum organizatum monstrum servantis status semper diversus est ab illo, in quo mola grandis continetur, prout ex dicendis patebit. Adire potestis adolescentes, Rulenum loc. supr. cit. P. III. p. 195.

distingui semper debere. In his & membranarum ordo, & organizatio semper observatur (s).

*Molarum
in utero
existentium
quoniam si
gna sunt.*

§. 34. Sive habeant, sive non habeant molæ interius quid organizatum, certum est eas in utero efformatas graviditatis symptomata quædam medicis representare, a quibus non raro in errorem ducuntur. At adolescentes ad frequentia attendite grave scopulum declinare cupientes praxim exercitaturi. Quando genita est in utero mola non crescit abdomen juxta naturalem graviditatis modum. Ab initio ad sextum mensem sensibili tumefactione distenditur. Ab hoc tempore ad usque nonum mensem aut nihil, aut parum augetur tumefactio. In naturali graviditate augetur mammarum moles in ratione crescentium mensium, non sic accidit in molæ efformatione. Detumescunt mammx in seriori falsæ conceptionis tempore. Molam gestantes mulieres faciem defædatam, &

(s) Ibidem p. 190.

& pallidam tenent. Ut plurimum mæstæ apparent, nec bona fruuntur sanitate. Oculorum vivacitatem amittunt. Grave pondus gestant in utero, quod tamquam lapis decidit quocumque veritur mulier. Motus, quem post quartum mensem legitimam graviditatem habentes sentiunt, numquam in utero percipitur ab iis, quæ molam conceperunt. Pulsus apparent restricti, & parum frequentes, nec verum dycrotismum exhibent. Urinæ ardor, corporis magna inertia, perturbatus somnus, quædam sanguinis guttæ ab pudendis eductæ, depravata famis, & digestionis actio, atque his firmiia vexare solent mulieres molam in utero gestantes. Quando certum sit molam esse in utero ad ejus expulsionem procurandam cito animus est vester convertendus. Huic obeundo fini sanguinem si valida est mulier, semel iterumque e pede detrahere potestis. Deinde suffumigia emollientia a vagina sunt excipienda, & dummodo absit hæmorrhagiæ metus convenit supra uterum frigidam ponere. Modo pedestri itinere, modo rheda per viam silice stratam du-

Quibus remediis est mola ab utero exturbanda.

ducta concussio quædam est a corpore ægræ accipienda ea ratione, ut exturbetur mola ab utero. Mirrha cum castoreo copulatam, pulverem fabinæ cum camphora conjunctum propinare potestis. His remediis superbibendum concedite aquam aut ex infusione florum chamæmeli, aut ex infusione ligni quassæ, aut ex infusione alius remedii emmenagogi præparatam. Opium interne sumptum, potissimum si hystericæ sæviant convulsiones, optimum remedium est ad molam educendam, & infusus emollientes quoque conveniunt. Relaxatis enim hoc remedio partibus, in quibus veluti constricta reperitur mola, facile in se educitur. Quando incipit sanguis e ruptis vasis molam cum utero ligantibus tunc subest spes eam brevi expulsam iri. Hoc in statu satis est levia emmenagoga imperare, & facere, ut ægra aut in sedia, aut in lecto quiescat, ne multæ corporis agitatione hæmorrhagia adveniat. Quod si accidit hæmorrhagia, quæ mortis metum infert, tunc obstetricianus est cito arcessendus, ut extrahat corpus

extraneum, five fit mola, five poly-
pus, five quid aliud. Hoc vero non
nisi summa diligentia tentari debet,
quemadmodum sapienter monent Mau-
riceau, De La Motte, & Leuret (t).

§. 35. Abortus est foetus ante debi-
tum terminum ab utero exclusio. Cum
autem juxta naturæ legem statutum sit
post exactum nonum mensem foetus ad
debitam maturitatem pervenire, inde-
que hoc tempore in lucem veniens par-
tus fit naturalis (u), sequitur, ut ante
hoc tempus quamcumque mulierem in
lucem edentem foetum abortum pati dica-
tur.

*Quid abor-
tus, & que-
nam est
exacta in
legitima
gravidita-
te mensium
computatio.*

(t) Operib. sup. cit.

(u) Circa verum naturalis partus tempus
fuerunt discordes auctorum sententiæ. Alii ante
nonum, alii post decimum mensem mulieres
parere debere credunt. Utramque senten-
tiam suis observationibus unusquisque firma-
re putat. Verum ne in controversiis texen-
dis tempus teramus, firmiter statuimus no-
vem menses naturam exigere voluisse pro de-
bita foetus perfectione. Et si ut plurimum in
decimo mense mulieres pariunt, id accidit ex
eo, quia frequenter in mensium computatio-
ne error concipitur. Primum suppressionis
men-

tur. Verum in usu apud practicos est septimestrem, & octimestrem partum non dici abortum, sed potius partum anticipatum. Nam plures hoc in tempore enati foetus vivunt, & adulti facti homines valida optimaque fruuntur valetudine. Duplex distinguitur abortus
spe.

menstruationis mensem frequenter paucorum dierum spatium absolvit. Sic v. g. vigesima mensis die mulier concipit, & jam decem reliquos dies pro uno mense computat. Quando finiti sunt novem menses juxta datam computationem jam non sunt nisi octo menses, & decem dies. Quapropter alii viginti dies sumendi sunt de decimo mense, & idcirco mulieres frequenter pariunt in decimo mense. Quod si observatur quandam mulierem post duodecimum, vel decimum tertium mensem, immo & multo serius parere, id accidere potest hoc modo. Mulier patitur menstruationis suppressionem, & sanguis distendenda vasa uteri, nervosque data conceptionis signa exhibet. Credit mulier se esse gravidam, dum re vera nulla est in utero facta conceptio. In hoc errore potest esse mulier per aliquot menses. Si autem intra hoc tempus re vera concipit tunc incipit foetus incrementum, quod perficitur
citu

Species , alera est quando ovum fœcundatum in uterum est descensum , & adhuc
 I huc

citur exacto nono mense . Sed juxta conceptum errorem partus accidere deberet post tempus statutum novem mensium . Parit mulier circa duodecimum , decimumtertium vel vigesimum mensem ; licet re vera pro debita fœtus perfectione novem menses impensuri fuere . Cauti extote juvenes in hac re definienda , ne in foro contendentibus hæreditatem injuria fiat , dum aut legitimus hæres a bonis paternis arceatur , aut falsus hæres in hæreditatem immittatur . Universali enim naturæ lege sancitum est , fœtus novem mensium cursu indigere pro debita perfectione acquirenda . Quod si septimestris , & octimestris fœtus vivit , & adolescit in conditionem sani hominis , id accidit ex eo , quia in optima gaudente sanitate matre , optime constructus sitisque fœtus citam adipiscitur perfectionem . Licet non negem aliquando mulieres non cognoscere propriam graviditatem propter apparentem adhuc menstruationem , quæ e sola vagina fluit , dum re vera uterus prægnans est . Quando duorum vel trium mensium spatium ex multo embryonis incremento quædam manifestiora signa graviditatis apparent , tunc incipit credere mulier se esse gravidam unius men-

huc non adhæret ejus fundo , altera quando per placentam utero embryo est adligatus . In primo casu exire potest ab utero jam evolutum , & verum embryonem continens , nec dolore , nec multa sanguinis effusione mulier laborat . In secundo casu numquam abortus accidit sine dolore , & hæmorrhagia . Hæmorrhagia , & dolor accidit ex laceratione vasorum nexum placentæ uterique constituentium . Verum cum cordatioribus practicis credi-

menlis , dum duorum , vel trium mensium graviditatem jam habet . Parit juxta naturale tempus , & credit septimestrem filium in lucem edere . Amicissimi mei conjux superioribus annis peperit infantulum optime enutritum , & bona gaudentem sanitate . Mirabatur valde cur septimestris fœtus sit tam optime perfectus . Nam aiebat se ex observatione menstruationis suppressæ septem gestationis menses numerasse . Sed , facta rerum observatione , diligenter cognovi , partum accidisse in termino novem gestationis mensium . Adductæ a me permultæ rationes non adhuc persuaserunt honestam , & pulchram matronam se partum naturalem novem mensium habuisse .

himus non dici revera abortum expulsiōnem ovuli non adhuc utero adhærentis, dum nullum femina incommodum patitur, & difficile est embryonem in ovo videre sic ab utero educto.

§. 36. Causæ abortum constituentes *Quibus ex causis abortus fieri solet.*
 aliæ sunt a matre, aliæ sunt a fœtu.
 Quæ sunt a matre reducuntur ad sequentia. Uterus debet esse dilatabilis, ut in dies crescenti fœtui aptum parare possit locum. Si rigidus, compactusque est, certe fœtum crescentem amplecti nequit, qui circa tertium quartumve mensem peribit. Si uterus est scirrhusus, obstructus tuberculisque plenus, certe liberam non admittit sanguinis circulationem fœtui alendo opportunam. Uteri pulposæ & molli parti adhærere fortiter debet placenta, per quam nutritionem a matre venientem recipere debet fœtus. Quod si tenera est uteri substantia, & valde mollis, sane parum grandiozem fœtum continere nequit, qui sic facile perit, & ante justum tempus ab utero expellitur. Præterea uterus si admodum declivis fit, & inferius prolapsum fœtum detinet,

is certe ab ossibus innominatis pressus moritur paulo grandior factus . Deinde mulier debet foetui opportunum in quantitate , & qualitate nutrimentum exhibere , ut incrementum ipse capiat , & debito in tempore veniat in lucem . At hoc nutrimentum esse potest copiosum , ut in plethoricis , helluonibus , & parum exercitatis feminis accidere solet , & suffocatur foetus . Et potest nutrimentum esse admodum deficiens , ut accidit in anorexia , aut dysforexia affectis , vel perenni vomitu vexatis , vel nimiam humorum effusionem habentibus , vel morbo correptis acuto &c. , tunc abortus ob mortuum foetum fieri solet . Sic ab acri & deleterio sanguine enutritus perit in utero foetus , & abortus accidit . Si mulier vehementibus animi pathematibus agitur , uti ira , pavore , summoque desiderio alicujus obsonii &c. , tunc ob summam in nervis , & vasis uterinis enatam agitationem , perturbationemque accidere solet abortus . Et potest uterus violentas habere compressiones , quemadmodum accidit in mulieris anteriori lapsu
& ii

& iis in casibus, in quibus verbera abdomini dantur. Novi scelestam juvenem sex mensium prægnantem, quæ ut occideret conceptum filium multa, & gravia verbera infixit uteri regioni. Narrabat mihi se id fecisse ad vindicandam injuriam ab suo viro jam adultero factæ acceptam. Proh nefas! Periiit masculus infans, & abortus factus est, qui fuit admodum laboriosus improbam mulierem in grave vitæ periculum constituens. Choræa, saltus, vehementes motus aut equitatione, aut pedestri itinere instituti, validi nixus in sublevandis ponderibus &c. abortum quoque facere solent. Si tandem mulier medicamenta emmenagoga fortiora propinat, facile abortum patitur. Sed ex vitio foetus potest quoque accidere abortus. Sic si hydrocephalo, aut hydrope laborat foetus, si funiculus umbilicalis propter longitudinem infantis collo contorquetur, si pro brevitate funiculus ab foetus motibus cum placenta ab utero sejungitur, si placenta exigua fuerit cum utero debilem nexum constituens, si præ justo durior, aut

Mortui fœtus in utero scirrhusa debitum nutrimentum transmittere impar, tunc post longum languorem, abortu subsequente, peribit infans (x).

§. 36.

(x) Hactenus expositas abortus causas valere fœtum interficere unusquisque videre potest. Quando in utero est mortuus fœtus, nisi exturbetur, grave negotium & medicis, & mulieribus faceffit. Mulieres in grave vitæ discrimen constituuntur, & medici fama periclitatur. Vos, adolescentes, summa qua decet diligentia, mortuum in utero fœtum cognoscite, ut petitis ab arte opportunis auxiliis mulieribus tantum malum habentibus, moxque morituris, succurrere facile possitis. Si nullum amplius fœtus motum percipit mulier, si grave pondus in utero habet, quod tamquam lapis quo vertitur ægra procumbit, si fœtidi & corrupti humores e pudendis prodeunt, si frequenti corripitur syncope, si faciem habet perterritam, & oculos obtenebratos, si turgidæ flaccescunt & decidunt mammæ, si tenesmo laborat, & noctes vigiles, aut insomniis plenum somnum ducit, tunc in utero fœtum mortuum gerit mulier. Horum signorum fœtum in utero mortuum indicantium ratio est sequens. Dum vivit in utero fœtus, præsertim, quando est per-

fe-

§. 36. Signa, quibus prædici abortus *Abortus si-*
 solet sequentia sunt. Dolor percipitur, *gna.*
 qui sensim sensimque fertur à poste-
 I 4 rio-

fectus, semper aliquali spontaneo motu agitari debet. Sic ultimo gestationis tempore vel simpliciter inspicientibus abdomen occurrit fœtus irrequieti statim modo unam, modo alteram uteri partem ferientis. Quando nullus percipitur motus, sane de fœtus morte haud spernendum dubium habere potestis. Sed unico hoc signo haud semper fidei debetis. Nam pluries mihi accidit mulieres videre, quæ putantes se gerere in utero fœtum mortuum ex nullo percepto motu, tamen vivum, & forsan bonæ sanitatis filium pepererunt. Quando est mortuus fœtus jam nullo vitali actu se amplius in utero sustineri potest; hinc tamquam lapis decidit quo vertitur mulier. Fœtidi humoriseductio fit, si apertis membranis fœtum obvolventibus, & effusa aqua, datur aeri in uterum ingressus, sicque tenerimæ fœtus partes corrumpuntur & decidunt. Ita fit, ut ex visis hujusmodi putridis ab utero venientibus humoribus de tuta fœtus morte statutum ab obstetricantibus sit. Et eo verior est accidens, quo cuticulæ, aut alius partis ad fœtum pertinentiseductio accidit. Verum sedulo advertite adole-

rioribus ad anteriora pelvis abdominalis currens. Sanguis e pudendis emititur, qui in dies copiosior evadit,
Pul-

lescentes, ne hujusmodi signum fallax aliquando cum sit in errorem gravem incidatis. Quando chorion, & placenta incipit ab utero separari multus effunditur sanguis, qui si aliqua ex causa coit in grumos uteri orificium obfarcientes, sane corrumpitur per aeris accessum, & sic corruptus educitur, dum fœtus adhuc in utero vivit. Immo ut plurimum accidit videre quasdam mulieres, quæ ante naturalem partum emittunt multam fœtidi sanguinis nigricantisque quantitatem. Et si gemellus alter moritur, dum alter vivens est, certe educitur fœtidus ab pudendis humor, & vivit in utero fœtus. Facies statum hominis naturalem repræsentat, quæ, quando tristes, & obtenebrata apparet, indicat in corpore adesse aliquid vitiosi, quod vitæ finem minuitur. Id facere potest mortuus in utero fœtus, cujus corruptione corrumpi potest etiam uterus. Mammæ cum utero summum habentes commercium collabascunt a malo uteri statu. Nam dum servat fœtum mortuum, indeque nociturum uterus male afficitur, & disponitur ad irreparabilem corruptionem subcundam. Hunc infelicem uteri statum mam-

mæ

Pulsus quodammodo perturbatur evadens parum celer frequens, & restrictus. Abdominis figura mutatur, scilicet

mæ ostendentes collabasci necessario debent. Et si tenesmo corripitur ægra inscia conatur expellere nociturum in utero mortuum fœtum. Vicinum intestinum rectum sentit irritationes, quas facit cadaver in utero clausum, sicque frequentibus, irritisque conatibus fœcibus expellendis inservientibus tentat inscia mulier illud cadaver exturbare. Nec rarum est videre putrida febris hujusmodi ægras corripere. Hæc febris partim accidit ab putrido miasmate intra sanguinem ingresso, partim ab gravi labe, quam concipit uterus in contactum habens putridum mortuum fœtum. Somnum habent perturbatum, insomniisque plenum hujusmodi mulieres ex eo, quia humorum per cerebrum ductorum tranquillitas, & placidissima circulatio nulla accidere potest, dum tanta perturbatione uterus afficitur. Et nullam arteriarum pulsationem obstetricans immissa in utero manu percipere potest, dum penitus mortuus est fœtus. Advertendum sedulo est ne digitorum explorantium chirurgorum arteriarum pulsationes pro mortui fœtus pulsationibus accipiantur. Tandem frequentes syncopes accidunt ex perturbatione, quam cordis ner-

licet depressior, inferiorque sit. Tumefactæ collabascunt mammae, & ægrotantis faciei vivacitas quodammodo

vi ab utero per sympathiam concipiunt. Neque denegamus posse aliquando fœtum mortuum in durum tumorem converti, ac per triginta & plures annos servari, quemadmodum testantur observat: Accademiæ scient: an. 1721., an. 1748. Quando ex his aut ex similibus signis notum sit mortuum jam in utero esse fœtum, tunc omni conamine est molierendum, ut cito exturbetur. Huic obeundo operi obstetricans potissimum valet, qui diligenti manu pedes accipiendo simul & semel fœtum extrahere ab utero potest. Hoc auxilii genus mulieri præ primis exhibendum est; ut quo citius fieri possit ab gravi malo liberetur. Et si nullo modo perturbatus situs cadaveris inverti potest, debet diligenter frustillatim abscindi, quemadmodum docent Mauriceau, Levret, aliique obstetriciæ artis magistri. Quando id aut fieri non potest, aut fieri non permittit mulier, tunc totum opus medico committendum est, qui languentes partus dolores erigere, & acuere debet propinatis aqua cinnamomi, vino generoso, aut decoctionibus sabinæ, chamæmeli, aliarumque herbarum emmenogagarum decoctionibus cum mir-

do imminuitur . Quo crescunt dolores uterini , quo augetur sanguinis educio, quo pulsus frequentiores restrictioresque evadunt, eo proximior est abortus, qui eo periculosior est , quo factus sit per violentas causas , nempe per casum , aut per verbera abdomini inflicta , aut per vehemens animi pathema &c. . Quinque , aut sex mensum abortus periculo plenus est, utpote qui utero
ma-

mirra copulatis. Optime se gerit mulier instituens frictions super uteri regionem , & adhibens conatus fortiter inspirando auctos, quibus obtinere potest sui mortui foetus expulsionem . Si enatae convulsiones arctant uterum, & impediunt exitum cadaveris , tunc opium est propinandum, & iniectiones emollientium plantarum in uterum iniiciendae sunt. Dum haec peraguntur convenit super abdomen frigidam admoveere, ut contracto utero, educatur foetus. Si febris putrida enata est , debet chinchina, & acidis mineralibus curari, ut, quo fieri possit, arceatur ab utero gangraena. Hisce, aut similibus nil proficientibus, ne certae morti committatur mulier obstetricans est arcessendus, cujus diligenti operi committenda est cadaveris cita extractio .

Abortus vitæ infert periculum.

magnum infligit vulnus, & qui summam in corpore excitat perturbationem. Hujusmodi abortum magna sequitur hæmorrhagia, quæ in grave vitæ discrimen ægram ducit. Cum autem memorata abortum indicantia signa pendeant a violenta separatione placentæ ab utero, apparet naturali partu abortum semper periculosiorem esse, in quo hujusmodi separatio sponte procedit, nec fit multa vasorum reptura. Deinde in naturali partu uteri orificium molle evadit, & ab transente fœtu parum irritatur, maximusque inde oritur dolor. Nec rarum est videre hujusmodi uteri læsionem excipere inflammationem, quæ pene semper lethalis esse solet.

Quomodo curari debet.

Huic curando morbo cauti adolescentes adhibete medicamenta ex ratione & experientia comprobata. Debet mulier corporis, animique quietem servare in lecto jacens. Et si vires constant, & non multa est sanguinis per uterum effusio, aperta manus vena, sanguis educendus est parca dosi. Hæc phlebotomia repeti potest ex ratione, qua observatur. dolores fieri sæviores, pulsus eva-

evadere vibratiores, restrictioresque, & durat sanguinis eductio per pudenda. Opiata interne exhibenda sunt, quibus & dolores compeſci ſolent, & hæmorrhagia ſiſtitur. Optimum eſt laudanum opiatum in aqua theriacali ſolutum ad grana duo, & cochleatim pluries de die propinatum. Huic remedio ſuperbibi poteſt aut frigida, aut contrita nix. Diæta exacte eſt imperanda primis ſaltem diebus, deinde ne vires fatiſcant, & fœtus ob nutrimenti defectum pereat, hydrogala eſt concedenda aut ſimplex, aut cum fruſtulo panis copulata. Si febris periodica acuta orta abortum minitatur, opportunis remediis præſertim ab ſalibus inciſivis, chinchina, balneis frigidiusculis, acidis vegetabilibus, & aliquando etiam mineralibus, aliisque id genus auxiliis eſt expellenda. Omnes ſuavi odores arcendi ſunt. Alvus neque multum lubrica, neque multum ſtrieta ſervari debet. Clyſteres emollientes eo in caſu adhibendi ſunt, in quo timetur cumulas multas duras fæces in inteſtino recto uterum comprimere poſſe, & ſanguinis effuſio-

sionem ab utero, indeque abortum arcessere valere. Quando ob debilitatam uteri compagem abortus fieri solet, vidi profecisse decoctionem chinchinæ cum spiritu vini edulcorato, aut cum aqua cinnamomi copulatam. Lumborum regioni admovent nonnulli, nec sine ratione, emplastrum de pice navali confectum. Mulier ob debilitatum uterum numquam ad justum tempus graviditatem ducens debet semper arceri a fortibus corporis motibus, concussionibusque, & ab severis domesticis curis. Rusticatio optima est, & vita per temperatum exercitium in campestri aere ducta admodum erit opportuna. Matriona annorum 35. novem abortus sex mensium passa est. Hæc per mollitiem, & ciborum euchymorum, nec non liquorum spirituosorum abusum magnam uteri debilitatem contraxit, qua paulo grandior factus foetus haud amplius in utero substineri poterat. Postquam omnia remedia ex martialibus, amaricantibus, aquis thermalibus, balneis frigidiusculis, aliisque uterum corroborare valentibus desumpta incassum fue-

re adhibita, imperavi rusticationem, motumque per moderatum exercitium modo pedestri itinere, modo equitatione institutum, & vitam per opportunam ciborum electionem ductam. Hoc per sex menses factum, vidi cum summa animi oblectatione gravidam matronam debito tempore parere optime enutritum infantulum. Et postea pari felicitate duos alios filios bona præditos sanitate in debito tempore in lucem edidit. At advertite, adolescentes, ne, apparentibus abortus symptomatibus, hæc præscribatis. Hoc enim in tempore uti potestis remediis paulo supra notatis. Præscribite memoratam rusticationem ad præcavendum futurum, post novam conceptionem, non imminentem abortum.

A R T I C U L U S VII.

Partus Difficilis.

§. 37. **M**ulieres omnes post Adæ *Quenam sunt cause partum difficilem constituentes.* peccatum parere cum dolore magno debere certum est. Hic do-

dolor pendet a summa distractione colli uteri, & vaginæ, quam trans has partes ductus facit foetus. Ergo omnis partus dici deberet difficilis ex eo, quia multum matri infert laborem. Verum in usu est apud omnes medicos, & obstetricantes partum naturalem dici illum, qui accidit debito graviditatis termino, prompte, & sine gravibus accidentibus, & tunc foetus expellitur vivus, sanus, & bono situ (γ). Quando aut una, aut plures conditiones ab his recedunt, fit partus difficilis. Difficilis partus accidit vel vitio matris, vel vitio foetus, vel utriusque. Plures adesse possunt causæ, quæ ad matrem pertinent difficilem partum facturæ. Si mulier admodum est debilis, jam deficienti oportuna vires tantum opus perficiendi, & partus laborosus evadit. Uteri validas contractiones requiri præcipue ad foetum expellendum
omnes

(γ) Has conditiones pro naturali partu requiri docet Mauriceau *malat. des femm. gros.* c. 2.

omnes scimus. Adjuvant has vires diaphragmatis, & musculorum abdominalium contractiones, quas mulier inspirando intendit, augetque, quemadmodum in omni naturaliter parturiente observamus. Si autem mulier aut ob acuti morbi toleratos labores, aut ob vigiliam nimis longam, aut ob alius cuiuscumque humoris copiosam effusionem habitam, aut aliam ob causam debilis evaserit, suis conatibus uteri contractiones augere non valet, sicque foetus non expellitur. Hinc merito damnandae sunt mulierculae illae obstetricantes, quae credentes, & promittentes partum vicinum, cogunt fortiter parturientes, ut suis conatibus, quo fieri citius possit, exturbent foetum. Sed cum tempus pariendi non est opportunum, incassum vires consumuntur, & mulier inde difficile parit jam debilis facta. Quocirca etiam atque etiam vos moneo, adolescentes, ne in curuli sella diu jacere parturientem finatis vires certe perdituram, non adhuc proximo pariendi tempore. Hanc difficilis partus causam frequentem esse in praxi cognovi. Si

collum uteri cum vagina nimis arctum fit, partus evadit difficilis. In primiparis ob angustas vias trans quas ferendus est foetus, partus ut plurimum evadit difficilis. Et natura sciens has vias, ut cederent facile distendenti foetui, madescere nimis debere, quatuor, aut quinque ante partus dies mittit unctuosum, & mucosum humorem humectationi, & lubricitati harum partium opportunum, ut facilius nascituro foetui paretur transitus. Hinc mulieres ex pudendorum humectatione magna visa praenunciant vicinum partum. Si tumor comprimit has vias, laboriosus pariter evadit partus. Sic natura, ne ex congesta in vesica multa urina, collectisque in intestino recto multis foecibus, fiat utero, & vaginae compressio partum impediens, cavet diligenter, ut paulo ante partum diarrhoea excitetur, & frequentes mingendi oriantur conatus, quibus, indicatarum partium libertate facta, nullum obstaculum transituro foetui exhibetur. Sed possunt re vera aut circa uterum, & vaginam, aut intra ipsarum partium cavum generari tumores

polyposi, steatomatosi, aut alius indolis, qui maturi foetus exclusionem remorari valent. Et ipse vaginæ prolapsus, (qui accidit, quando interior ipsius canalıs membrana facta laxior supra se ipsam invertitur, & extra vulvam prominere sub forma quasi anuli turgidi inæqualiter plicati) potest quoque exitum foetus liberum impedire.

§. 38. Si post conceptionem in collo uteri, & in interiori vaginæ superficie ulcuscula enascuntur, potest his ^{Partus difficilis aliæ indicantur cause.} coalitus labiorum uteri & vaginæ fieri, qui, nisi aperitur, numquam mulier parere potest, quemadmodum ex Benevoli observationibus constat (z). Si os pelvis abdominale componentium arctior est apertura, sane nullus datur transituro foetui opportunus aptusque locus. Observat Cl. Levret pelvim esse justo angustiorẽ, si manum obstetricantis chirurgi ipsa admittere non valet (a). Chirurgi manus

K 2

de-

(z) Observat. Dissert. V. p. 96.

(a) L' Art. des Accouch.

debet esse musculosa , fortis , sed simul non admodum lata , & oblongis digitis ornata . Quando hæc manus in pelvim intromitti nequit , tunc pessima est pelvis cavitas partum difficillimum factera . Possunt hujus pelvis ossa plurima habere mala , uti exostoses , & gummata , quibus angustari naturalis cavitas debet . Sed rachitis præ omnibus morbis indicatorum ossium deformitatem facit . Vident obstetriciæ artis magistri mulieres olim rachitide laborantes ut plurimum partum laboriosissimum habere . In hoc morbo os sacrum , & ossa pubis introrsum vertuntur , ex quo spatium sacro pubis arctissimum efficitur . Vidi semel iterumque in duas rachiticas , quarum mox infra historiam referam , indicatum spatium arctissimum esse . Per hoc spatium quomodo caput , & humeri foetus maturi exire possunt ? Hinc nisi aut arte , aut natura moliente , separentur ossa pubis , & aditus major paratur , aut Cæsarea instituenda est operatio , aut cum filio mater perire necessario debet . Si tandem aut per validas uteri contractiones , aut per

per vehementes foetus calces, quos dum in angusta nimis pelui capite inclavato reperitur foetus matri infligit, uterus rumpitur, tunc aut totus foetus, aut aliqua ejus pars intra abdominis cavum cadit, sicque difficilis partus evadit. Rupti uteri exempla plura extant apud Lamotte (b), qui pluries immissa manu in utero ad foetum extrahendum viderat ruptum uterum, & manu tangere potuit mulieris intestina. Alexander Monrous viderat una cum placenta delapsam foetum in cavum abdominis per uterum ruptum, immo & in maximis parturientis conatibus crepuisse abdomen, & foetum, ac secundinas exivisse testatur (c).

§. 39. Foetus vero vitio fit partus laboriosus, si is justo sit grandior, si

*Difficilis
partus cau-
se ex vitio
foetus.*

K 3

ca-

(b) Traité des accouchemens liv. IV. c. v.

(c) Essays and observat. physic. and. lit. vol. 2. p. 340. Consulite celeberrimum tractatum de utero rupto cl. Crants, in quo plura recensentur signa rupti uteri, & plures asseruntur casus indicantes morbum, de quo sermo est.

caput prægrande habeat , si mortuus in utero fuerit , si malo , & a naturali diverso situ in utero sit locatus . Quando foetus nimis grandis est , vel magno datur capite obturans uteri orificium viam sibi transituro claudit , sicque difficilis evadit partus . Si mortuus est foetus jam nullum exercet nisum , quo sibi exitum procuret , ægerrimeque ab utero expellitur . Nam licet verum sit sola uteri vehementi contractione foetum exturbari solere , sed verum pariter est conatus foetus diuturni carceris pertæsi exitumque quærentis validos partum sollicitare . Hi conatus deficiunt quando foetus malo situ exitum sibi procurat , certe aut nullus , aut difficilis admodum evadit partus . Naturalis foetus situs in partu est quando vertex ejus dilatando sensim sensimque uteri orificium imminet vaginæ dilatatæ ostio . Tunc facies respicit os sacrum , et occiput ossa pubis , & brachia , lateribus applicata soluta sunt . Si autem , aut transverse situs est , aut natibus respicit uteri collum , tunc , nisi hic situs invertitur , difficile potest extrahi foetus .

Quan-

Quando partus est gemellus, & uterque foetus exitum simul & semel exitum procurat, jam laboriosus constituitur partus. Monstuosus foetus, aut cum magna mola copulatus difficilem quoque constituit partum. Sollicite itaque obstetricantes aut in matre, aut in filio, aut in utroque difficilis partus existentes causas tollunt, ut quo fieri possit, vel utriusque, vel alterius vita servetur. Non potest medicus difficilem partum cognoscere, nisi sciat naturalem partum. Huic cognoscendo sedulo attendite, adolescentes, ne frustraneum opus vestrum evadat (d).

K 4 . §. 40.

(d) Mulier mox paritura habet dolores incipientes a lumbis ad usque pubem se extendentes. Hi dolores ad instar tenesmi affligunt, & quando recurrunt semper a posterioribus ad anteriora venientes cum quodam pondere pudendas partes divellente copulantur. Et eo saeviores, frequentioresque recurrunt, dolores, quo proximior est partus. Aliquot diebus ante partum abdominis tumor descendit, ac veluti in imam pelvim totus caderet indicat inversum esse caput foetus tamquam
 si

Quomodo
difficilis par-
tus causa
volvende
sunt -

§. 40. Si autem partus fit difficilis ob debiles mulieris vires, hæ sunt erigendæ opportunis alimentis. Quando post partum vulnus in utero relinquitur, quemadmodum advertit Svvietenus (e) non

si ingrederetur in uteri collum. Hanc foetus inversionem vocant Itali *capitombolo*. Incipit e pudendis stillare mucosus humor, qui haud raro cum sanguine mixtus excernitur. Possunt cum hac abdominis tumoris inversione conjungi dolores, qui non sunt veri, sed spurii, scilicet quando per abdomen vagantur, & sunt veluti hysterici dolores, a quibus non modo non indicatur proximus partus, sed potius impeditur. Convenit enim eos opiatis compescere. Nec rarum est videre gravidam mulierem post octavum mensem habere hanc inversionem cum doloribus copulatam, interim partus post alium mensem, & ultra accidit, quemadmodum se vidisse pluries testatur M uriceau loc. cit. t. I. liv. II. chap. II. Pulsus in proximo partus tempore evadunt frequentes, & contracti, & adposita manu observat obstetricans caput foetus jam propinquum uteri orificio. Hoc orificium apertum, & molle esse solet, & continuo cum vagina ab affusa multa lympha madescit. Hisce appa-

(e) non debet multis repleri calefacientibus, & spiritosis aquis, oleisque, quia paulo post hæc remedia transientia per excitatum vulnus arcessere inflammationem valent. Hinc male faciunt mulierculæ mox parituris adstantes, quando multam o ei, & aquæ cinnamomi, nec non vini spirituosæ quantitatem exhibent. Nobis in usu est vitulinæ carnis jus, aut cocholatium, aut vini paucum, aut his simile aliud

parentibus signis mulier utpote mox paritura collocari solet in sella ad hoc opus excavata, vel rectius in lecti ora, quemadmodum vult Levret, & hinc inde comprimentibus manibus lecti pulvinaria, validis inspirationibus, & summis musculorum abdominalium, ac diaphragmatis concussionibus procuret necesse est fœtus expulsionem. Ostetricans in naturali partu nil aliud moliri debet, nisi accipere, id quod viribus matris ab utero expellitur, & debito, opportunoque modo ad vitæ longævitatæ servare. Quando ab his conditionibus recedit partus, tunc esse solet laboriosus & difficilis, cui sequentibus auxiliis obstetricans succurrere debet.

(e) In comment. aph. Boerhaav. 1312.

aliud enutriens, & cardiacum exhibere. Ceterum in languenti mulieri, ideoque foetum expellere non valenti aut vomitum aut sternutationem excitare bonum est, quemadmodum Hipocrates docet (f). Uteri angustum durumque orificium leniendum est admoto butyro, vel oleo amygdalarum dulcium, atque institutis fomentis a vagina exceptis, vel ipsis semicubeis ex aqua chamæmeli, vel malvæ decoctione cum lacte copulata paratis, in quibus pluries de die immergenda est mulier. Et si viæ aut obcæcatæ, aut admodum arctæ sunt, aut coalitæ aptis sunt aperiendæ instrumentis, quemadmodum sapienter chirurgi operari solent. Et si interior vaginæ membrana relaxata extra vulvam propendet, debet pessario ex carptis filis aqua gurgitelli infectis concinnato sustineri, & in proprio reponi loco. In lecto detineri debet mulier, & adstringentibus uti fomentis. Sic recens vaginæ prolapsus

(f) In aphorif. lib. sect. v. n. 35.

apfus curari solet . Omnis tumor tolli debet , ut via transituro fœtui paretur . Hic tumor potest esse intra & extra vaginam , & uteri collum . Quocumque reperiatur modo, semper convenienti methodo tolli debet . Tandem si ob diametri sacro-pubis summam angustiam fœtus nullo modo extrahi potest , & emollientibus antea foibus institutis obtineri nequeat , ut laxatis ossibus , factoque illo spatio ampliori partus adveniat , tunc mulieri in gravi vitæ discrimine constitutæ chirurgi manu cito est succurrendum (g) .

Ossium pubis symphysis operatio nova indicatur .

AR.

(g) Quando spatium inter ossa pubis , & os sacrum parvum est , tunc nullo modo , nisi aut natura , aut arte hoc spatium ampliatum , fœtus exire potest . Si non sunt exostoses , aut gummata , aut alii tumores memoratorum ossium deformitatem , indeque angustiam pelvis constituentes , certe vitium a rachitide , ut nuper dicebamus §. 37. est repetendum . Hoc in casu intra emollientes infusus pluries de die sedere faciunt mulieres , ut , emollitis ossibus , urgens caput fœtus possit sibi tantam diametrum aptare , quanta sufficit ut foras venire possit . At quis unquam sibi per-

ARTICULUS VIII.

Puerperii Morbi .

*Post fœtus
eductioem
accidit se-
cundinarum
expulso .*

§. 41. **P**ostquam mulieres fœtum ab utero exturbant, debent cum placenta chorion educere . Et do-
do-

persuadere potest, ut durissima ossa aut rumpi, aut e loco suo removeri valeant, admota quacumque vi, a fœtu exitum quærente . Sane aut fœtus & mater extremum fatum subire debet, aut chirurgica operatio institui convenit . Prudentia vult, ut vel dubiosissimæ operationi potius committatur mulier, quam certæ morti tradatur . Scimus duplicem operationem fieri posse, nempe aut partus instituendus cæsareus, aut symphisis ossium pubis recidenda est . Hic advertendum est, nos eo sensu hujusmodi operationes institui debere tuto adferere, in quo nullo modo chirurgi manus immitti intra uterum potest ob arctum spatium inter ossa pubis, & os sacrum situm . Quod si manus immitti potest, tunc sedulo moliendum est, ut aut manibus, aut Levretiano forcipe fœtus extrahatur . Et si nullo modo ingredi intra uterum potest, tunc memoratæ operationes cito sunt faciendæ .

Qui

oribus ac labore vexantur quoque mulieres secundum hunc veluti partum facientes. Quando exit fœtus suo umbilico

Qui credunt cæsareum partum instituendum esse, semper ipsum post matris obitum faciunt. Piaculum enim est, vivente matre, uterum aperire, & certæ nœci miseram committere. Neque enim servari potest mulier partus doloribus antea vexata, indeque debilis, cui & abdomini, & vasculosissimo utero magnum infligitur vulnus. Et haud certum est, instituta cæsarea sectione, fœtum vivum extrahi. Nam immediato aeris contactui expositus infans ob uteri violentam sectionem magnam in tenero suo corpore habet mutationem, a qua facile interfici potest. Hinc merito Paræus adserit *id curationis genus, quod periculi & desperationis plenum est; numquam usurpandum esse lib. de gener. Cap. 31.*, Et Mauriceau contra hanc operationem acriter declamat, & numquam, nisi post matris obitum tentandam, esse adfirmat in loc. cit. liv. 2. Chap. 32. Neque ipse Levret huic penitus acquiescit operationi. Tantum adserit tubalem, & abdominalem conceptionem sectionem cæsaream eo sensu requirere, quia nullo modo per vias naturales eluci potest fœtus. Sed quænam sunt certa harum conceptio-

licali funiculo trahit quodammodo placenta, quæ, ruptis vasis cum utero ipsam ligantibus, educitur. Sed requiritur

ptionum signa diagnostica? L' Art des Accouch. p. 10.; Cum autem & auctorum de obstetricia arte benemeritissimorum testimonio, & ratione, & experientia constat non esse, nisi post obitum matris tentandam cæsaream sectionem (quidquid De La Motte vestigiis insistens Swietenus eam posse fieri adserat in comment. aphorismor. Boerhavv. 1316. t. VIII. p. 175.) facile inferri debet ad salvandam & matrem, & fœtum unicam superesse symphysis operationem, qua nempe abscinditur cartilago conjungens ossa pubis. Primus quoad scimus, qui hanc operationem Pariliis instituit, fuit Dominus Sigaud Medecin de la faculté; Inde Alphonus le Roy eam pluries cum haud infelici successu fecit, quemadmodum videre est in opere Domini Sue, cujus titulus *essais historiques e critiques sur l'art des accouchemens T. I. p. 276. dissert. 12. reflexion historique, e critiques sur l'operation dite la section della symphise du pubis*. Extant vero auctores, & inter alios Dominus Lheritier, & Dominus Etienne, qui memoratam operationem tamquam periculosam, & inu-

tur data uteri contractio postquam fœtus eductus est, cui contractioni præcipue debetur secundinarum expulsio.

Hinc

inutilem rejiciunt sequentibus ducti argumentis, 1. Ossa pubis semel separata nunquam junguntur. 2. hac operatione, ajunt, lædi posse vesicam ossibus pubis immediate suppositam; 3. Ligamentorum sacroiliacorum distractione tumores produci possunt, qui in superationem abeuntes certe interficere possunt. Concludunt itaque hanc operationem utpote non adhuc ornata certis, multisque observationibus & factis esse abiiciendam. Verum mox excitatus Alphonsus de le Roy adversus hos contendit operationem symphysis tutam esse, & sibi ipse pluries felicem cessisse adserit. De sectione cartilaginis ossa pubis conjungentis utilitate quæque sibi persuadere potest solum cogitando cæsarea sectione esse tutiorem. In hac operatione non reciduntur partes magni usus, non magni nervi, non grandia vasa, non organa nobilia secantur. Quando cum attentione instituitur neque vesica urinaria inciditur, neque ligamenta pubis admodum irritantur, & facile cum fœtus extractione prompta, mater servari potest. Et dictis facta, observationesque respondent. Petiit Incurabilem Noso-

co-

Hinc merito suadent Mauriceau , & Levret parumper expectandum esse post fœtus expulsionem , ut contrahatur uterus ;

comium *Victoria Patrecca* juvenis annorum 24., quæ gravidatam octo mensium gerebat. Suæ ætatis initio fuit rachitica , ideoque corporis statura erat tam parva , ut cunctis nobis summæ esset admirationi . Vix quatuor palmorum altitudinem æquabat . Cum omnia ossa essent distorta , pelvis abdominalis erat tam arcta , ut vix digiti duo intra spatium sacropubis immitti potuissent . Unanimi sententia a nobis statuebatur, Victoriæ parere non posse naturali modo . Exacto nono mense apparentibusque partus signis , diu in semicubeo ex aqua chamæmeli , & lacte parato ad emolliendas inferiores partes pelvis detinebatur . Et advocato nosocomii coriphæeorum medicorum consilio statutum est, aut Victoriæ cum suo fœtu esse moriendum , aut chirurgicæ operationi eam esse committendam . Cæsaream sectionem tamquam lethalem neglexerunt , & Duce cl. Dominico Cotunnio nostræ nationis ornamento , symphisis pubis ossium sectionem faciendam statuerunt . Dominicus Ferrara de Ostetricia arte benemeritissimus vir-

rus; hac enim contractione obtinetur facilis secundinarum eductio. Itaque dammandæ sunt illæ mulierculæ, quæ anxie

L puer-

vir operationem fecit . Die itaque undecima Martii currentis anni 1787. in hunc modum operatio facta est . Novacula pili pubis recisi antea fuere , inde a Ferrara, adstantibus inter alios sapientissimos Chirurgos Juliano Pollio, & Nicolaus Franchini, sublevata integumenta pubis , & sufficienter incisa sunt . Postea inventa fuit cartilago conjungens pubis ossa , & fisso bistorino sollicitè ricisa est felici admodum successu . Nam tantam post cartilaginis incisionem latitudinem obtinuit obstetricans , ut fœtus extractioni se aptaverit . Hæc operatio evadebat felix , quia post mutatum situm fœtus jam pedes apprehensi sunt , si non obstaret caput ejus , quod cum esset solito grandius , summam resistantiam fecit , & prima vice extractio non fuit absoluta . Verum post varia chirurgorum artificia extractus est fœtus , qui accepto baptismo salutari , post aliquot minuta mortuus est . Juvenis tanto incommodo , & labore veluti semianimis facta in lectum reposita est , statimque cardiacum ex vino & aqua paratum accepit . Inde vul-

puerperas sollicitant , ut repetitis conatibus statim post partum procurent secundinarum expulsionem . Sed potest ac-

vulnus methodo primæ intentionis curatum est . Et cl. Cotunnus ægram bis , terque de die invisebat , qui ad compescendos dolores adhibebat super abdomen emollientia & anodyna ex aqua chamæmeli & cuniculis exantheratis parata , nec non propinabat ad lochia cienda , (quæ fuere præter propter sufficientia) chamæmeli aquam , & sirupum capillorum veneris , & dabat opportuna alimenta . Lac in mammis ubertim adparuit , & in bonum statum ægram esse constitutam apparebat . Et nos bis quoque de die ægram observabamus , & cum summa animi oblectatione videbamus Victoriæ integre sanitati restitutam . Altera gravida similem corporis structuram referebat . Huic tarde nimis nosocomium petenti fœtus jam mortuus erat , & uterus gangræna corripiebatur . Et post mortui fœtus tentatam extractionem cito superioribus diebus moriebatur . Ex hac fideli historia symphisis pubis sectionis cum summa felicitate prima vice Neapoli factæ deduci potest , eam semper institui debere modo adsit necessitas , quæ nullo modo extra hi posse fœtum

accidere, ut quacumque ex causa aut
 tota placenta, aut ejus portio in utero
 remaneat, tunc mulier sequentibus ve-
 xatur incommodis. Dolor fortis in imo
 ventre cum frequenti horripilatione co-
 pulatus perdurat, & multa sanguinis
 copia ab utero non facile sistenda edu-
 citur. Febris accendi solet, quæ ab
 corrupto. intra uterum per aeris ingres-
 sum relicto corpore, viscus, indeque
 sanguinem afficiente derivat. Et, per
 durante in utero secundina, impeditur
 naturalis ipsius contractio, quocirca
 discissa per partum vasa contrahi ne-
 que-

*Quibus si-
 gnis cogno-
 scatur pla-
 centam in
 utero reli-
 quam esse.*

L 2

que-

ob angustiam diametri sacro-pubis constat.
 Hæc operatio, ut dictum est semper cæsarea
 sectione tutior est. Verum in hac operatione
 sedulo est advertendum, ut saltem duorum
 pollicum cum dimidio sit apertura sacro-pu-
 bis, cui accedente sufficienti alio spatio,
 quod per operationem symphysis acquiritur,
 spatium opportunum habetur pro foetus ex-
 tractione. De cæsarea sectione plura scire cu-
 pientes. Consulite adolescentes Crants de *Utero*
rupto, Heisterum de *Cæsarea operatione*, &
 Levret de *suite d'observations* &c.

queunt, ex quo hæmorrhagiam pene ad mortem usque perdurare posse dicendum est. Et non raro observamus aut totam secundinam, aut ejus partem corruptam ex utero exire absque ullo adhibito auxilio. Hæc corruptio accidit, ut jam dictum est, propter ingressum aeris intra uterum. Et novum non est videre, retentam in utero placentam nullam mulieri noxam inferre, & post aliquot dies sine ullo incommodo excerni, quemadmodum suis observationibus viderat Ryschius, qui vult chirurgos nullam mulieri secundinas in utero gerenti inferre vim; porro eas non multam noxam parere, & facile exturbari posse, ait (h).

*Quibus autem
x i s procu-
rari a bet
seundina.
rum exptu-
sio.*

§. 42. Quando obstetricans cognoscit aut totam placentam, aut ejus partem in utero relictam non debet fortiter uterum funiculo umbilicali tenso distrahere, aut digitis irritare; accidit haud raro, ut malis his irritationibus aut uterus ex-
tra-

(h) Advers. Anat. dec. 2. p. 30. Consult. Andr. Pasta de morb. mulier. T. 2. p. 210.

travolvatur, aut magna hæmorrhagia cum fortibus convulsionibus copulata adveniat, sicque de repente puerpera moritur. Hoc in casu tutius consilium est naturæ totum committere opus, & expectare, ut ex se secundina prodeat. Collocanda est in situ horizontali in lecto ægra, & si sanguis ubertim effunditur, sat erit aquam frigidiusculam bibendam concedere, & pulverem chamæmeli ad drachmam unam cum sirupo capillorum veneris copulatam semel iterumque de die propinare. Quando uteri cervix est clausa, & nulla sanguinis gutta educitur, tunc semicubea ex aqua chamæmeli parata institui possunt, & eandem aquam per siphonem in uterum immitti posse ratio suadet. Hac enim ratione emolliri possunt partes, indeque dehiscentes secundinas educere valent. Opiata & emulsiones ex seminibus frigidis cum addito papaverum semine confectæ convenient ad arcendos dolores, & temperandas hystericas, si qua sint, convulsiones, a quibus ut plurimum impeditur secundinarum exitus. Et hoc in casu sanguinem semel, iterumque e pedis vena

emissum non purum proficere pluries observavimus. Si autem uterus multum sanguinem, ut dictum est, effuderit, tunc æthyopem vegetabilem in aqua theriacali solutum ad grana decem cochleatim pluries de die fumere debet puerpera. Mammæ fotibus calidis fovendæ sunt ad lac vocandum, & clysteribus emollientibus stricta alvus laxanda est. Si fatiscunt vires hydrogala sumi potest; & periodica, si qua appareat, febris, chinchina expelli debet.

*Quæ lochia
dicuntur.*

§. 43. Sed gravia incommoda puerperas manent ab puerperii aut retentione, aut ab ejus nimio fluxu. Nimirum jam omnibus notum est ex discifsis vasis placentam cum utero colligantibus post partum nimiam sanguinis quantitatem emitti, quæ in summam imbecillitatem puerperam coniicit. Hæc debilitas cum faciei pallore sensim sensimque imminuitur ex ratione, qua paulatim se se contrahentibus vasis deficit ille sanguinis fluxus. Hic sanguis primis diebus est admodum rubicundus, inde subsequenter diebus ruboris vivacitas deficit, usque dum penitus extin-

gua-

guatur, & non nisi serum, aut lympha ab utero puerperæ emittitur. Nec novum est videre fœtidum, & veluti ichorosum sanguinem ab pudendis educi, quod accidit ex corruptione, quam sanguis concipit in utero per aeris ingressum. Hic fluxus modo copiosi, & rubicundi sanguinis, modo parcioris & defædati, modo penitus serosi humoris dicitur *puerperium*. Hoc fluxu repurgatur tota humorum massa, & uterus ab inquinamentis, quæ gestationis tempore per menstruationis suppressionem concipere debet, liberatur: Nec certus est terminus hujus puerperii in diversis mulieribus, in quibus nec sexus diversitas, nec partus, aut facilis, aut difficilis conditio, sed sola corporis temperies discrimen facit. In plethoricis enim serius, in debilibus, & pituitosis brevius terminatur fluxus. Levret putat non esse definitum puerperii terminum. Ut plurimum vero circa quindecim, vel viginti dies finire lochiorum fluxum adserit in opere pluries laudato p. 135. Id ipsum nos etiam frequenter observavimus: Nisi quod aliquando sine causa manifesta

cessare, aliquando iterum redire sponte lochia experti sumus. Verum dantur casus, in quibus aut parce nimis fluunt, aut penitus cessant lochia, tuncque puerperæ in grave vitæ discrimen coniciuntur. Hujusmodi lochiorum aut suppressionem, aut imminutionem facere solent sequentes causæ. Nimius sanguinis lentor, nimia & intempestiva uterinorum vasorum constrictio possunt morbum patere. Sanguinis viscorem faciunt temperamentum sanguineo-melancholicum, ciborum euchymorum, pinguium, & ægre solubilem, nec non vini, ac liquorum spirituosorum toto graviditatis tempore factus abusus, nimia corporis segnities, ac diuturna cujuscumque veneni præsertim gallici susceptio, mæstitia & his similia. Quando post partum aut nimio frigore aut convulsione, vasa uteri corripuntur, tunc repente constringuntur, & cessat lochiorum fluxus. Odores suaveolentes potenter uterum puerperæ claudere posse quotidiana docet observatio. Hinc caute advertendum, ne mulieres puerperam invisentes suaveolentibus odoribus inficiant.

*Quibus ex
causis fit lo-
chorum, .i. sup-
pressio.*

ciantur . Timor , & mæstitia id ipsum quoque efficiunt . Hisce animi pathematibus vasa totius corporis , & potissimum uteri constringi notissima res est . Hinc merito prudentes homines a puerperis omnes timoris & mæstitiæ notas abiiciunt , ne constrictis intempestive uteri vasis mulieris mors per citam lochiorum suppressionem adveniat . Verum febris acuta quacumque ex causa adveniente ad claudendum puerperæ uterum non datur potentior causa , quemadmodum quotidiana docet observatio . Hujus phænomeni ratio ex iis , quæ supra indicavimus , innotescit . Pedum refrigeratio vasa uteri quoque constringit . Sic mulieres puerperas per solum frigidum nudis pedibus ambulantes citam habere lochiorum suppressionem experientia innotescit . Id accidit per magnum consensum inter uterum , & pedes extantem .

§. 44. Hisce aliisque ex causis enatam lochiorum suppressionem gravia sequi solent mala . Impuro enim miasmate sanguis inficitur , & juxta varias partium morbosas dispositiones varia acci-

Eratam lochiorum suppressio- nem gravia excipiunt mala .

cidunt mala . Sive quod sanguis puerperii in utero veniens ad contactum aeris putrescat ; & hoc putridum miasma per vasa inhalantia uteri in universam liquorum massam infusum , cunctos humores circulationi obeundæ destinatos pessundet , sive quod bonus sanguis necessario per rupta uteri vasa post partum expellendus redeat in corpus & plus justo vasa distendens æquilibrium fluidorum , & solidorum debitum destruit , sive tandem quod paratum in mammis lac , & per uterum tempore puerperii quodammodo educendum , per lochiorum suppressionem redeat in sanguinem lacteam cacochymiam generaturum , illud certum est puerperii suppressionem multa & quidem gravia excipere mala . Ex hac causa febris acuta ut plurimum accenditur , non raro ob vitiatam cerebri & nervorum œconomiam vertigines , convulsiones , ipsæque epilepsiæ fiunt . Pleuritides , peripneumoniæ , catarrhi suffocantes , pertinaces tusses , vomicæ citam mortem inferentes excipiunt memoratam suppressionem lochiorum . Nullum est viscus

in abdomine situm, in quod non irruit memorata lochiorum retentio, sicque modo jecoris, modo ventriculi, modo lienis, modo intestinorum, & mesenterii, modo renum, & vesicæ urinariæ inflammationes, obstructions, abscessus, corruptionesque practicas occurrunt tamquam suppressionis lochiorum confectarium. Haud raro mihi datur videre articulationum abscessus lentam febrim, indeque tabem inferentes puerperas per indicatam suppressionem lochiorum corripere, a quibus pene semper interfectæ sunt. Sed uteri inflammatione non datur frequentior morbus, qui eandem suppressionem sequi possit. Nam quando moratur intra uteri vasa puerperii fluxus ob aeris accessum fit humor vitiosus irritandoque utero aptus, sicque aucto a retrourgentis sanguinis impetu inflammatio fieri potest (i). Hujus inflammatio-

*Quibus si-
gnis cogno-
scitur ute-
ri inflam-
matio.*

(i) Hanc uteri inflammationem, quam recentiores vacant *hysteritem* sequentia comitantur symptomata. Dolet admodum uterus, & ad levem pressionem vehementer exacerbatur do-

tionis exitus periculi plenus est. Mulieres enim hac inflammatione correptæ ,
nisi

dolor, lingua arida, & rubicunda apparet, urinæ flammeæ excernuntur, nec non uteri regio intumescere solet. Linteum vulnæ labiis adpositum ne hilum quidem humectatur. Febris accenditur acuta cum pulsu duro, & vibranti copulata. Frequentes urinam mingendi, & fœces expellendi canatus puerperas hysterite affectas vexant, interim & urina parca excernitur, & alvus est stricta. Hæc uteri inflammatio aut resolvitur, aut suppuratur, aut in scirrhum, aut in gangrænam abit. Ex adparentibus doloris remissione, linguæ humectatione, febris vel cessatione, vel remissione, urinæ naturali indole, & his similibus spes lubest brevi inflammationem resolutum iri. Quando vero hæc symptomata augmentur timor est aut in abscessum, aut in gangrænam inflammationem abire. Gangrænæ præsentiam indicant cadaverosi halitus e pudendis emissus, pulsus celeriores & exiliores facti, linguæ nigredo, & omnimoda doloris cessatio cum virium prostratione, & facie cadaverosa copulata. Hæc imminentem mortem prælagiunt. Sanguinis repetitæ emissiones modo e pedum venis, modo e vulvæ labiis, modo e podice factæ, semicubea emollientia
bis

nisi statim curentur pluries pereunt (k).
 Et alibi venerandus senex ait (l).
 Uterinæ in ventribus durities cum dolore
 acute perniciosum. Timendum est ita-
 que ne post partum adueniat inflam-
 ma-

bis terve de die instituta, decoctiones cha-
 mæmeli aceto parum infectæ per siphonem
 intra pudendas frequenter immixtæ, clysteres
 emollientes pluries de die injecti, & super
 uteri regionem spongiæ aqua malvæ aceto
 infecta imbutæ semper positæ, vesicantia ad
 tibias admota, serum lactis depuratissimum cum
 aqua florum sambuci, & cum nitro depurato
 coniunctum interne sumptum, nec non emul-
 siones ex feminibus frigidis cum addito papa-
 verum semine paratæ, advesperascente die bi-
 bitæ, & his similia uteri inflammationem resol-
 vere possunt. Quod si aut in abscessum, aut in
 gangrænam morbus tendit remedia administran-
 da sunt, quæ valent apostematis repturam ef-
 ficere, indeque natum ulcus consolidare. Ute-
 ri gangræna omnia artis præsidia spernit, &
 irreparabilem mortem arcessit.

(k) Verba sunt Hippocratis de mulier. morb.
 lib. I. cap. 50.

(l) Coac. prænot. aph. 528.

matio, quam præfagiebat cl. Levret, dum videbat pulsus frequentiam, & celeritatem una, alterave post partum ora non remitti.

*Quibus au-
xiliis sup-
pressus lo-
chiorum
fluxus re-
vocari po-
test.*

§. 45. Tantam malorum multitudinem curare potest vel sola suppressi lochiorum fluxus revocatio. Huic obtinendæ valent phlebotomiæ in pedibus institutæ, & per hirudines in vulvæ labiis celebratæ. Cucurbitæ modo ventosæ, modo scarificatæ femoribus prope vulvam adpositæ prodesse quoque solent. Iniectiones per siphonem aquæ chamæmeli & papaverum intra uterum pluries da die immisæ laudandæ admodum sunt. Et femoribus vesicantiæ adplicuisse pro revocandis lochiis nunquam me pænituit. Clysteres emollientes sæpius de die iniiciendi sunt; & pediluvia mane & sero instituta summo opere laudantur. Quod si cum magnis uteri doloribus, atque convulsionibus morbus copulatur infessus ex aqua decoctione chamæmeli, & althææ infecta parati semel, iterum, tertio de die sunt instituendi. Internorum remediorum usus ea cum fiducia est laudandus, quo-

quoniam scilicet his & impetus humorum ad uterum augetur, & eorundem crassities densitasque solvetur. Serum lactis depuratissimum: cum addita decoctione chamæmeli, infusum ligni quassiaë, flores salis ammoniaci, & mirrham summopere laudant cordatiores practici. At in hisce exhibendis debita est methodus servanda. Quando uterus admodum dolet remedia stimulantia sunt semper arcenda, ne aucto stimulo visceris inflammatio arcessatur. In hoc casu æthyopem vegetabilem ad grana decem mane & sero propinare soleo, & tota die serum lactis decoctione chamæmeli infectum hibendum concedo, & emollientia fomenta super uterum pene semper instituo, nec non aquas emollientes intra pudendas, & in anum per siphonem pluries de die in incio. Hisce omnibus præcedit repetita sanguinis missio eo modo, quo nuper indigitavimus, celebrata. Si vero nullus inflammationis est metus, tunc convenit salem ammoniacum cum infuso ligni quassiaë mane & sero propinare. Immo mihi in usu est tres ejusdem
salis

falís drachmas in decem chartulas dividere, & harum unam omni bihorio propinare. In harum chartularum intervallo aut quassíæ, aut chamæmeli, aut fabinæ, aut aristolochiæ rotundæ, aut id genus aliarum plantarum levem infusionem puerperæ bibendam concedo. Si adest acuta febris cum primarum viarum fordibus, & cum magno humorum lentore copulata, post repetita emetica, & levia eccoprotica exhibita ex salibus catharticis, & incisivis præcipue elicitæ, balneorum frigidiusculorum, nec non chinchinæ cum floribus salis ammoniaci copulatæ usum præscribo. Vidi frequenter lochiorum fluxum revocari, cessata, aut saltem imminuta febre acuta. Si hæc adhibita sint ræmedia, & interim nullus appareat puerperii reditus, tunc non est neque multum irritantibus utendum, neque de eventu desperandum. *Tempori enim tamquam medicorum principi res omnis est committenda (m).* Accidit

(m) Verba sunt Cl. Sydenhamii in diss. epist. p. 530.

cidit aliquando ut aut, abortis criticis sudoribus, aut adveniente critica diarrhoea, enatum grave malum propter puerperii suppressionem feliciter curetur. Viderunt enim Sydenhamius (n), Hoffmannus (o), Boerhavius, & Swietenus (p), nosque pariter vidimus acuto morbo puerperas ob lochiorum suppressionem detentas per supervenientes universales, & criticos sudores, nec non apparentem salutarem diarrhoeam integre cito curari. Hæc ante oculos habere debetis, adolescentes, praxim exercitaturi, ut hos salutarès sudores, nec non criticam hanc diarrhoeam opportuno in tempore promovere valeatis. Quod si aut sponte, aut arte adhibita, prodeunt sudores, & solvitur alvus, atque ex his evacuationibus nil puerpera sublevatur, immo in pessum ruit, tunc symptomaticas, &

M

per-

(n) Loc. cit.

(o) Medic. System. ration: T. IV. Sect. 2. Cap. X.

(p) In Comm. Aph. Boerha: 1331. T. VIII. p. 256.

perniciosas has evacuationes compescere debetis, aliter brevi in tempore extinguitur ægra. Harum præscriptionum veritatem vos ipsa docebit praxis.

*Quomodo
nimius lo-
chiorum
fluxus est
cyrandus.*

§. 46. Quod si neque supprimitur, neque imminuitur, sed nimis augetur lochiorum fluxus, tunc in contrarium morbum puerpera ruit. Laborat enim hæmorrhagia uteri ob partum adveniente. Hujusmodi hæmorrhagia aut ex nimia sanguinis fluiditate, aut ex uteri vitio derivat. Ut plurimum accidit ex opportuna, & sensim facta vasorum uteri constrictione paulatim imminuitur lochiorum fluxum. Diximus, enim uteri vasa post fœtus & secundinarum expulsionem nimiam sanguinis quantitatem hiantia effundere, Sed paulatim contrahi debent, & tandem ad naturalem diametrum accedunt, quæ sensim sensimque imminuitur usque dum penitus cessat lochiorum fluxus. Si vero aut ob nimiam quam contraxerint atoniam, aut ob extranei corporis in utero commorantis præsentiam, aut ob aliam quamcumque causam hæc vasa angustari & claudi non possunt.

tunc

tunc nimius profususque est lochiorum fluxus, qui nisi cohibetur in grave vitæ discrimen ægram coniecit. Neque denegandum posse aliquando nimiam sanguinis acrimoniam, & fluiditatem morbum efficere. Summus faciei pallor, nimia corporis debilitas, nausea, & fastidium alimentorum, eorundemque vel optimorum tarda & difficilis coctio, restricta alvus, pedum oedemata, mammarum procidentia, inque ipis aut nulla, aut parca lactis generatio, vertigines, convulsionesque ex inanitione factæ, syncopes frequentes, pulsum faintitas, exilitasque, & alia his similia symptomata nimium lochiorum fluxum comitari solent. Horum omnium rationem afferre vetat stricta institutionum methodus, eaque parum vobis meditantibus innotescere potest. Quando hic morbus est curandus, sedulo advertendum, ut extraneum in utero situm corpus expellatur, quod obtinebitur ex iis remediis, quæ indicata sunt §. 42. Ceterum sequenti methodo nimium lochiorum fluxum compescere potestis, adolescentes. Animi corporis-

que quies statim est imperanda. Maniluvia frequenter sunt adhibenda, & optimum erit de manus vena sanguinem mittere. Fetus emollientes super mammas adpositi optimi sunt, & cucurbitulas super ipsas admotas summo-pere laudant practici. *Si mulieri menstrua velis sistere cucurbitam magnam mammis admove (q)*. Verum hæc non nisi summa cautione sunt præscribenda, ne penitus cessent lochia, & in alium priorem morbum incidat puerpera. Lac est propinandum, immo ipsa lactea diæta summo-pere laudatur. Opium thebaicum semel iterumque de die ad granum unum propinatum optimum remedium evadere solet. Nonnulli commendant spiritus acidos minerales ad temperandam sanguinis dissolutionem. Sed iterum moneamus vos oportet, adolescentes, ut indicata remedia in gravi, & periculoso lochiorum fluxu tantum præscribatis. Alio enim in casu hordei decoctionem, lac cum aqua
nym-

(q) Hippocr. Aphor. est 50. sectio. V.

nymphææ copulatum, mediocrem alui solutionem potissimum per clysteres procuratam, chinchinæ & simarhoubæ decoctionem parum frigefactam, summam corporis, animique quietem, & his similia levissima remedia valere immodicum puerperii fluxum compescere quotidiana docemur experientia. Si adest febris, a cujus invasione fluxus semper augetur, tunc curandæ feбри tota est dirigenda medicina iis remediis antifebrilibus, quæ utero nimis fluenti nocere non possunt. Postquam tentabunda manu præscripta sunt emetica, chinchina cum opii parca dosi copulata, & partitis vicibus propinata, nec non hydrogala pluries de die epota omnem implere paginam solent.

§. 47. Nec minora incommoda patiuntur puerperæ propter lactis in mammis generationem. Nimirum ex physiologicis innotescit post uteri a partu contractionem magnam sanguinis quantitatem in mammis contrivare, & ab corporis mamillarum multa distensione lac parari, quo per duos tresve annos enutritur infans. Et cum cl.

Que patiuntur mala puerperæ a lactatione.

auctoribus præsertim Swietenno (r) convenimus aliquid lactis tempore graviditatis quoque in mammis generari, cujus aliqua portio præsertim ultimo gestationis tempore, in uterum venit, alendoque foetui destinatur. Et post partum, si clauditur uterus, cessatque puerperii fluxus, inter humores, qui sanguinem inficere solent, hæc lactea cacochymia per constrictionem vasorum uteri non expurgata recensenda est. Sed semper dicendum est magnam lactis quantitatem post partum generari. Quando itaque venit in mammas multa hujus sanguinis quantitas, distenduntur admodum sinus lactiferi, & nervi quandam patiuntur distractionem, a qua & dolor, & pauca febris excitatur, quam vocant *febris lacteam*, cujus nulla ratio est habenda. Post enim duos tresve a lactis preparatione dies sponte cessare solet. Neque pertimescenda est enatae fe-

(r) T. VIII. Comment. aphor. Boerh. n.

febris ultra debitum duratio, si per hanc febrem uterus puerperii tempore repurgatur. Nam per enatas leves suppuraciones recedunt ab utero inquinamenta, & sordes, sicque uterus purus sensim sensimque factus ad naturalem suum statum redit. Ita observamus purissimas, & fatidas materias ab pudendis puerperæ aliquando exire, a quarum materiarum educatione raro a febre, licet parva dissociatur. Sed haud raro accidit, ut aut ob magnam lactis præparati copiam, aut, ob ejusdem summam crassitiem, aut ob naturalem lactiferorum sinusculorum angustiam, aut ob aliam quamcumque causam præparatum in mammis lac non venit extra papillam pro suctione infantis nec a venis inhalantibus hauritur, nec per vasa lymphatica transit in sanguinem, tunc mora spissius densiusque factum propter aquearum particularum distensionem gravia parere potest incommoda. Distendit, irritatque admodum mammillarum corpus, facitque tumorem durum, dolentem, non sine febre puerperas vexantem. Et haud raro ac-

*Tumor lac-
tæus mam-
marum.*

cidit, ut magnæ irritationi accedens auctus retrougentium globulorum sanguinis impetus, oriatur inflammatio, quæ ut plurimum in abscessum transit; quo mammæ naturalis status admodum vitiatur. Et non raro indicata lactis congestio in durum & longævum tumorem commutatur, cujus reliquæ per menses & forsau annos remanent in mammis. Nec papillæ suo morbo carent. A nimio enim lactis confluxu, tenerrima earum cutis rumpitur, & dolentissimæ fiunt *rhagades*, quarum dolor a pueri suctione nimis augetur solet.

Quomodo
lactæus tu-
mor curari
potest

§. 48. Solvendo lacteo remorato tumori valent frequentes fofus tepidæ aquæ, aceto infectæ super mammas adpofiti, & constans per pueri suctionem lactis eductio. Quando enim fuit extra papillas lac raro inflammatio, aut alius periculofus morbus mammas adoritur. Si adfunt inflammationis indicia fanguis femel iterumque est mittendus, nec non aquæ florum sambuci cum ferro depurato copulatæ haufus frequentes funt puerperæ concedendi. Et utile quoque

que erit hos haustus infectos nitro depurato , aut sale polychresto reddere efficaciores . Diæta per paucos dies est imperanda , chysteres emollientes sunt iniiciendi , & numquam ab fotuum ex aqua sambuci cum aceto copulata paratorum super mammas admotione cessandum est . Si nulla resolutionis nota hisce adhibitis oppareat , & videtur tumor in suppurationem tendere , hæc est per cataplasmatibus malvæ adpositionem facilitanda , & promovenda suppuratio , qua facta , lanceola , aut bistorino obfessus est aperiendus , indeque , ut ulcus curandus . Si enatus est durus tumor hic debet ad resolutionem perducitur per jugem oxycrati adplicationem , & per frequens aquæ stillicidium super mammas factum . Enatas in papillis rhagades curare solent medici frequenti adplicatione vini mirrhati , vel jugi aquæ sambuci salis prunellæ solutione factæ efficacioris lotionem . Gummi arabicæ solutionem non parum profecisse vidi . Ceterum non deest nec medicus , nec muliercula , quæ pro pupillæ mamarum rhagadarum dolentium curatio-

ne

ne suum non laudat specificum. Superiori mense curabatur nobilis juvenis primipara profundas in utraque mammarum papilla rhagades habens frequenti adplicatione decoctionis ligni guajaci cum spiritu salis dulcis copulatæ. Hactenus de Mulierum morbis. Nam uteri hydropem, obstructionem, ulcusque ex iis, quæ in praxi describenda adnotavimus & cognoscere, & curare facile potestis adolescentes. Procedamus modo ad indicandos puerorum morbos.


DE MORBIS

PUERORUM

PRÆLECTIONES

ARTIC. I.

Regimen nuper nati infantis:

§. I.  Um infans est in lucem editus novas experitur mutationes. Aëris ambientis, & durarum rerum attactum sustinet. Pulmonum dilatationem habet, per quos totus sanguis ab uno corde ad alterum fertur. Agit diaphragma, & nova per jecur humorum circulatio peragitur. Tantæ mutationes vim quamdam tenerrimo infanti faciunt. Nil itaque mirum si novus hic aëris hospes fletu indicat se in lacrymarum vallem venisse. Neque deligandus est funiculus umbilicalis, nisi certo constet puerulum respirasse. Si mucosæ sordes nares, & os occupant, diligenti obstetricantis manu sunt ab-

*Veniens
recenter in
lucem in-
fans quo-
modo tra-
ctari debet.*

abstergendæ , ut transituro in pectus ac-
 ri facilis via pateat . Quando funicu-
 lus est ligandus sedulo advertendum ,
 si ecchymosis faciem , aut aliam cor-
 poris partem occupat . Hanc sanant
 paucæ sanguinis guttæ e funiculo edu-
 ctæ . Post hæc funiculus triplicato , vel
 quatruplicato filo per ceram ducto ad
 distantiam duorum digitorum ab umbi-
 lico ligatur . Et ligatura non tam for-
 tis faciendæ est , ne sciantur tunicæ fu-
 niculi , neque tam debilis sit oportet
 ut metus sanguinis effusionis absit . Quod
 si in lucem veniat foetus , cui per quam-
 cumque causam corrosus sit in umbili-
 co funiculus ita , ut deligari nequeat ,
 tunc admota duplicata plumaceola levi
 pulvere astringenti imbuta , nec non
 adplicato tenaci emplastro , prudenti fa-
 scia superposita , locus custodiendus est
 ne exeat sanguis . Hoc peracto statim
 in balneo aqua tepidiuscula & vino pa-
 rato immergendus est infans , sicque
 diligentî manu est tota cutis abluenda
 ab fordibus , quas ipse contraxerat dum
 amnii liquoris contactum in utero sub-
 stinuit . Peracta corporis proba absterfio-
 ne

ne obvolui debet corpus tenuibus pan-
 nis lineis cum superaddito paulo gra-
 viori involucro, & ablegato improbo
 fasciarum more (s), ita laxus & ex-
 pe-

*Abiicien-
 dus est fa-
 sciarum u-
 sus.*

(s) Mirum quantum sint plenæ præjudiciis mulierculæ fascias tenerrimo infantulo paraturæ. Credunt non posse rectam, & opportunam servari in puerulo machinam, neque ossa recte crescere valere, nisi extensis manibus, & pedibus fortiter constringatur pueri corpus in fascia, sicque ipse quemcumque flexionis motum facere non valeat. At multæ sunt miseræ, quas patitur infans ob malam fasciarum administrationem. Distorquentur enim ossa articulationum, spina curvatur, pectus angustatur, alioque chronico morbo afficiuntur solidæ partes, quibus malis ignorantæ muliercularum pænas toto vitæ tempore miser homo patitur. Frequentissimam hominum corporum distorsionem, & vitæ imbecillitatem nostris in regionibus fasciis male adhibitis acceptam referre originem cordatiores medici credunt. Populi, quibus nullus est fasciarum usus, sunt semper nostris hominibus robustiores, & corpora habent rectiora, vitamque ducunt longævioram. Natura sibi ipsi sufficiens est, nec ullo habet opus artificio ad reddendam machinam omnibus numeris absolutam. Bruta nullo artificio crescunt optimam partium confor-

peditus in lecto, aut in cuna est infans collocandus. Dum in balneo memo-

mo-

formationem habitura. Optimum consilium est tenerum infantis corpus collocare in molli lecto, aut in cuna, & tantum corpus pannis obtegere, quantum sufficit, ut ab aeris injuriis arceatur. In aere libero, & undique perflato enutrirī debet infans, & quantum fieri potest, debet arceri ab inquinamentis, quæ aer suscipit ab hominibus, & animalibus viventibus. Misera est fors puerulorum in nosocomiis expositorum, quorum brevis vita est & propter alimenti defectum, & propter aërem impurum a multis viventium in angusto loco vaporibus scædatum. Neque stricta debet esse transpirationis custodia. Optimum erit totum corpus infantis ita atmosphæræ aptare, ut reliquæ cutis partes manus, & faciei conditionem obtineant. Utile quoque erit bis de die cutem infantis simplici aqua abluere, ne ab urinæ & scæcum sordibus nimis scædatur. Abiiciendus, & absolute damnandus mos ille est, quo infans nimia cunæ agitatione fortiter commovetur. Cerebrum, & nervi mollissimi ab improba hac agitatione pessime afficiuntur, quo & stupiditati, & convulsionibus infantes postea subiiciuntur. Cetera ad optimum infantis regimen mox infra descripta inveniētis.

morato jacet infans sedulo inquire debet tota ejus machina . Si adsunt tumores , si factæ sint luxationes , si viæ urinæ & sæcum sint patulæ , si lingua est frænulo ita legata , ut pro functione impar evadat . Tunc lege artis & tumores , & luxationes , & clausæ viæ urinæ , ac sæcum , si qua sint , & curandæ & aperiendæ sunt in hisce tennerrimis corporibus , & probe recidendum est linguæ frænulum , si nimis constrictam , & ligatam in ore eam teneat . Quando adest pellicula intestini recti finem obcœcans hæc est abscindenda , & sic patet exeuntibus sæcibus anus . Si vero deficit hic finis , tunc certe moritur infans (t) .

§. 2. Paulo post ortum foetus ope *Meconii* respirationis , qua diaphragma comprimit *eductio est* *procuranda* *& lactatio* *probe est* *instituenda.*

(t) Consulite La Motte trait des accouch. liv. 1. Peu pratique des accouch. liv. 2. chap. 1. Levret l'art des accouch. p. 210. , Acad. de Chirurg. T. 1. , Petit ibid. p. 378. , atque alios gravissimos auctores , apud quos regulæ occurrunt , quibus sepultus anus puerulorum inveniri , & aperiiri potest .

mit viscera abdominis, nigram tenacemque educit ab ano materiem, quæ ob similitudinem succi papaveris inspissati a veteribus dicta est *Μηκῶνιον meconion*. Sed & non raro pueri tarde nimis hujusmodi materiam expellunt. Hinc fit, ut ab irritatione crassis intestinis ab retento meconio facta irrequietus insomnis, convulsusque infans evadat. Huic materiæ expellendæ aptavit natura primum matris lac, quod instar seri resolvit, lubricatque totum intestinorum tractum tenaci & viscida semper crassa obductum. Hinc male puerperæ ab indoctis mulierculis suasæ hoc primum abiiciunt tamquam noxium, aut saltem inutile lac. Quod si post sumptum *cholostrum* (sic vocatur hoc primum præparatum lac) non exit meconium, tunc propinare solent medici unum, alterumque cochleare sirupi de cichoræa Nicolai cum aqua melle, & pauxillo saponis infecta, iniciuntque clysteres per exilem siphonem paratos, &c. Post eductum meconium una alterave a partu die mammis matris aptandus est infans, ut per suctionem excipiat

op-

opportunitate ab illa matre alimentum, a qua novem mensium spatio in utero clausus fuit enutritus. Neque, nisi intercedente gravi necessitate, ab salubri matris lacte arceri debet infans. Periculum semper est enim absque ulla necessitate alieno lacte filium enutriri sinere. Si adest legitima causa, tunc solum id permitti potest. Novi plures matronas ceteroquin honestas, & bonis ornatas moribus, quæ, ut lactationis incommoda effugirent, alienis nutricibus filios alendos committunt. Si puerpera convulsionibus subiecta est, si scorbutica labe vexatur, si tabe confecta est, si asthma, aut profunda viscerum obstructione laborat, si paucum generat lac, & hoc paucum generatum lac non est alendo puero sufficiens, si gravida iterum evadit mulier, si mammarum organa non habet pro pueri suctione opportuna &c., tunc infans alieno sugendo lacti est destinandus (u).

N

la-

(u) Iplis feris & belluis crudelior censenda est illa mater, quæ sine necessitate filium ab suis

lactatio sequentibus regulis gubernari debet. Primis temporibus pauca lactis quantitas, eaque partitis vicibus puero
ex-

luis uberibus arcet. Naturæ lege sancitum est matris lacte enutriri debere filium, cujus generationem, evolutionem, nutritionem, perfectionemque in utero ipsa fecit. Convenit enim, ut filius, qui nondum sibi ipsi alendo sufficiens est, indigetque aliena ope, eo alimento enutriatur, quod concruit cum illo, quod novem mensium spatio in utero obtinuit. Hoc est sane proprium matris lac. Sic puer enutritus hoc lacte sanitatem, mores, virtutesque parentum gerit. Quando improbo, & semper damnando statuto mater filium ab suis uberibus arcet, jam sibi ipsi, & filio nocet. Nimirum præter gravia incommoda, quibus mammæ ob diuturnam lactis moram subiiciuntur, mulieres propter lacteam cacoehymiam in sanguine genitam plures patiuntur morbos & chronicos, & acutos, a quibus haud raro ipsas interfici quotidiana ostendit experientia. Filio nocet ex ratione, qua constat ut plurimum non convenire puero alienum lac, unde brevis & ærumnosa evadit ejus vita. Et novis, alienisque moribus filius imbutus solet esse genitoribus tristitiæ & infelicitati. Utinam & mulieres voluptatis sensu

exhibenda est. Factus paulo grandior
 majorem lactis quantitatem exposcit.
 Non debet ejus stomachus semper lacte

N 2

re-

su ductæ ad filios generandos ratione, & pru-
 dentia pariter ducantur ad filios proprio lacte
 alendos. Sciant tandem proprii corporis par-
 tem esse illum filium, quem perdere amant.
 Ceterum sive necessitate, sive voluntate acci-
 dit, ut nutrix arcessenda sit, ipsam sequen-
 tibus conditionibus eligere debetis, adolescen-
 tes. Faciei color sit aut ameno-roseus, aut
 albo-fuscus. Ætas ejus neque infra vigesimum,
 neque supra trigesimum sit. Optime debet
 esse constructum pectus, & mammarum nec mul-
 tum amplæ & crassæ, nec multum exiles sint.
 Laudabilem enim torositatem servantes de-
 bitam lactis quantitatem alendo puero oportu-
 nam servant. Papillam habere debent nec
 multum amplam, nec multum parvam. Hu-
 jusmodi enim papilla ori infentis aptari po-
 test. Nutrix bonis sit ornata moribus, nec
 pathematibus admodum subiici debet. Lætitiâ
 in animo semper habeat oportet. Nullo sit
 maculata morbo, præsertim cutaneo, & ab ve-
 nereæ luis contagio semper immunis esse de-
 buit. Non sit primipara & post diem a partu
 quadragesimum arcessenda est. Utatur cibis nec
 admodum tenuibus, nec admodum crassis. Olera,
 fru-

repleri, ut temperetur a fletu. Non semper fletus infantis famis indicium est. Ut plurimum pendet ab irritationibus, quas

fructus horæos, panatallas, carnes vitulinas assas, ova recentia, jura carniū animalium recenter maſtatorum, piſciculos ſaſſatiles & hos ſimiles obeundæ digeſtioni opportunos ſeligere convenit cibos. Motum modo pedeſtri itinere, modo curru temperatum inſtituere debet nutrix. Somnum capiat tantum quantum ſanitati ſuæ, & generando lacti convenit. Salubri in aere, & in domo ampla omni fœtore, & impura exhalatione orbata vivere debet. Si alvus admodum eſt ſtricta clyſteribus & levibus eccoproticis aliquando laxari debet. A veneris exercitio non penitus abhorrere debet nutrix. Nam nec puero, nec nutrici venus nocet. Neapolitanæ Matronæ, quæ proprio lacte alunt filios, & ad perfectam ducunt vitæ conditionem cum propriis maritis quotidie coeunt, nec ſibi ipſi, nec filio obſunt. Nutrices prætio in magnatorum, & nobilium domibus receptæ ne filiis noceant oblectamentis, & illecebris alluciantur, quibus frequenter venerem appetunt, a cujus privatione ita mæſtæ evadunt, ut lac mutatum, ac degeneratum infanti exhibeant; & ita horum ſanitas labefactatur. Neque di-

ca-

quas tenero intestino creat indigestum
lac. Non raro propter malam fasciæ
positionem in diuturnum ruunt fletum

N 3

puer-

catur usu veneris accidere posse nutricis gra-
viditatem, & ita evadere lac alendo puero
impar; nam præterquamquod non semper eva-
dit mulier gravida usu veneris dum ejus mam-
mæ multo abundant lacte, quo puerum nu-
tricat, & uterus penitus est menstruatione or-
batus; sed detur, quod prægnans fiat, muta-
tur nutrix vetus, & nova opportunior selige-
tur. Semper pejor status infantis est, dum
nutrimentum sumit a nutrice, cujus per ta-
citam animi mæstitiam admodum degeneratum
sit lac, quam si ob nutricum mutationem ma-
nifesta lactis insalubritas ab ipso arceatur. Boni
lactis color albus, nullus odor, dulcis sapor esse
debet. Ejus consistentia sit temperata, scilicet lac
nec multum crassum, nec multum tenue esse
convenit. Quando lactis guttula super unguem
posita temperate fluit, tunc opportuna est
ejus conditio. Ceterum nimis fluidum lac ci-
bi crassiores, veluti caro, jura, ova, pisces,
&c. reddunt crassius; & olera, fructus horæi,
panatellæ &c. densius lac solvunt. Verum ex-
perientia didici, nullum lac ex sola visione
nisi usus ejus intercedit, opportunum alendo
puero statui debet. Nam non raro quod ap-
pa-

pueri, a quo non quiescunt, nisi, solutis fasciis, membrorum libertatem obtineant. Quando urinæ & fæcum sordibus coinquinata cutis irritatur fletu a matribus exposcunt pueri, ut munden- tur. His quotidiana aquæ ablutio summopere prodest. Et pannorum ac fasciarum frequens renovatio non parum confert. Quando nimio lacte stomachus pueri scatet, bonum est aquæ fontis cochlearia multa repetitis vicibus ei dare, ut factum fluidius lac facile digeri possit. Ventris frequentes solutiones, virides admodum fæces, febres pene continuæ, corporis consumptio, enatæ convulsiones, perennes vigiliæ, corporis inquietas, & his similia indicant lac non conferre puero. Quocirca si, adhibitis quibusdam auxiliis, nullum levamen

paret optimum lac infanti nocet, & quod videtur malum prodest. Nostrum quotidianum effatum est unicam attentionem medici esse debere in seligenda nutrice qualitatibus nuper notatis prædita, & quoad lactis conditionem non nisi usu, & experientia statui posse.

men sentit puer, statim cogitandum est ad lac ipsum mutandum. Nec novum est videre secundam, tertiam, quartamque nutricem non esse alendo puero opportunam. Haud raro accidit puero humanum lac non conferre, tuncque optimum est ipsum enutrire brutorum solo lacte. Et, facta veluti artificiali mamma, ejus ori exhibendum est lac brutorum recens eductum. Semper panatellis utilius est indicatum brutorum lac; & vidi non raro pueros ad perfectum machinæ incrementum pervenire solo brutorum lactis usu. Panatellæ, nisi completo anno, non sunt infanti concedendæ. Nimis anticipatus harum usus solet parere obstructions, consummationes, & febres, quæ fiunt ab indigestione ciborum tenerri o ventriculo pueri inconvenientium. Damnandus est mos opiata querulo infanti semper exhibendi. His enim sensus obtupescere solent, & advocantur convulsiones, a quibus interficitur infans. In datis morbis, & præcipue in dolorum casibus tantum concedendum esse opium tentabunda manu suadet prudentia. Quo pueri adultiores

fiunt, eo solidiori cibo indigent. Cibus hujusmodi cum lactatione eo sensu convenit, quo scilicet ipse exhibetur in horis mediis suctionis lactis. Sic accidit, ut adveniente ablactationis tempore reperiatur puer in statu habendæ opportunæ nutritionis ab solo ciborum usu. Circa secundum ætatis annum cessare solet lactatio, & primi omnes dentes in ore enati sunt, & tunc puer incipit facere suis pedibus gressus licet dubios, & incompletos ex ratione, qua nondum ossa debitam firmitatem pro machinæ sustentatione obtinuerint. Vestium usus pro varia ætate variare debet. Semper damnandæ & abiiciendæ sunt lorice ex ossibus, aut aliis duris corporibus contextæ. His enim angustatur pectoris cavitas, spina curvatur, & vitæ ærumnis plenæ nec non brevissimæ ducendæ destinatur puer. Diuturni puerorum fletus non sunt compescendi verberibus, & excitatis forribus timoris ideis. Hisce enim stupidiores evadunt sensus, & pueri summis imbuti præjudiciis inutiles societati homines evadunt. Optimum consilium est irrequie-

quietos, & diu querulos pueros temperare modo inventis bellariis ejus oculis admotis, modo suavi oblectamento, modo pro visione earum rerum, quæ sunt ei chariores, modo alia prudenti methodo. Ceterum sciendum est hæc in ætate, scilicet circa tertium annum ob cordis summam irritabilitatem, ob magnam nervorum sensibilitatem, obque multam fluidi nervei quantitatem, debent pueri irrequietis semper motibus agitari, quos compescere non debet semper sagax pedagogus. Utinam mulieres, quibus hic puerorum status ut plurimum est commissus, methodum rectam scirent educandorum probe filiorum, certe societas hominum inutilibus, & forsan noxiis individuis non abundaret (x).

AR-

(x) Non animus mihi est de *physica puerorum educatione* dicere; statutos enim institutionum limites excederem. Plurimi clarissimi occurrunt auctores, qui de hac re exacte nimis scripserunt. Inter hos merentur laudari Maupertuisius, Condillachius, Rullenius, &

ARTICULUS II.

Infantis Epilepsia.

Cur pueri §. III. **M**agno cerebro, habita corporis proportione, magna nervorum mollitie, sensibilitate, ac irritabilitate summa gaudere infantes omnes nos scimus. Ex quo fit, ut vel levissimæ irritantes causæ eos faciant subjectos convulsionibus, quæ eo sensu ad epilepsiæ conditionem accedunt, quoniam scilicet & per periodos invadant, & cum sensuum internorum, externorum-

& Ballexerd'. Maria Teresia Arezo nobilium mulierum Neapolitanarum decus, & ornamentum mihi frequenter legere solet ea, quæ in scriptis de physica puerorum educatione retulit. Sancte testari possum ea & eleganti stylo, quo scripta sunt, & profundiori doctrina, qua scatent ab omnibus legi debere. Utinam & in lucem Nobilissimæ juvenis de physica puerorum educatione nova excogitata prodirent. Hactenus de regimine infantis nuper nati. Nostra interest puerorum morbos enarrare.

rumque abolitione, nec non cum multa spuma ab ore apparente copulatæ observentur. Hæc epilepsia altera est idiopathica, altera sympathica. Quando scilicet irritans causa ipsum adurit cerebrum idiopathicam, quando extra cerebrum veluti in ore, in ventriculo, in intestinis ipsa agit sympathicam facit infantium epilepsiam. Sive una, sive altera excitanda est epilepsia, semper verum est, per paroxysmos eam ludere solere, cujus paroxysmi reditus eo sunt frequentiores vehementioresque, quo causa irritans fortior inemendabiliorque est, quo nervi molliores sunt, quo suæ origini infans proximior est. Quando invadendus est morbus infans ultra solitum fit gemebundus, irrequietus. Oris labia frequenter agitantur, stridentque dentes, & infantis facies volatili veluti macula rubra inficitur. Pulsus observantur crebriores, restrictioresque, & respiratio quodammodo suspiciosa evadit. Oculi mobiliores, & pellucidiores apparent. Post hæc paroxysmus irrupit, in quo convulsivis undique motibus infantes agitantur, & cum

*Quibus
symptomati-
bus ludit
infantis
epilepsia.*

cum sensuum internorum, esternorum-que amissione multa spumæ quantitas ab ore educitur. Nulla est pars & interna & externa, quæ maximis non agitur convulsionibus. Superioribus annis vidi immanibus convulsionibus epilepticis puerulum ita vexatum, ut dexter oculus ab sua orbita tanto cum impetu divulsus proximo lectuli parieti allideret ita, ut quassatus remaneret. Et infans post unam, alteramque tanti morbi invasionem obire solet. Nec raro accidit infantulum post cessatum epilepticum paroxysmum videre magno sopore correptum, cui stertorosa accedit respiratio, & post paucum temporis intervallum apoplecticus moritur. Frequens ab epilepsia in apoplexium transitus est.

Quenam sunt infantilis epilepsie causa.

§. 4. Signa, quibus epilepsia infantilis cognoscitur non obscura sunt. At hujus morbi materialis causa haud patens esse solet. Quando ab materno sanguine labes hauritur, qua epilepsia in infante excitatur, non nota causa moritur convulsus infans. Superiori hebdomada famuli mei infans epilepticus mo-

mo-

moriebatur post primam ab ortu hebdomadam. Summam adhibui diligentiam ut morbi causam investigarem, nec aliud cognovi, nisi ab muliere temulenta, vinosa, & impuro sanguine prædita enatum infantem sui morbi, indeque mortis causam ab matris sanguine accipere. Verum & lactis degeneratio epilepsiam ut plurimum parere solet. Irritatis enim ab hoc lacte vitiato ventriculi, & intestinorum nervis mollibus, cerebroque communicatus affectus vehementissimæ constituuntur convulsiones. Cognoscit medicus hanc esse morbi causam, dum vidit halitum acidum ab ore infantis educi, & fæces æruginosas ac fluxiles ab ano excerni, & vires materias vomitu eductas. Quando morbum facit morbillare, variolosum, scarlatinum, aut id genus aliud exanthematicum venenum, cujus præsentiam cognoscetis ex iis, quæ alibi, ubi de variolosa, & morbillosa febris actum est, indigitavimus. Illud certum est convulsiones puerorum sæviores esse in retropulsione exanthematici veneni. Et ex meconii retentione

quo-

quoque fieri epilepsiam infantilem certum est. Quando post unum, alterumve a nativitate diem non excernitur meconium, & apparent convulsiones, absque dubio eas ab irritatione meconii intestinis facta derivare dicendum est. Crustæ lacteæ, aut tineæ acres materies retropulsæ possunt ipsum adoriri cerebrum, & idiopathicam facere epilepsiam. Nec raro eundem morbum parit scabiei retropulsio. Difficilis dentitio, vermes in intestinis stabulantes quoque convulsiones epilepticas in pueris excitant. De his morbis in peculiari articulo dicentes signa exponemus, quibus cognoscere potestis, adolescentes, puerorum convulsiones ab iisdem fieri morbis. Hæc tantum adnotamus ut plurimum vermes generari non solere in pueris ante ciborum esum. Et febrilis epilepsiæ exemplum haud rarum in medicina occurrit. Hujus existentiam declarat cursus febris, quem sequitur epilepsia, ita ut augetur, aucta, imminuitur, imminuta, cessat, cessante febre. Et profusam diarrhoeam in pueris tamquam ab inanitione convulsiones

nes

nes epilepticas facere posse docet observatio. Tandem ab aphtis oris, & oesophagi, nec non a lapide intra vesicam urinariam genito infantilem epilepsiam quoque produci decet cl. Auctor (y).

§. 5. Raro ab hoc morbo correpti ^{Infantis epilepsie curatio.} infantes liberantur. Tenerrimum vitæ stamen facile rumpitur ab tantis vehementibus corporis agitationibus. Quando immanibus convulsionibus torquetur puer satis est, ut aliquod obstaculum in ore inducatur, præsertim si prodiiti sint dentes, ne vehementi maxillarum constrictione vulneretur lingua. Post convulsionum vehementiam finitam ad tollendam causam morbi irritantem animus est convertendus. Sanguinis impuritatem corrigere possunt balnea frigidiuscula pluries de die parata ex æqualibus

(y) Nicolaus Rosen de Rosenstein, cui debetur egregius tractatus *de puerorum morbis* germanico idiomate scriptus, qui in italicum sermonem conversus est a Joanne Baptista Palletta, ac multis adnotationibus præstantissimis ditatus.

bus partibus aquæ fontis & lactis. Matris, aut cujuscumque nutricis lac depurari convenit herbis antiscorbuticis, vipera-
tis, aliisque id genus remediis sumptis. Sanguinis missionem aut lanceola, aut hirudinibus factam unius, alteriusve unciaë vel in paucorum dierum natis infantibus convulsionibus vexatis prodesse posse experientia docemur. Sed advertendum est, ne ob summam virium imbecillitatem vicinam expectent mortem infantes. Hoc enim in casu per sanguinis educationem acceleratur morbi adventus. Ex pulsuum vibratione, & constantia indicium desumi potest celebrandæ phlebotomiæ. Meconium retentum expellunt ut dictum est, feri lactis depurati cum pauxillo sirupi cichorææ copulati sumpta cochlearia quædam, clysteres per siphonem tenuem injecti aqua paucis saponis infecta parati, &c.. Lactis acrimoniam temperare & corrigere solent aliquot aquæ magnesiæ nitri infectæ unciaë pluries de die sumptæ, pulveres oculorum cancrorum & matris perlarum, olei amygdalarum dulcium cochlearia epota. Hisce nil proficien-

ficientibus ad lactis mutationem cogitandum est. Vidimus non raro ob bonam mutati lactis conditionem epilepticos infantulos instar incantamenti curatos. Ceterum in quocunque sive idiopathica, sive sympathica epilepsia casu opportuna semper sunt nervina, & antispasmodica remedia. Sic laudanum opiatum, moschum electum, castoreum, pulverem valerianæ sylvestris, liquorem anodynum Hoffmanni, & his similia tollendis convulsionibus efficacissima remedia modo interne sumpta, modo per clysteres in anum injecta prudenti manu præscripta summopere profecisse non semel vidi. Crustæ lacteæ, aut tineæ retropulsionem, admotis brachiis, & potissimum occipiti vesicantibus, extra corpus evocari solet venenum. Nec vana sunt remedia, quæ valent humorum infantis depurationem efficere. Hac in ætate parum, aut nil utilitatis obtineri potest a remediis ab infante sumptis, quippe qui nil efficacioris pharmaci deglutire solet. Tota cura nutrici est committenda, cui remedia depurantia, & lac corrigentia

O

dan-

danda sunt. Sic aquam antiveneream, ptisanas & farsa parilla, & cortice ligni sancti paratas, decoctiones dulcamaræ, graminis, endiviæ, & aliarum id genus herbarum bibendas dantur. Nasturtium, cochleariam, viperam, cichoræam, caneros fluviatiles, ranas, testudines, & his similes antiscorbuticos cibos pro sanguinis depuratione optimos esse experientia docet. Tandem puerorum convulsionum ab aphthis, a dentitione, & a vermibus factarum curationem sequentia indicabunt.

ARTICULUS III.

Difficilis dentitio . Aphthæ .

*Undenam
difficilis
den tito .*

§. 6. **C**irca sextum, septimumve menses sem adparere solent primi dentes in ore infantium, & circa secundum annum cessat hæc prima dentitio. Quando erumpunt dentes divelli, distrahi, & rumpi debent fibræ corporis illius spongioli, quod gingivas efficit. In hac ruptura cum necessaria nervulorum irritatione copulata senti-

tur

tur dolor, qui eo est sævior, quo gingivæ sunt duriores, sentibilioresque. Et cum nervi per gingivas excurrentes cum nervis ventriculi, & intestinorum communicant, nil mirum, si actu eruptionis dentium pueri vomitu, diarrhœa, & doloribus abdominalibus vexentur. Nec rarum est videre convulsiones vehementes, & febres comitari indicatam eruptionem. Convulsiones fiunt ex perturbatione fluidi nervei, quam facit molle cerebrum per sympathiam affectum. Et febris accenditur ex inflammatione gingivas admodum irritatas invadente. Evadit difficilis dentitio, quando durum dentis corpus urgens gingivam magnam invenit resistantiam, cui vingendæ admodum augeri debet dentis ipsius actio. Hinc tarde dens erumpit, & cum summo dolore eruptio fit. Ægrotat ab hac causa puer, & cognoscitur tunc ab dentitione infirmari, quando absunt aliarum ægritudinum notæ, & apparent gingivæ tumidæ, ac rubicundæ, insolitoque calore afficiuntur. Puer hoc in tempore frequenter digitos ad os adplicat, sæpe labia mordet, & multam salivæ

copiam effundit. Alvi dejectiones sunt copiosæ, & viridis materies excernitur. Omnia hæc symptomata fiunt post dentium eruptionem, & raro ab hoc morbo ægri interficiuntur.

*Quomodo
curanda est
difficilis
dentitio.*

§. 7. Pro commoda dentium eruptione bonum est pueros frictioni gingivarum assuefacere, qua evadunt gingivæ tenuiores. Convenit optimo lacte infantes enutrire, quo ut ceteræ partes ita dentes optimam sortiuntur conditionem; ideoque facile rumpunt gingivas, & exeunt. Si oris inflammatio percipitur debet emitti sanguis ad unam alteramque unciam hirudinibus retro aures admotis (z), & frequenti aquæ cum lacte copulatæ ablutione gingivæ tractandæ sunt. Ad emolliendas gingivas laudant cerebrum leporis, sirupum violarum, & sirupum althææ, butyrum in-

(z) Sanguinis missionem in gingivarum inflammatione orta a difficili dentitione nimis commendat Cl. Sydenhamius Prax. Medic. Cap. V. p. 248.

insulfum, oleum amygdalarum dulcium, & his similia. Verum nos hisce remediis opportuniorem feliciorēque vidimus aquam tepidiusculam cum lacte copulatam pluries de die gingivis admotam. Et, ut diutius supra gingivas indicatum remedium retineri possit, accipienda est tenuis spongiæ frustulum, & aqua lacti conjuncta imbui debet, sicque hoc frustulum emollienti remedio madidum illi parti gingivarum est applicandum, ubi percipitur calor, tumefactio, & dolor major. Vehementes dolores & convulsiones ab difficili dentitione excitatas compescere possunt applicata anodyna, & narcotica ex decoctione papaverum cum addita laudani opiati solutione parata. Hoc remedium & parti affectæ admoveri, & interne propinari potest. Ceterum, hisce nil proficientibus, ad gingivarum incisionem levi scalpello factam deveniendum est. Hæc operatio diligentis chirurgi manibus committenda est.

§. 8. Aphthæ sunt parva vulcuscula ^{Quid} in ore & faucibus puerorum enata. ^{sunt aph-} Sic ^{thæ.}

Aetius (a) Celsus (b) & ante hos Hippocrates (c) de aphthis scripserunt. Requidem vera acutas, & ardentes, inflammatoriasque febres quæ ulcuscula comitantur, & in ore, faucibus, oesophagoque oriuntur *aphthæ* appellantur. Horum ulcusculorum origo debetur humoribus fluida parte orbatis, & capillaria oris vascula obstruentibus, qui mora facti acres, & corrosiva præditi indole exulcerant totum oris, oesophagi, ventriculi, intestinorumque tractum. Nec denegamus aut humorem scorbuticum, aut exanthematicum, veluti morbillare, variolosum, scarlatinum &c. indicatas partes obsidere posse obstinatissimas aphthas facturum. Hujusmodi ulcuscula habere solent colorem aliquando album pellucidum instar margaritarum, aliquando flavum, lividum, nigrum. Et ex vario colore varia oritur aphtharum indoles. Quo sunt lividiores, nigrioresque,

Quibus ex
causis fi-
unt.

(a) Lib. VIII. c. 41. p. 158.

(b) Lib. 2. c. 1. p. 44.

(c) Sect. III. aph. 24., & Epid. 3. T. VI.

que, & quo sæpius exiccatae reviviscunt, eo maligniores sunt. In pueris ob partium teneritudinem, molitudinemque frequentius accidunt. Licet heic de illis aphtis sentiendum est; quæ potius sequuntur ambullas on ore & faucibus ortas. Post harum bullarum exiccationem crustæ enascuntur modo dentiores, modo laxiores, modo sicciore, modo humidiores; & ex his deciduis pueri cum parva puris quantitate commixtum expuunt sanguinem. Quando hæ pustulæ sunt per oesophagum, perque ventriculum sparsæ, & comitem habent continuam febrim, potissimum si trachæ superficiem occupant, tunc penè semper pueros interficiunt. Vidi semel iterumque decedentes primas aphtas novam aphtiarum eruptionem sequi. Hisce corrigendis, curandisque valet ^{herbarum} exacta lactis depuratio, ^{curatio,} quæ obtinetur usu selectorum ciborum; & antiscorbuticorum remediorum. Sunt frequenter abluendæ aphtæ aqua sambuci, in qua gummi arabicum & sal prunellæ solutum sit. Si crustæ elabuntur aqua hordei & melle rosaceo sæpissime abluendæ

dæ sunt. Et quæ livido, aut nigro ob-
 fidentur colore medicari solent ablutio-
 ne decoctionis chinchinæ salis dulcis
 spiritu infectæ. Nec inutile erit ægro-
 to aquam antiveneream, herbas anti-
 scorbuticas, ipsamque chinchinæ deco-
 ctionem acido minerali infectam, &
 his similia propinare. Laudant corda-
 tiores chirurgi adversus obstinatissimas
 aphthas decoctionem ligni guajaci cum
 spiritu nitri dulcificato copulatam.
 Quando vero aphthæ cum magno o-
 ris, fauciumque calore, pruritu, &
 inflammatione conjunguntur, diluen-
 tibus remediis, potissimum ab aqua
 sambuci lacti conjuncta, aut ab deco-
 ctione chamæmeli, & lactucæ cum
 paxillo aceti copolata elicitis abluen-
 dæ sæpe de die sunt (d).

AR.

(d) De aphthis plura scire cupientes Confu-
 lite Ketelaerum *de aphth.*, & Swietenium *T.*
V. commentar. aphor. Boerhaav. n. 978. & seq.

ARTICULUS IV.

Rachitis. Hydrocephalus.

§. 9. **E**ST morbus pueris familiaris Quibus si-
gnis adpa-
rere solet
rachitis. ossa potissimum invadens, qui dicitur *rachitis*. Hujus morbi characteres sequentes sunt. Non ante sextum mensem, neque post duos annos apparere solet, & quidam tumores ossei præ primis in spina, in articulationibus carpi, genu, & tarsi observantur, inde sensim sensimque reliqua ossa curvari solent. Caput puerorum justo grandius est, faciesque in morbi initio rubicundior solito apparet. Ingenium est perspicax, & ante dentium consuetam eruptionem loqui incipiunt. Morbo progrediente intumescere abdomen propter enatas obstructions incipit, & ob nutritionis defectum sensim, sensimque emaciantur pueri. Diarrhoea, qua viridæ faeces copiosæ excernuntur, frequenter vexat, tussis haud raro molestatur, & facta intra pulmones viscidæ materiei congestione ad phthisim disponuntur ægri. Ossa parum elongantur
ob

ob conceptam deformitatem, & ob succi medulloſi degenerationem pædarthro-
cace corripuntur. Tandem lentam ena-
tam febrini, univerſalem corporis ma-
ciem, præter abdomen, quod eleva-
tum, & turgidum apparet, frequentem
alvi ſolutionem maraſmum augentem
excipit mors. Hæc puerorum ærumna-
rum requies eo celerior, certiorque eſt,
quo abdominis viſcera, & pulmones
tenaci lymphæ citius obſtruentur, quæ
mora, & loci calore facta acrior nobi-
lium partium corruptionem affert. Nec
raro datur videre rachiticos pueros lon-
gam trahere vitam. Id accidere poteſt
ex eo, quod cerebrum, pulmones, he-
par, & meſenterium nullum vitium
contraxerint, & oſſa licet tuberculis
duris obſita, & diſtorta ſint, tamen
nullam internam medullæ, aut alius
humoris corruptionem acquiſiverint. Ra-
chitis licet non ſit contagioſa, attamen
a parentibus in filios, tardosque nipotes
per generationem transfunditur. Fabri
lignarii familiam novi, quæ tota eſt
rachitica. Plurium filiorum genitores
rachitici non ſunt, & tamen omnes fi-
lios

ios rachiticos generant, qui circa quartum, & quintum annum moriuntur. Hi genitores filii sunt rachiticorum, quorum morbus in nipotes transmissus est.

§. 10. Rachitidis causa in ea humorum indole est collocanda, in qua potestas est tam durarum, & firmium, quam mollium partium tantam pessundationem parere. Acidam cacochymiam in puerorum corpore generatam id facere posse ratio, & experientia suadet. Nimirum cum experientia evictum sit ossa ab terreo elemento cum succo osseo concreto efformari, cumque ossa firmitatem, & duritiem amittant, si in aceto, aut in spiritibus acidis mineralibus aliquantisper detineantur, prout Duhameli, Herissani, Wittii, Hallerique observationes evicere (e), apparet evidenter rachitidis causam necessario deberi acidæ cacochymix in corpore genitæ. Nam, quando acidum hujus-

Quenam est rachitidis causa.

(e) Consultit. nostr. Physiol. ubi de ossium efformat.

jusmodi venenum intra ossium compagem immittitur, terreum destituendo elementum, ita ipsa emollit, ut sustinendis cunctis corporis motibus imparia reddat. Sic circa articulationes, in quibus veluti motionum fulcrum collocatur, præ primis tumere ossa incipiunt, & spina, cui erectio machinæ penitus est commissa, præsertim curvatur. Neque ossa multum crescere possunt ex ratione, qua constat tunc ipsa elongari, cum per continuam adquisitam firmitatem naturalem musculorum resistantiam superare valeant. Et ex irregulari nutritione, quam obtinent distorqueri necessario debent. Rachitica mulier pelvim habet ita arctam, ut si conceperit difficile foetum expellerit, & moriendum illi erit. Quando acidum venenum cranii ossa adoritur ea nondum futuris firmata emollit admodumque distendit. Et auctæ nimis calvariæ magnum aptatur cerebrum. En ratio cur magno capite donantur rachitici, & ingenium acrius habeant. Acida hujusmodi cacochymia generatur in visceribus imi ventris ob chylopejeticarum

virium debilitatem, quam pueri sive per temperamentum, sive per vitium generationis a parentibus acceptum habent. Neque denegamus nutricis pene semper lac vitiatum ob admissos in sex res nonnaturales errores ægre admodum digeri a puero posse, sicque in ipsius corpore generatur cacochymia acida. Lac enim non rite in visceribus digestum in acidam indolem faceffere cunctis innotescit. Sic non ante sextum mensem apparere solent rachitidis vestigia. Nam tanto tempore opus est, ut illud acidum venenum ossa invadens ea possit vitare. Nec post secundum annum apparet rachitis, quia si per tam longum tempus mollia ceteroquin pueruli ossa nullum vitium ab rachitico veneno contraxerint, facile conjectari potest ipsum a corpore pueri abesse.

§. II. Quando in abdominis visceribus generatur cacochymia hujusmodi acida constringit irritando vasa lactea, & factis eorum osculis arctioribus nutrimenti copia in corpore puerorum deficit. Et lymphæ ob acidi admixtionem facta julto viscidior crassiorque obstruit

Comitantium rachitidis symptomatum redditur rachi-
110.

struit mesenterii, reliquorumque viscerum, potissimum, hepatis glandulas. Hæc obstructio in dies augetur ob novæ viscidæ lymphæ additionem. Sic intelligitur cur turget rachiticorum abdomen, dum reliquæ corporis partes marasmo corripuntur. Et pulmones sive quod eadem viscida infarciantur lymphæ, sive quod per vitiatam angustatamque ossium pectoris constructionem juxta naturalem statum ampliari nequeant, accidit, ut cor dexterum libere evacuari intra ipsos nequeat, & vena cava reducens a facie sanguinem libere accipere non possit, ex quo vividus faciei color excitatur, qui in pallidum commutatur, quando per temporis longum intervallum totus solidorum, & fluidorum status vitiatus apparet. Si multa copia lactis indigesti in intestinis restat, debet necessario non levem irritationem parere, cui accedens bilis exoneratio, augetur irritatio. Ita intelligimus cur sæpe enata diarrhoea alvi fæces multæ & virides a rachiticis excernantur, & per hanc diarrhoeam dissipatis fluidis par-

partibus quæ remanent crassiores augent abdominalium viscerum obstructions. Tandem hanc cacochymium acidam tractu temporis commutari in alcalinam acrimoniam adserit modo laudatus Rosenstein (f). Hoc ab indole febris, a corporis consumatione, ab spina ventosa, atque ab aliis putridis adparentibus symptomatibus desumit. Hæc quemadmodum vera sunt, ita pariter certum est, quasdam alias causas morbum fovere solere. Sic diuturnus incolatus in frigido, & humido loco rachitidi viam sternit. Per impedimentum enim perspirationis, & per musculorum imbecillitatem immissa acidæ cacochymix rudimenta haud corrigi & expelli de corpore possunt. Sic intelligimus cur in Angliæ humidis frigidisque regionibus rachitis frequens observetur; & cur quoque corripit eos, quorum vita per corporis inertiam summam, perque vitæ errata est traducta. Quando scilicet pueri nimis replentur lacte im-

pu-

(f) De pueror. morb. p. 355.

puro , & panatellis in acidum vergentibus , quarum & qualitati , & quantitati vitiatae non opportuna responderet coctio , hi frequenter rachitidem patiuntur (g).

*Rachitidis
prognosis
& cura .*

§. 12. Dum rachitis non multas in corpore iniecit radices , nec profundam in pulmonibus , inque abdominis visceribus labem infert , curationem admittit. Secus incurabilis evadit , & circa tertium quartumque annum pueros interficit. Nec raro datur videre rachiticos senes , qui nullam in magni usus visceribus labem a morbo , de quo sermo est , obtinentes longævam ducunt vitam. Rachitidis curationem ; quæ pluries nobis felix evasit , in hunc modum instituere debetis. Convenit in primis usum rerum in acescentiam tendentium abstinentiam imperare. Si fieri potest , ante unius anni tetminus pueri

(g) Adire potestis , adolescentes , Zevianum , nuper laudatum Rosenstein , Strackium , aliisque de rachitide optimos recentiores Scriptores .

ri ablactatio est instituenda, & carniū vitellorum aut pullorum jura, nec non viperam, nasturtium, cochleariam, caneros fluviatiles, testulinem, aliaque hujusmodi sanguinem contram cacochymiam acidam munientia in multa aquæ ebullitione parata ægroto concedenda sunt. Ab humido, cænoſo, & crasso aere in purum, elasticiorē, & mineralibus effluviis quodammodo refertum mutatio faciēda est. In hoc aere diuturnus incolatus puer faciat oportet, & motum per carruculum institutum pluries de die instituat. Somnus sit moderatus, & vestium religiosa custodia habenda est. Semper a corpore pueri abesse debent lorice, & tibialia ab ossibus balenæ, aut exiccato animalium corio confecta. His enim vidi rachiticorum ossa in pejorem distorsionem abire. Mane & sero totum corpus cum laneo panno masticis fumo infecto factis frictionibus est excutiendum. Et unctio- nes per spinam, & per articulationes semel iterumque de die factas *unguenti martialis* non parum profecisse cognovi. Apud nos extant nonnulli experientif-

fimi chirurgi, qui faciunt unguenta contra rachitidem admirabilia, quorum virtutem non semel cum summo ægrorum emolumento experti sumus. Hisce aromatibus unguentis corrigi potest vitium osseum propter destructionem rachitici veneni.

*Rachitidis
curatio se-
quitur.*

§ 13. Remedia autem interno usui opportuna ea esse videntur, quæ alcalina virtute prædita possunt acidam rachitici veneni indolem corrigere. Ens veneris boyliana methodo paratum ad grana decem quotidie per plurimum mensium spatium propinatum tanquam morbi celebratissimum antidotum nunc vidi in duas rachiticas puellas, quas integre a morbo liberavi diuturno tanti remedii usu. Cochleariam, & nasturtium indicato remedio adjungi optimum est. Laudat Rosenstein sal alcalicum calcinatum dissolutum in aqua fontis, & præcipit hoc remedio, præsertim pueros pauperes uti debere quotidie ad datam dosim, & commendat quoque saponem venetum, fel bovis coctum, & radicem aronis. His probe conjunctis interneque sumptis credit corrigi posse

rachiticum venenum , promoveri ciborum digestionem , aperiri venarum lactearum oscula, cohiberi mucosorum humorum generationem, humorumque tenacitatem , nec non mesentericarum glandularum obstructions solvi, & temperate alvum lubricari (b) . Rubiæ tinctorum usum quotidiana praxis in curandis ossium morbis opportunum semper cognovit. Hinc pro pueris rachiticis concinnari potest in hunc modum remedium . Rubiæ tinctorum uncia semis , corticum aurantium grana viginti , & totidem grana seminum petroselini accipiantur , & in libris sex aquæ fontis coquantur ad tertiæ partis consumptionem . Hac decoctione utatur

P 2 tur

(h) Dosis horum remediorum est sequens. Accipiantur decem grana saponis veneti , felle bovini cocti granum unum , radicisque aronis grana quinque . Misceantur omnia & fiant pilulæ cinnamomi pulvere involvendæ . Harum pilularum quatuor ad prandium , totidemque ad cœnam sumenda jubet auctor loc. cit. p. 358.

tur rachiticus pro quotidiano potu. Verum fateri debemus entis veneris virtute pro rachitide curanda efficaciora indicata remedia non esse. Cum hodie nostrates medici pro curanda ascite decoctionem hyosciami efficacissimam experti sint, crederem eandem decoctionem puero rachitico turgidum abdomen & pene asciticum habenti tuto concedi posse.

Quid est hydrocephalus, & quæ sunt ejus species.

§. 14. Hydrocephalum aquæ circa cerebrum collectionem, ideoque cerebri hydropem significare unusquisque scit. Hujus sedem quadruplicem practici statuunt. Altera est quando aqua inter cranium, & exteriora integumenta, altera est quando aqua inter duram matris exteriorem superficiem, & cranium interius, tertia quando aqua inter duram, & piam matrem, quarta quando intra ventriculos cerebri ubertim colligitur. Et semper verum est in solis foetuum, & infantium calvariis tenuibus ossibus concinnatis collectam super cerebrum, aut super ejus membranas aquam osseam thecam distendere & aliquando separare posse. Nam in
adul-

adultioribus hominibus quæ colligitur vel magna copia intra calvariam aqua meninges, & cerebrum comprimit lethalem factura apoplexiam, ne hilum quidem thecam commovet ossæam. Quando tenera foetus, & infantis cranii ossa frequenter ab aqua tanguntur ita mollia & diaphana aliquando evadunt, ut facile rumpi & separari valeant. Suturae cranii aut nondum sunt conjunctæ, aut levi nexu hærent in nuper natis. Hinc, accedente propter jugem aquæ contactum præternaturali mollitie, ita distendi, & laxari debent, ut caput insigniter augeatur, & aut portio cerebri, aut ejus membranæ veluti in sacco quodam clausæ extra calvariam ferantur. Hic tumor mollis, decolor, pene immutabilis, follicularium tumorum indolem referens videtur esse herniosus, quocirca cum recentiori autore (i) aut *enphalo-*

P 3

ce-

(i) Joanne Baptista Palletta in sapientissimis adnotationibus, quas operi *de morbis puerorum Rosenfein* adnectit p. 392.

celem, aut *meningocelem* eum appellamus ex ratione, qua modo encephalon, modo meninges in sacco clauduntur. In tumore aqua servari quoque debet, & numquam aut cerebrum, aut ejus membranæ exire e calvaria possunt, nisi prius tenera infantis ossa ab distendente aqua collecta dehiscant. Cum autem aqua intra calvariam collecta semper cerebrum comprimere debeat, necessario accidit, ut raro encephalocèle constituatur, & tunc solum advenire possit, quando cranii futuræ in loco admodum declivi aperiantur. Si hujusmodi tumores apparent, caute tractandi sunt, & apertura omnino evitari debet. Aut enim continent cerebri portionem, aut meninges, aut solani aquam, semper tumoris sectionem sequitur infantis mors. Quando cerebrum, & meninges vulnerantur lethale vulnus constituitur, & quando effunditur sola aqua, quæ in tumore servatur, cerebrum concidit, & visceris munera deficient. Hujusmodi aqua communicat cum illa, quæ naturaliter intra ventriculos cerebri servatur. Hinc patet per tumoris aperturam effun-

effundi ventriculorum cerebri aquam, & cerebrum concidere, irreparabilem inde mortem sequi.

§. 15. Sed qua ratione tanta aquæ copia intra duram matrem, & piam, aut intra ventriculos cerebri (his in locis frequens hydrocephali sedes constituitur ex ratione, qua difficile aqua intra pericranium exterius, aut intra cranium, & duram matrem, propter partium duritiem, & fortem nexum) colligitur? Unica esse videtur causa impedita nempe tenuis roris absorptio. Jugi enim vapore & arachnoideam, & piam matrem madescere, & non parvam aquulæ quantitatem intra cerebri ventriculos colligi in naturali statu scimus omnes. Si autem in foetu, & in nuper nato puero, aut per compressionem, aut per obstructionem, aut per convulsionem, aut per quamcumque aliam internam causam clauduntur vasorum absorbentium hiatus, & dum ab exhalantibus arteriis ros emittitur ab inhalantibus non hauritur, augetur sensim aquæ copia, quæ distendens cranii ossa hydrocephalon

*Quæ est
causa hy-
drocephali.*

constituit. Neque mirum alicui videri potest pueros vivere per menses, & forsitan annos tantam aquæ copiam super cerebrum habentes. Nam hujusmodi aqua non comprimit solum cerebrum, sed contra ossa urgens ea mollia enormiter distendit, ita ut aliquando visa sint obversa capiti lumine contentæ intra calvariam partes propter summam cranii diaphinitatem. Neque vero data cerebri compressio ab aqua deficit. Hac enim compressione efficitur, ut hujusmodi pueri sint stupidi, & sensus habeant habetes, nec non propter influxus nervei defectum capiti subpositas partes graciles & debiles teneant. Vidi superioribus annis puerum in nosocomio incurabilium decumbentem annorum octo, qui hydrocephalo laboravit, & ejus caput erat tam magnum, ut sine dubio quatuor simul junctas puerorum calvarias superaret. Hic puer reliquas corporis partes ita exiles, & parvas habebat, ut vix nuper nati infantis corpus æquare videretur. Nec in erecto situ, sustineri, nec ambulare potuit. Post duos menses ta-

*Hydroce
phali phæ
nomena.*

lbe confectus periiit. Et aqua intra cal-
 variam collecta potest per tubum spinæ
 ad usque os sacrum venire, ibique col-
 lecta ita emollire vertebrae, ut tandem
 eas separare valeat. Sic exit involu-
 crum tubi spinæ, & ob peculiarem
 aquæ collectionem fit *tumor hydro-rachi-*
ticus, cujus ut plurimum lethalis est
 exitus. Neque denegamus per totam spi-
 nam nimis collectam aquam tamquam
 ossei canalie spinæ hydropem facturam
 non raro observari. Hæc est *hydro-ra-*
chitis, quæ haud raro accidere quoque
 solet ob impeditam humoris aquei ab-
 sorptionem vasorum inhalantium in to-
 to spinæ cavo existentium. Quando
 vero dissociantur a corporibus vertebra-
 rum apophyses ob congestam aquam,
 & peculiaris tumor aquosus constituitur,
 tunc fit morbus, quem vocant *spinam*
bifidam. Ab anatome enim scimus &
 apophyses transversas, & spinosas ver-
 tebrarum per sychondrosim, sive per
 intermediam cartilagineam conjungi cum
 osseo vertebrae corpore. Hæc carti-
 lago in scætu, & in infante tenerrima
 est,

Hydro-ra-
chitis quo-
modo fit.

Quomodo
fit Spina
bifida.

est, cui ab adfusa aqua tanta mollitudo accedit, ut facile rumpi & separari possit. Secedentes sic apophyses a corporibus vertebrarum, & permittentes canalis spinæ involucri membranosi exitum, constituitur modo memoratus tumor, qui dicitur *bifida spina*. Morbus secundum variam foetus motionem, secundum varium pondus & variam distractionem aquarum, secundum variam vertebrarum dispositionem &c. modo in collo, modo in pectore, modo in lumbis apparet. Hujusmodi tumores sedulo observandi & cognoscendi sunt. Frequenter ob vitiatum, & forsati extinctum nervorum a spina prodeuntium influxum venit inevitabilis mors. Superiori anno niebatur filius amicissimo meo, cui tumor supra os sacrum apparebat magnitudinis ovi columbini. Disceptabant inter se duo sapientes chirurgi de tumoris indole. Ego dixi tumorem esse bifidam spinam, quam citam mortem sequi necessario debere. Post octo dies infans moriebatur. Prohibita mihi fuit cadaveris sectio, a qua indoles

es tumoris evidenter adparebat (k). *Hydrocephali cura.*
 Medicamenta aut nulla, aut pauca conveniunt in hydrocephalo. Alvus frequenter laxanda est mercurio dulci & pulvere jalapæ. Nobis in usu est in sirupo de cichoræa Nicolai unum alterumque granum scillæ præparatæ immittere, remediumque ad ciendas urinas aptum cochlatim infanti exhibere. Nutricis lac corrigimus usu aquarum thermalium, & herbarum antiscorbuticarum, quibus adjungimus rubiæ tinctorum aquam tota die bibendam. Hisce alimentis enutritus infans potest sui morbi medicinam obtinere. Sectionem, ulsionemque cutis calvariæ abiicimus ea ratione, qua scilicet timemus eductam in cerebro aut circa cerebrum collectam aquam viscus concidere, & sui muneris exercitiū penitus amittere, quo vita ægrotantis cito extinguitur.

AR.

(k) De Hydrocephalo plures sapienter scripsere, inter quos laudarem Witthium Murrayum, Watsonum, Volgelium, Swietenum, & Rosenstein.

ARTICULUS V.

Crusta Lactea . Tinea .

*Quid est
crusta la.
ctea .*

§. 16. **S**olet in pueris circa cranii & faciei cutem adparere non parva quantitas pustularum , quæ modo sunt latæ , modo rotundæ , modo parvæ , modo magnæ , semper inchorosam continentes materiam . Pustulæ ab una faciei , vel crani parte transeunt ad aliam , & non raro in unam coeunt continuatam crustam coloris albo flavi . Hæc est crusta lactea , quam Itali vulgo vocant *lattime* . Hoc morbo a prima infantia ad usque decimum annum pueri vexantur . Aliquando post multas pustularum exiccationes novæ reviviscunt pustulæ , & quæ antea credebatur extincta crusta lactea , iterum reviviscit . Nec raro accidit videre non modo calvariam , & faciem , sed totam pectoris cutem ab hoc morbo detineri . Vidi duos infantes habere crustam lacteam per universam corporis cutem diffusam , a qua tam pessime fuere consuetati , ut morbus

bus

bus spernens omnia artis præsidia, tandem, præcedentibus fortibus convulsionibus, eos interfecerit. Quando vult adparere circa cranium, & circa faciem indicata crusta elevat quodammodo infantis cutem, eamque reddit pruriginosam. Evadunt irrequieti infantes, spirant halitum urinosum, nec convulsionibus sæpèpius recurrentibus carent. Et ophthalmiam, catarrhos suffocativos, aliosque gravissimos morbos parit occulta intra sanguinem retenta crusta lactea. Hujusmodi morbus fit ab acri *Crustæ lacteæ causæ* fero, peculiari indole vitiosa prædito, cujus peculiare genium est occupare cutem circa occiput existentem, in quam figit suam radicem, & adveniente ichoris emanatione per rupturam cutis factam, emendari, & curari ut plurimum solet. Vulgo creditur omnibus pueris inhærere legem crustam lacteam expurgari, eamque per generationem, sive per matris fœtusque sanguinis communionem propagari. Matrem quondam hoc morbo detentam debere filios generare eodem morbo infectos, & nutricem alienam ipsomet laborantem morbo

bo debere vel e matre sana enatum infantem inquinare, vulgata apud mulierculas res est. Nos quemadmodum asserimus id aliquando verum esse, & ex vitiosa humorum indole per generationem a matre in filios crustam lacteam propagari, ita denegamus non posse puerum bonam promittere sanitatem, vitamque longævam habere penitus hac affectione destitutum. Integras novi familias, quæ fuere ab hoc morbo immunes bona gaudentes sanitate & longam vivere vitam.

*Crustæ la.
Etæ progna-
sis, & cura.*

§. 17. Ceterum quando hujusmodi acris humor corporis exteriora occupat, & quando laudabili methodo expurgari permittitur, a gravi morbo immunes sunt pueri. Et si in exteriores partes impetit cerebrum, nervos, pulmones, heparque læsurus, post febres, convulsiones, tusses, aliaque gravia incommoda obire potest infans. Huic curando morbo valet lactis nutricis deputatio, potissimum per bonum victus regimen, & antiscorbuticorum remedium usum facta. Et apud nos unica methodus curandæ crustæ lacteæ re-

cepta est ipsius per ruptam cutem occipitis perennis eductio. Hæc obtinetur, dummodo usu betulæ succi, & santonis nigri occipitis indicata cutis diu aperta fervetur. Et quamvis ad brachia vesicantia medici admovent, ut crustam expurgent lacteam, attamen experientia cognovi hujusmodi vitiosum humorem per occipitis cutem, & non per aliam viam tuto expurgari solere. Sive quod cum hoc capitis loco affinitatem tantum habeat, sive quod occipitis cutis aperta tamquam in loco capitis inferiori veluti per declivium expurgetur degener humor calvariæ & faciei cutem occupare solitus, sive per aliam causam, illud certum est tuto nostris mulieribus hac methodo curari crustam lacteam. Ad curandum hujusmodi morbum tamquam specificum laudat Strukius herbam *jaceam* dictam sive *florem trinitatis*, sive *jaceam tricolorem* Botanicis dictam. Accipienda est hujusmodi herba viridis sine radice, & sine semine, & in lacte coquenda est. Hujusmodi lac pluries de die ægroto bibendum dari debet. Per unam,

unam, alteramue hebdomadam sumendum est remedium, & post plurimum circa faciem pustularum adparitionem, earundemque inde advenientem exiccationem ex integro curatur puer. Post pustularum exiccationem continuandum esse remedium per alios quindecim dies jubet auctor. De hujusmodi remedii virtute nil spondere possum, cum non adhuc practicæ meæ observationi ipsum commisi. Ceterum vos moneo, adolescentes, ne a veteri curandæ apud nos crustæ lacteæ more recedatis (1).

Quid est tineæ, & quo modo se manifestat.

§. 18. Tinea est Neapolitani Regni endemicus morbus, qui calvarie puerorum cutem obstinate adoritur pertinacissimi scorbuti indolem referens. Cito nimis in pueris apparet, & adolescit ad usque tardam eorum ætatem. Crustæ agminatim per calvariam excurrunt, & non raro totam adoriuntur faciem de genere impetiginis. Vidi superiori anno

(1) Adire potestis notam Pallettæ operi Rosenstein adpositam in p. 376. ubi de crusta lactea, & de hoc specifico fit mentio.

anno hominem quadragesimum annum
agentem in incurabilium nosocomio de-
gentem habere tineam per totum cor-
pus diffusam. Crustæ albæ, aridæ, ag-
minatim positæ corrosivum veluti hu-
morem servantes in pedibus, in brachiis
in abdominis ac pectoris anterioribus
& posterioribus partibus, inque toto
collo existentes similes erant illis, quæ
in calvaria reperiebantur. Tinea mor-
bus est contagiosus, qui per fomitem,
& contactum immediatum transit ab
uno in alium puerum. Et inter no-
strates mos est puerum tinea affectum
separatum ab aliis sanis pueris tenere.
E toto regno veniunt in nostrum Incu-
rabilium Nosocomium turmatim hoc
morbo vexati pueri, & puellæ, quarum
domicilium angustum, & non penitus
perflatum, indeque necessarium invicem
contagium haud impediens, reddit mor-
bum sæviorem, longioremque. Numquam
puerorum, & puellarum in nosocomio
hujusmodi decumbentium numerum mi-
nor est 300. Credunt medici cordatio-
res produci morbum ab veneno muria-

*Quid est
tinea.*

*Quandam
tinea caus-
sa.*

genium peculiare est occupare bulbos pilorum calvariæ, in quos oleum collectum evadit ita vitiosum ob veneni scorbutici adventum, ut difficile sit absque repetita capillorum evulsione, & adplicatione remedii veneni indolem corrigentis morbum videre curatum. Et tinea per plebis, & minutæ gentis puerulos eo crudelior grassatur, quo vilium ciborum frequentior est usus, & summa cutis immundities, nec non impuri, non ventilati & vitiosi aeris respiratio accedit. Hisce causis coinquinari sanguinem ulterius, ulteriusque salinis, scorbuticis, impurisque particulis certum est, quibus morbo fomes frequenter sugeritur.

Tinea cutis.

§. 19. Felix apud nos morbi curatio abtinetur, si interno usu opportu-
 norum remediorum, atque instituta aeris pro respiratione convenienti electione prospiciatur interiori humorum vitio, a quo augmentum, & fomitem morbus semper suscipit. Hinc in primis fieri debet separatio infecti pueri a sanis, & in aere libero undiqueque perflato incolatum ducat ipse oportet.

Aquam

Aquam fumarizæ cum sero lactis depurato conjunctam, ptisanam ex salsa parilla & cortice ligni guajaci factam, aquas thermales, præsertim annuente tempestate, antimonii pulverem cum sirupo ejusdem salsæ copulatum, ciborum selectissimorum, potissimum fructuum horæorum, lactucæ, trifolii, cochleariæ, acetosellæ, nec non aliarum herbarum antiscorbuticarum usum internum non parum corrigendo & debellando tineæ veneno prodesse quotidiana docet observatio. At nil efficacius morbo medetur, quam frequens cutis mundities per balinea frigidiuscula bis de die procurata. Unica ratio, qua in incurabilium nosocomio tineæ numquam extinguitur est locus alendis hujusmodi pueris inopportunos, nullus medicamentorum internorum usus, improba cutis sæditas. Turmatim enim in angusto loco multi dormiunt pueri tineæ infecti, & unus alteri morbum communicat. Ceterum methodus, qua curatur in nosocomio tineæ est sequens. Post unum, alterumque catharticum a salsa solutiva, aut ab aqua solutiva P.

Emilii electum propinatum, totæ calvariæ applicatur unguentum aureum, aut butyrum insulsum ad desquamandam tineæ escharam. Inde sequenti unguento fit usus. Accipiantur hellebori nigri cum radicibus & frondis, & gallarum orientalium ana uncia una, sulphuris uncia una & semis, picis navalis unciæ duæ, aluminis crudi uncia semis, viridis aeris uncia una & semis, communis cretæ uncia una, calcis vivæ uncia una, orpimenti uncia una & semis. Pulverisatis pulverisandis immergentur in libram semis veteris olivarum olei depurati, atque in unciam unam & semis optimi aceti, & in lebetè bulliant omnia usque ad unguenti conditionem. Hoc factò accipienda est nigræ picis debita quantitas, moderatoque igni exponenda, ut ad laudabilem conditionem perducatur. Frigefacta pix moderate dato calvariæ loco applicetur, & ut pix firmetur statim frigida aqua tangenda est. Inde cum impetu evellatur, ut ita adveniat depilatio. Ab uno in alium calvariæ locum hæc transiens depilatio fit, ut tota calvaria ab escha-

ra tineæ & a capillis munda evadat .
 Post omnimodam calvariæ depilationem
 applicandum est nuper memoratum un-
 guentum . Quotidie aqua sapone infe-
 cta abluenda est calvaria, & post ablu-
 tionem unguentum est adplicandum .
 Id tot vicibus est repetendum, quot co-
 stat suffecisse ad omnimodam obtinen-
 dam tineæ extirpationem . Si post no-
 vum capillorum ortum percipiatur eos
 non esse puros, ideoque morbum dura-
 tum iri concluditur, tunc repetenda est
 indicata methodus, usque dum certa
 morbi cura habeatur .

ARTICULUS VI.

Vermes.

§. 20. **L**icet verum sit cujuscum-
 que ætatis homines pos-
 se vermibus laborare, attamen certum
 est pueros vermium generationi frequen-
 ter esse subjectos . Sive quod pueri ob
 fibrarum mollitiem, & oscillatorii motus
 arteriarum imbecillitatem recepta in-
 fectorum ovula interficere, & expel-
 lere

*Pueri quæ
 ratione ver-
 mes fre-
 quenter pa-
 tiuntur .*

lere non valeant, sive quod pueri multa abundant pituita intestinali, in qua oriuntur, nidulantque vermes, sive quod in tenero puerorum corpore humor reperiatur alendis vermibus opportunus, sive ob aliam causam, certum est puerilem ætatem vermium generationi ut plurimum esse subjectam. Hoc morbo laborare solent pueri statim ac cibos comedere solent. Hippocrates, postquam varios infantium morbos recensuerat, addit vermium generationem paulo factum adultiorem pati solere puerum (m). Cum autem varia sint corporis loca, in quæ vermes reperiuntur, quemadmodum apud Sennachium, Ruyschium, Duvernejum, Baglivum, Swietenium, Rosenstenium, Valisnerium, Swammerdamium, Rhedium, Andry, Reaumurium, Bonnetum, aliosque de re medica, & historia naturali benemeritissimos viros videre est, attamen locus frequens, in quo generantur, est totus ventriculi
ac

(m) Lib. aphor. 3. n. 26.

hæ intestinorum tractus : Si intra pericardii cavum, aut intra pectus, aut intra cystifelleam, aut intra cholodochum, aut intra aliam abdominis partem lumbrici reperti aliquando sunt, eos ab intestinis sibi viam facientes unam, alteramve ex memoratis petere posse partem dicendum est. Suis moribus fodicare intestina, & in cavum abdominis venire vermes quotidiana docet observatio. De vermium origine diu inter sapientissimos naturalis historiae scriptores disputatum est, nec penitus inter eruditos hodie conquiescit quaestio. De hac quaestione ne mutire quidem nobis practicas institutiones scribentibus licitum est. Adire potestis adolescentes nuper memoratos scriptores hac de re multa cupientes. Nos ab illa sententia, qua statuitur ab ovis intra ventriculos, & intestina per cibum, & potum delapsis oriri vermes haud posse alienari sanior ratio suadet (n). *Vermes fiunt ab ovis intra nos venientibus.*

Q 4

stina

(n) Nimirum ascaridum, lumbricorum, taenaria-

stina repertorum triplex est species ;
 Altera *ascaridum* , altera , *lumbricorum*
 tertia *teniarum* est , His addit Rosen-
 stein

niarum , & gordiorum , per terram excurrere ,
 & per aerem volare ovula innumerabilia cer-
 tum est . Quando aut cibum , aut potum su-
 mimus , cum his comiseri potest ovulorum
 quantitas non parva , quæ venit intra ventri-
 culum , & intestina , in quibus & ob loci
 calorem , & ob multam humorum copiam fo-
 veri ita possunt , ut ex his ovis prorepentes
 vermiculi paratum sibi inveniant nutrimen-
 tum . Et utriusque sexus , nempe feminæ &
 maris copulam viderunt auctores , qua multi-
 plicari posse nimis intra intestina vulgo sem-
 per creditum est . In morbis ex ratione , qua
 primarum viarum humores in putredinem abe-
 unt , insectorum ovula majori commoditate
 foventur , & vermes generantur , observamus
 vermes nimis abundare . Hinc a practicis sem-
 per statuitur non esse vermes putredinis cau-
 sam , sed in putredine vermes generari , Ne-
 que dicatur cibos ut plurimum coctos non
 posse ovula insectorum sana servare ; nam plu-
 ries in actis Academiæ scientiarum Sveciæ
 demonstratum est a Cl: Montino insignem
 caloris gradum insecta posse sustineri quin
 moriantur . Tæniæ ovula in piscibus , quos
 ut

stein quartam , & quintam speciem .
 Prima est *ascaridis lumbricoides* , altera
 est *gordii* . *Ascaris lumbricois* est ver-
 mis exilis oblongus utramque exilem
 ex-

ut plurimum semicoctos comedimus , conti-
 nentur , & cum his alimentis veniens intra
 intestina hujusmodi vermis latus , fasciatus ,
 longissimusq. diu vivere potest . *Ascaridum* ,
 & *lumbricorum* ovula pari ratione intra no-
 stra intestina venire possunt cum aliis alimen-
 tis & potibus . Et si intra sinus frontales , &
 sphaenoideos aliquando vermes visi sint , id ex
 ingressu aeris interiorum ovula secum in hos
 sinus ducentis est repetendum . Et si fœtus
 mox ab utero prodeuntes lumbricos per anum
 educere viderunt nonnulli , id repeti potest ex
 ingressu aeris intra amnii liquorem secum ovu-
 la *lumbricorum* ducentis . Scimus enim ulti-
 mo graviditatis termino rumpi membranas fœ-
 tum obvolventes , & uteri cervicem aperiri .
 Per has vias potest ingredi aer intra uterum ,
 & potest ferre ovula intra amnii liquorem ,
 qui non totus adhuc eductus comeditur ab
 fœtu & sic generantur lumbrici , qui mox e
 fœtu ab utero prodeunte excernuntur . Raris-
 simus casus fœtuum lumbricos habentium ra-
 rissimam supponit partium dispositionem , qua
 phænomenon explicari potest .

extremitatent habens palmi longitudinem æquans . Gordius est cylindricus albus , parum longus in piscium vesiculis ut plurimum vivens .

*Triplex est
vermium
species .*

§. 21. Sed verum semper est triplicem vermium speciem , nempe ascaridum , lumbricorum , & tæniarum in hominibus reperiri . Sunt parvi & saltillantes vermes ascarides pares iis , qui

Ascarides

in caseo reperiuntur . Circa rectum intestinum ut plurimum nidulare solent . Lumbrici similes terrestribus sunt , nisi quod his albidiores observantur . Con-

Lumbrici

stant lumbrici anulis quatuor pilorum ordines obvolventibus . Hi pili instar puntulæ rectæ flectuntur ad libitum insecti , quibus progredi potest . In una extremitate os aperitur per quod alimentum sumitur . Tænia est vermis

Tænia

solitarius , oblongus , fasciatus , & cucurbitinus , qui vivere solet in aquis stagnantibus , & in intestinis eorum venit , qui hujusmodi aquas bibunt , aut pisces harum aquarum indigenas comedunt . Credidit Andry de vermium generatione egregius auctor tæniam esse catenam longissimam cucurbiti-

bitinorum infectorum , qui per articulos modo longos, modo breves conjunguntur . Ab extremitate altera taniæ incipit, a quo fugitur alimentum , quod excurrit per canalem semper patentem , & singulus vermis huic canali adhærrens sugens ipsum alimentum nutritur (o) . Celeberrimus Bonnet duas distinguit taniæ species , quarum altera est anulorum brevium , altera anulorum oblongorum . In parte anteriori terminatur filum , quod est caput taniæ, & inter anulos reperiuntur parva corpuscula porporinum servantia liquorem . Hi stomachi vices gerunt . Circa quemcumque anulum reperiuntur duo foramina , & horum grandius parvam habet mammillam, qua & fugit alimentum, & fortiter figitur . Vocatur hæc prima species *tania stigmatum umbilicalium* . In altera specie foramina , & papillæ lateraliter sunt positæ , & intra anulos parvi servantur membranosi sacci, qui intestinorum vices

*Teniarum
duplex species .*

(o) Andry generat. des vers. p. 220.

ces gerunt. Hæc dicitur *tænia stigmatum lateralium* (p). Sapientissimus Dionis (q) tertiam describit tæniæ speciem, nempe eam, quæ in sacco servatur membronoso. Mira est tæniæ longitudo. Non raro totam & tenuivium, & crassorum intestinorum longitudinem æquare solet. Quando generatur ægerime potest ab intestinis educi. Suis enim mammillis nimis fortiter intra intestinorum tunicas figitur. Nec raro in fragmentis separatur, & frustillatim excernitur. Et si portio tæniæ deficit, potest iterum reparari. Falsum est tæniam semel generatam absumere sibi conveniens alimentum, & inde amplius reproduci non posse. Nobilis matrona sexagesimum annum agens quarta vice aduxit tæniam semper longissimam. Unica vice erat quindecim palmo-

(p) Bonnet Memoires presentes a l'Acad. des Scient. de mathem, & Physique T. I. & confid. sur les corps organises p. 200.

(q) Differt. sur la tæni. p. 15. & seq.

morum longitudinis, & latitudinis duorum transverforum digitorum.

§. 22. Quando pueri vermibus infestantur sequentia habere symptomata solent. Vagi & recurrentes abdominis dolores vexant, sternutatio est frequens, tussis est convulsiva, & molesta, urinæ excernuntur tenues & aquosæ, alvus modo soluta, modoque est stricta. Quando solvitur alvus fæces excernuntur ut plurimum virides, oculi sunt perturbati, & pupilla justo amplior apparet. Convulsiones eo sunt pertinaciores, quo vermes sunt molestiores. Vigiles noctes ducunt pueri, & si dormiunt frequenter subsiliunt, atque ab insomniis perterriti expergiscuntur. Oris labia mordent, nares frequenter scalpiunt, exhalant ab hore halitum urinosum. Macula rubra facile disparente genæ inficiuntur, & aurium tinnitus pariter molestat. Vertigines & epilepsiæ non raro a vermibus producuntur. Hæc aut similia signa sunt, quibus cognoscere solemus pueros a vermibus infestari. Pendent ab irritatione, quam vermes nervis intestinorum

*Quæ sunt
vermium
symptomata.*

com-

*Vermium
symptoma.
tum reddi-
tur ratio.*

communicant. Hujusmodi nervis magni intercostalis, & vagi propagines esse discimus ab anatomicis. Hos nervos cum omnibus corporis partibus consensum, & conspirationem habere certum est. Nimirum fiunt vagi dolores abdominis ex morsibus, quos vermes intestinis infligunt repetitis vicibus. Frequens sternutatio, & narium scalptura pendet ab illa irritatione, quam nervi harum partium per sympathiam accipiunt ab intestinis. Et convulsiva tussis per eandem sympathicam affectionem excitatur. Pueri ab hac tussi sive a vermibus, sive ab alia quacumque causa facta mirum quantum vexari solent (r).

*Convulsi-
ve puero-
rum tussis
fit mentio.*

Et

(r) Convulsiva puerorum tussis morbus non antiquus est. Epidemico grassari solet more & non raro per periodos invadere solet. Pendet a materia volatili, sanguinem inficiente, cujus derivationes in pectus per repetitas accessiones fiunt. Sic observamus pueros ab accessu convulsivæ tussis vexatos oculos turgidos & illacrymantes habere, faciem lividam, aridentem & intercisam respirationem. Et

fre-

Et oculi perturbationem, suamque patiuntur illacrymationem per nervorum consensum, quam ganglius ophthalmicus

frequenter hæc omnia vomitus excipit, qui finem insultui ponit. Cum tussi viscida materies excernitur, quæ potius morbi effectus est. Irritatis enim admodum tracheæ & bronchiorum glandulis emungitur copiosior lymphæ, & ab ore excernitur. Et quando vomitus accidit extricatur e pectore fortiter stimulans causa, atque expellitur, sicque cessat paroxysmus, rediturus accessione iterum miasmatis per sanguinem diffusi. Quam crudelis & ferina est tussis variolarum, morbillorum, & rosaliæ eruptionem præcedens? Quam ferox est tussis puerorum a quadam febris conditione orta? Sane quemadmodum pueri ab venefico miasmate variolarum, morbillorum, & febris cujusdam pectus invadente convulsiva & ferina vexantur tussi, quæ numquam cedit, nisi primario morbo extincto, ita ab venefico peculiari miasmate, pectusque periodica veluti invasione obsidente infecti crudeli tussi convulsiva laborare solent. Hæc tussis est contagiosa pari modo ac contagiosus variolus, & morbillus est. Et numquam extinguitur, nisi hoc miasmate domatum & penitus expulsam sit. Vidi pluries in praxi hanc tussim contagiosam

cus habet cum magno intercostali. Sicque explicatur secundum Monroi experimentum nimia pupillæ dilatatio in pue-

sam ab infectis pueris in sanis per distans transire. Et morbum omnia artis præsidia eludentem sponte cessare, quando scilicet tractu temporis correptum & domatum sit veneficum miasma, in compertis est. Ab hoc pertinaci morbo pueri fiunt excarnes, pallidi, & non raro sanguinem expuunt. Vidi non semel pueros a convulsiva tussi factos tabidos, excitatis convulsionibus, interire. Morbi curatio in hunc modum a nobis instituitur. Si vigent pulsus, & plethoricus est æger sanguinis missionem ad uncias quatuor instituere solemus. Unum, alterumve vesicatorium brachiis inde admoveamus, & alternis vicibus propinamus emeticum ab ipecacuanha paratum. Et sancte vobis testari possum, adolescentes, levia repetita emetica tussi convulsivæ puerorum curandæ summopere valere. Die advesperascente opiatum ex grano nepenthes in aquæ theriacalis uncia una soluto cum addita pauca diacodii liquidi quantitate præparatum cochlearim exhibemus. Clysteres emollientes frequenter iniicimus. Et periodico morbo chinchina cum duobus moschi electi granis copulata ad drachmas tres partitis in die vicibus medemur.

Opti-

pueris vermes habentibus . Nervi enim ciliares pupillam subeuntes ab ganglio veniunt ophthalmico, & his nervis debetur summa pupillæ motio . Convulsiones apparent ex perturbatione cerebro communicata , indeque facta summa spirituum nervorum ataxia . Sic accidunt vertigines , & epilepsiæ . Et illa macula facile in genas disparsa pariter fit a spasmodica constrictione pulmonum , in quos non libere venit a corde dextero sanguis , & in cor non libere exoneratur cava, quæ reducem a

R

fa.

Optimam victus rationem imperamus, & perdurantem diu tussim convullivam lactea diæta, belineis frigidiusculis, aeris mutatione curare tandem solemus . Rosenstein commendat decoctionem roris marini sylvestris pluries de die epotam pro compescenda convulsiva tussi . Werlhofius laudat sirupum corallorum rubrorum cum spiritu nitri dulcificato copullatum . Verum si hæc, aut alia his similia remedia inutilia observatis, minime animus vest vobis deficientis . Nam convulsivæ tussis pertinaciam vincit tempus, cui tamquam medicamentorum principi morbum penitus committere debetis .

facile sanguinem non prompte accipit . Et cum facile solvatur illa spasmodica pulmonum constrictio , facile disparet macula in genis facta . Et dum hærent ut plurimum vermes intra mucum putridum , emittitur ex hoc fætidus halitus , quem pueri ab ore exhalant .

*Vermium
quænam
sunt causæ*

§. 23. Vermium generatio debetur quibusdam causis . Temperamentum pituitosum , multisque humoribus aquosis & mucosis onustum vermium generationi aptissimum esse docet observatio . Qui in aere humido , & crasso vivunt , quique aquam palustrem , cænosamque bibunt , qui cibis utuntur crassis , & eos non facile digerunt , qui piscibus vescuntur , in quorum vesiculis ova insectorum multa nidulant , qui mæstitia , & potissimum timore corripiuntur &c. facile vermes generant . Quando aquæ bibitæ abundant insectorum ovulis facile hæc ovula in intestinis sæcundata educunt vermes , & intra ciborum indigestionem , scilicet intra putredinem vermes generari posse jam pluries dictum est . Sed cur post susceptum timorem generantur potissimum

mum in pueris vermes non facile ex-
 plicari potest . Ego crederem ab su-
 cepto timore universam constringi cu-
 tem , indeque fluida a circumferentia
 in centrum , scilicet , intra intestina con-
 fluere , & facto veluti calido putredi-
 noso nido causam ovulis insectorum præ-
 beri , ut facundentur . Id in pueris po-
 tissimum accidit , quia humoribus
 magis abundant . Humores prima-
 rum , & secundarum viarum indige-
 nas facile corrumpi ab determinatione
 transpirabilis materiæ diuturna constat
 experientia , Sic mulieres filiis suis pa-
 vore correptis , indeque vermes haben-
 tibus anthelmintica statim propinare
 vulgatissimo edoctas experimento sci-
 mus , Quando ascarides enascuntur , nisi
 diu intra rectum intestinum fixi sint , ut
 plurimum curantur . Lumbrici pertina-
 ciores sunt potissimum quando nimia
 abundant copia , & intra multam ni-
 dulant pituitam . Tænia difficillime in-
 terficitur , & expellitur . Quando ejus
 portio educitur facile regeneratur . Et
 nova tæniæ productio facilis accidit .
 Vermibus consumantur substantiæ ali-

*Vermium
 prognosis .*

mentitiæ puerorum, & exulcerantur intestina, atque fodicantur, quando pertinacissime adhærent eorum tunicis. Et gravissima symptomata veluti convulsiones, epilepsias, tabem a vermibus productam excipit tandem mors. Nec novum est videre vel ipsum suffocativum catarrhum a vermibus produci (s).

*Suffocativi
puerorum
catarrhi
fit mentio.*

§. 24.

(s) Notum omnibus est *catarrhum suffocativum* vulgo dictum corripere solere pueros ab initio infantia ad usque decimum ætatis annum, a quo ut plurimum brevi in tempore jugulantur. Quando cum vermium præsentia pereunt suffocati pueri credunt medici morbum a vermibus fieri. Hoc accidere potest vel ob fortem convulsionem bronchia, pulmonesque occupantem propter irritationem, quæ ab intestinorum nervis derivat, vel ob ingressum intra pulmones vermium intestina, diaphragmaque fodicantium. Hæc ex causis pulmones sanguinis circulationi obeundæ impares evadunt, & continuo moriuntur pueri. Verum potest accidere, ut catarrhus suffocativus pueros corripiat eo in tempore, in quo vermes in intestinis pariter geniti sunt, tunc duobus distinctis morbis ægri conflictati pareunt. Dissectis cadaveribus rei veritas elucet. Inveniuntur enim vermes multi in intestinis, &

tra-

§. 24. Ad curationem quod spectant *Vermium*
 jam omnibus notum est, vermes & inter- *curatio.*
 fici, & expelli deberi. Quan-

R 3 do

tracheæ, bronchiorumque interior superficies
 aut gangræna, aut pellicula album densum-
 que humorem servante obsidetur. Ut autem
 in hujusmodi catarrhi suffocativi indolem,
 quoad temporis angustia sinunt, diligentius in-
 quiramus, sciendum est non raro morbum
 oriri epidemico more grassaturum sequentibus
 stipatum symptomatibus. Pueri solito palli-
 diores, inquietioresque fiunt, anhelosi eva-
 dunt, & raucam ac sibilosam faciunt respira-
 tionem, vocemque reddunt acutam. Pulsus
 fiunt celeriores, frequentioresque, & omnibus
 sensationibus rite gaudent. Tussis est molesta,
 respiratio fit anhelosior, & una, alterave ab
 suscepto morbo die repente ægri moriuntur. Cl.
Homme in Scotia pluries pueros hoc morbo
 correptos, mortuosque dissecut, invenitque
 intra tracheam, & intra bronchia vesicu-
 lam albo, tenacique humore plenam. Id
 ipsum viderat Rolenstein in Svetia. Igitur
 juxta hos auctores suffocativi catarrhi causa
 accepta redditur huic vesiculæ intra respira-
 tionis vias enatæ. Nos quemadmodum non
 negamus id aliquando posse advenire, attamen
 adferimus non raro morbum ab inflammatio-
 ne interiores tracheæ partes obsidente, quam
 ve-

do circa rectum intestinum hærent a-
scarides optimum est laridi crudi fru-
stulum in anum immittere pluries de
die,

veteres *cynanchen* adpellabant, etiam fieri. Et
efformari pariter potest pellicula ab ipsamet
orta inflammatione. Nam quando aer nimio
plenus phlogisto espiratur, mucus naturaliter ve-
ficiens interiorem tracheæ superficiem densari
in pelliculæ formam potest, sicque suffocatus
cito perit puer. Nimis phlogisti quantitate
humores densari, & coagulari certum est. Et
in inflammationum casibus phlogisti copiam
in sanguine augeri omnes scimus. Pulmones
esse organa, e quibus extricatur phlogistum,
pluries docuere observationes recentiorum.
Quando hujusmodi morbo correptos pueros
curare debetis adolescentes sollicitè medicinam
opportunam adhibite. Duorum, vel trium die-
rum spatio morbus interficit. In primo mor-
bi stadio sanguis est mittendus modo e venis
pedum, modo e venis colli, modo e venis
raninis. Vesicantia circa collum sunt adhiben-
da, & clysteres emollientes frequenter sunt
iniiciendi. Fetus dissolventes & antiphlogisti-
ci sunt adhibendi in hunc modum. Accipia-
tur spongia, & imbuatur aqua sambuci aceto
infecta, sicque tepidiuscula ori admovenda
pueri est hac lege, ut inspiratione hauriantur
an-

die , & educere hac ratione , ut extrahantur plures infecti ei frustulo adhaerentes . Betulae succum , aut nicotiana decoctionem in anum per siphonem immittere non parum prodesse constat experientia . Nec parcendum est interno mercurialium usui . Hydragyrum enim ad grana viginti in sufficienti quantitate terebinthinae receptum quotidie propinatum ascarides & interficere , & expellere pluries observavi . Lumbricorum vero curationem absolvunt corallina , semen santonicum , ru-

R 4

tæ

antiphlogistici vapores . Serum lactis , in quod pauxillum salis polychresti solutum sit , pluries de die est bibendum . Si notae inflammationis absunt , & metus est viscidam materiam tracheam , bronchiaque obsidere repetita levia emetica sunt propinanda a radice ipecacuanhae parata . His solis e pectore educi materiam inertem potenter , posse experientia docet . Laryngotomia nullum habet in hac affectione locum . Morbus enim suam radicem intra bronchia , & pulmones fixam habet , cui laryngotomia numquam moderi potest . Consulte observat. Homm. , & Rosenstein loc. cit. p. 396. de hoc morbo plura scire cupientes .

tæ oleum, mel hyspanicum, aquæ minerales, succi foliorum hellebori cum vitriolo martis copulati conveniens quantitas, fel bovinum, summitatum absinthii decoctio, & his similia. Mercurium dulcem cum pulvere jalapæ copulatum vermes interficere & expellere valere docet observatio. Horum dosis sumenda est a ratione ætatis, & temperamenti pueri. Pulverem filicis majoris ad drachmam unam quotidie propinatum egregium esse anthelminticum hodie scimus. Huic pulveri addi potest potio decoctionis ejusdem filicis rutæ oleo infectæ. Clysteres e lacte parati frequenter iniiciendi sunt hac spe, ut vermes ad odorem lactis venientes inferiora intestinorum loca petant. Tæniæ vero ob summam longitudinem, plicasque, quas in intestinis faciunt, obque multam adhæSIONem, quam ope acutioris extremitatis, & inhalantium vasorum cum iisdem intestinis tenent, difficillime expelli possunt. Præter indicata contra ascarides, & lumbricos remedia efficacia, sunt & alia adversus tænias præstantiora adhibenda. A-
quæ

quæ thermæ, præsertim sulphuræ ad ultimum geliditatis gradum perductæ, & magna copia bibitæ per viginti, & triginta dies potenter tæniâs expellunt. Pulvis filicis cum gummi guttæ, & gratiolæ aliquot granis copulatus potenter tæniâs expellit. Obstinatissimam tæniâ interfecit expellitque Rosenstein usa sequentis pulveris. Carbonis fossilis; & pulveris pyrii drachma una & semis, nec non grana sex piperis accipiantur, & mixtis omnibus fiat pulvis tres in chartulas dividendus, quarum una mane, altera circa meridiem, tertia sero est propinanda. Purgantia drastica quoque convenire solent. Sic duo grana resinæ scammonii, & totidem turbith valere tæniâ interficere, & expellere ex Mitreto refert semper laudandus Rosenstein, a quo concinnatur elixir probatissimi usus. Radix gentianæ, mirrha, camphora, cortices aurantiorum, castoreum optimum, extractum aloes, & crocus orientalis per ostiduum digerere in spiritu vini debent. Colatura fervetur ad usum. Hujus elixiris guttas viginti in decoctione aut fili-

filicis , aut rutæ per plures dies bibitæ curaverunt a generatione tæniæ matronam , cujus mentionem fecimus §. præc. Ceterum haud denegamus mercurium dulcem cum pulvere jalapæ copulatum nimis valere ad tæniam interficiendam expellendamque , quemadmodum experientia constat . De puerorum morbis hæc dicta sint satis .

E I N I S .

I N D E X

A R T I C U L O R U M.

PRÆLOQUIUM. Pag. 3.

DE MORBIS MULIERUM ET PUERORUM

ARTICULUS I.

Purgationis Menstruæ Suppressio. 7

ARTICULUS II.

Uteri Hæmorrhagia. 41

ARTICULUS III.

Chlorosis. Fluxus Muliebris. 57

ARTICULUS IV.

Affectio Hysterica. 78

ARTICULUS V.

Graviditatis incommoda. 100

ARTICULUS VI.

Falsus Conceptus. Abortus. 117

ARTICULUS VII.

Partus Difficilis. 143

ARTICULUS VIII.

Puerperii Morbi. 156

DE

DE MORBIS PUERORUM

	ARTICULUS I.	
<i>Regimen nuper nati infantis .</i>		187
	ARTICULUS II.	
<i>Infantilis Epilepsia .</i>		202
	ARTICULUS III.	
<i>Difficilis dentitio . Aphthæ .</i>		210
	ARTICULUS IV.	
<i>Rachitis . Hydrocephalus .</i>		217
	ARTICULUS V.	
<i>Crusta Lactea . Tinea .</i>		236
	ARTICULUS VI.	
<i>Vermes .</i>		243

ERRATA CORRIGE

P. 11. v. 17. exertiones	excretiones
P. 12. v. 19. uterum	uterus
P. 11. v. 12. oētium	ostium
P. 23. v. 23. vingendis	vincendis
P. 27. v. 11. incontruas	incongruas
P. 35. v. 6. crurallem	cruralem
P. 49. v. 25. stillicidum	stillicidium
P. 61. v. 5. cohexiam	cachexiam
Ibidem v. 22. labascat	labescat
P. 63. v. 18. abltructi	obstructi
Ibidem v. 27. labascuut	labescunt
P. 67. v. 27. caro	raro
P. 68. v. 15. imbecillas	imbecilles
P. 90. v. 9. efficiora	efficaciora
P. 93. v. 15. charētām	chartam
P. 94. v. 8. vingulis	vinculis
P. 100. v. 7. concreflu	congressu
Ibidem v. 15. medicos	medici
P. 108. v. 27. avuum	alvum
P. 125. v. 5. veritur	vertitur
P. 129. v. 11. inuria	injuria
P. 138. v. 15. axilii	auxilii
P. 139. v. 17. inectiounes	injectiones
P. 145. v. 8. alius	aliam

P. 146. v. 21. dirrhæa	diarrhœa
P. 160. v. 25. gravidatem	graviditatem
P. 161. v. 9. Nicolaus	Nicolao
P. 165. v. 8. efunditur	effunditur
P. 166. v. 14. rententione	retentione
P. 172. v. 9. canatus	conatus
P. 179. v. 11. ipis	ipsis
P. 182. v. 17. luctiferi	lactiferi
P. 185. v. 26. pupillæ	papillæ
P. 195. v. 17. oportunam	opportunam
Ibidem v. 20. infeutis	infautis
P. 200. v. 24. evandunt	evadunt
P. 204. v. 18. apoplexium	apoplexiam
P. 215. v. 6. on	in
P. 232. v. 14. habetes	hebetes
P. 236. v. 5. inchorosam	ichorosam
P. 244. v. 1. totæ	toti
P. 254. v. 1. nervis	nervos

Alios, quos typographi oscitantia admittit errores lectoris solertiæ corrigendos committimus.







